


कृषक सहयोगी

(अगुवा कृषक तथा कृषि विकास कार्यकर्ताको लागि तयार गरिएको)



इकार्ड्स-नेपाल

पो.ब.नं. ८११५, कोटेश्वर, काठमाडौं

नेपालमा सुन्तला बालीको उत्पादन, बचावत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

नेपालमा सुन्तला बाली (सुन्तला, जुनार) को उत्पादन साँझैँ द्रवनीय छ किनभने यहाँ पूर्णरूपले सुधार गरिएका नर्सरीहरू छैनन् । अतः कृषकहरूलाई कलमी बिरुवा उपलब्ध नभएर विजु बिरुवामा मर पर्नु पर्ने हुनाले उत्पादन लिन ८-१० वर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । उता कलमी बिरुवा प्रयोग गरेमा ३-४ वर्षमा उत्पादन लिन सकिन्छ । यसका साथै हाम्रो देशका प्रायः सुन्तला क्षेत्रहरूमा खतरनाक र विनाशकारी हास (हङ्गलोहविह्व जस्ता) रोगहरूको व्यापकता छ । यी रोगहरू बारे ज्ञान हुनु र बिरुवाहरूलाई यी रोगहरूबाट बचाउन सके मात्र सुन्तला विकास सम्भव हुन्छ ।

देशमा सुन्तला बालीको अपार संभाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै देशभरी नै सुन्तला विकास गरी कृषकहरूको आय तथा समष्टिरूपमा रण्विद्य अर्धतन्त्रमा सहयोग गर्ने मूल उद्देश्य लिई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले फेन्च सरकारको सहयोगमा फान्सको बोर्डो विश्वविद्यालयका विशिष्ट प्रोफेसर डा. जोसेफ बोमोको नेतृत्वमा २०६१ साउनदेखि 'कृषि जिल्लामा सुन्तला बालीको पुनर्स्थापनाबाट बाध सुरक्षामा सुधार आयोजना' संचालन गरेको छ र ईकाईस-नेपालले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दैछ । नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानको पनि यसमा प्राविधिक सहयोग छ । तर २०६४ असार मसान्तबाट फेन्च सरकारको सहयोग समाप्त भएको छ र नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था हुँदैछ ।

कृषक सहयोगी

(अनुवा कृषक तथा कृषि विकास कार्यकर्ताहरूको लागि तयार गरिएको)



सम्पादन तथा प्रकाशन:

इकाईस-नेपाल

पोष्ट बक्स नं. ८११५, काठमाडौं ।

२०६४

कृषि विकासमा समाप्ति सबैलाई
यस पुस्तकको सदुपयोग गर्ने
समान अधिकार छ ।

पहिलो संस्करण: १,००० प्रति, २०६०
पुनः मुद्रण: १,००० प्रति, २०६४

मूल्य: २००/-

डिजाइन तथा कम्प्युटर:
संजय कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर्स प्रा. लि.
अनामनगर, काठमाडौं, फोन: ९८४९२९३७४३

मुद्रण:
इस्टर्शन ट्रेड लिंक
अनामनगर, काठमाडौं
फोन: ४७७१७१५, ४७७०८३९

४३०८

समर्पण

दिनरात रगत - पसिना बगाई देशको
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको
कृषिमा पुस्तौंदिखि संलग्न समपूर्ण
आदर्शणीय कृषक समुदायमा
यो “कृषक सहयोगी”
सादर समर्पण
गर्दछौं ।

प्रकाशकको परिचय

वातावरणीय सन्तुलन प्रति जनचेतना जगाउँदै सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा जनताको संगठन र नेतृत्वको विकासको माध्यमबाट जनतासंग काम गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा इकाईस्-नेपाल (Environment, Culture, Agriculture, Research and Development Society, Nepal) को स्थापना भएको हो । नेपालका बहुसंख्यक किसानहरु मध्ये गरीब, पछाडि पारिएका, हेपिएका, दबिएका अवस्थामा रहेका समुदायहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउने लक्ष लिई स्थापित यस संस्थाले उनीहरुलाई एक जुट हुन प्रेरित गर्ने, छलफल र भेला तथा अनौपचारिक शिक्षाका साथै चेतना जागरण गतिविधिहरुमा सहयोग गर्ने र स्थानीय श्रोतहरुको पहिचान गर्ने, कृषि जन्य आयआर्जन, वातावरण संरक्षण र मानवीय क्षमताको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । गरीब तथा मौकाबाट वंचितवर्ग तथा समुदाय विशेषतः महिलाहरुलाई उनीहरुको समस्या पहिचानमा संमिलित हुने र उनीहरु नै समाधानका अगुवा हुने कुराले मात्र सांचो अर्थमा उनीहरुको मुक्ति हुन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास यस संस्थाको रहेको छ ।

आफ्नो १६ वर्ष भन्दा लामो सामुदायिक विकासको अनुभवबाट इकाईस्-नेपाललाई निम्न उपलब्धिहरु हासिल गरेको महसूस भएको छ ।

- सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा जनतासंग काम कसरी गर्ने भन्ने फिल्ड अनुभव इकाईस्-नेपालका कार्यकर्ताले समेट्न सकेका छन् ।
- कार्यक्षेत्रका जनता, लक्षित समुदायका संगठित संस्थाहरु र अन्य सेवा निकायसंग कार्यगत सम्बन्ध विकास हुन सकेको छ र संचालित कार्यक्रमहरु दिगो हुन सकेका छन् ।
- संस्थाको विकास तथा सहभागिताका अवधारणाहरु विकसित भई विभिन्न मञ्च, भेला तथा छलफलहरुमा प्रष्ट राख्नसकेको छ ।
- लक्षित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने खालका आय-आर्जनका गतिविधिहरुले उनीहरुको जीवन यापनमा राहत दिएको पाइएको छ । लक्षित समुदायलाई सहकारीताको भावनामा आवद्ध गर्न र उनीहरुलाई दिगो स्वायत्त संस्थामा आवद्ध गर्न सकेको छ ।
- क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई संस्थाको एउटा हिस्सा बनाउन सकिएको छ ।

इकाईस्-नेपालको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । साधारण सभा यसको सर्वोच्च अंग हो । साधारण सभाले दिएको नीति निर्देशनले इकाईस्-नेपालका दैनिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुन्छ । कार्य समितिमा ७ जना सदस्य र २ जना सल्लाहकार छन् । कार्य समितिको गठन निम्न बमोजिम छ ।

नाम

डा. देवेन्द्रप्रसाद चापागाई

पद

अध्यक्ष

श्री घनश्याम अन्स्थी

उपाध्यक्ष

श्री रुद्रप्रसाद देवकोटा

सचिव

श्री गोकर्णराज अर्याल

कोषाध्यक्ष

श्री नरहरी ढकाल

सह-सचिव

श्री बन्धुव्रज गुरुङ्ग

सदस्य

सुश्री निना रिजाल

सदस्य

इकाईस्-नेपालले आफ्नो जीवनका १६ वर्षमा देशका विभिन्न ३५ जिल्ला विशेषतः दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको छ । यस अवधिमा हामीले स्थानीय, देश भित्रका तथा देश बाहिरका सरकारी तथा नैर सरकारी संस्थाहरू र दातृ निकायहरूसँग काम गरी विविध क्षेत्रमा अनुभव संगालेका छौं । हाल हामी देशका १० जिल्लाहरूमा १५ भन्दा बढी योजनाहरू कार्यान्वयनमा सलग्न छौं ।

इकाईस्-नेपालको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । देशका आठ जिल्लाहरू (बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली, वारा र धादिङ, काभ्रे, उदयपुर) मा शाखा कार्यालयहरू छन् । केन्द्र र शाखा कार्यालय तथा आयोजनाहरूमा सहित भण्डै १०० जना कर्मचारी हामीसँग काम गर्दैछन् ।

इकाईस्-नेपाल स्थानीय, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, दातृ निकायहरूसँग मिलेर देशका गरीब र पिछ्छिएका क्षेत्रहरूमा काम गर्न जुटेको छ र तिनै आवश्यक ठाउँहरूमा कार्यक्रम संचालन गर्ने यसको नीति छ । अतः हामी आफ्नो नीतिसँग मेल खाने निकायहरूसँग मिलेर काम गर्नु भन् उपयुक्त देख्यौं । यदि तपाईंको हामीसँग काम गर्ने चाहना वा अवस्था छ भने अथवा तपाईं हाम्रो बारेमा अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग संपर्क राख्नु होला ।

संपर्क ठेगाना:

श्री कार्यकारी निर्देशक

इकाईस्-नेपाल,

पोस्ट बक्स नं. ८११५, काठमाडौं ।

फोन: ४६०२२३४

email: ecards@wlink.com.np

web: www.ecards.org.np

हाम्रो भनाइ

हाम्रो देशका धेरै जसो मानिसहरू कृषि पेशाबाट आफ्नो जीवन धानी रहेका छन् । कृषि पेशाले खेतीपाती र पशुपालनलाई समेटेछ । राम्रो खेती गर्नको लागि राम्ररी पशुपालन गरेको हुनपर्छ र राम्रोसँग पशुपालन गर्नको लागि खेतपाती पनि राम्रोसँग गरेको हुनुपर्छ । पशुपालनको लागि चाहिने घास, पराल, दाना आदि खेतीपातीबाट पाइन्छ भने बालीको लागि मल पशुपालनबाट आउँछ । यसरी बाली उत्पादन र पशुपालन एक अर्काका आधारित छन् । यसकारण कृषकलाई यी दुवै कृषाकालापको उत्तिकै महत्त्व छ । यस परिवेशमा गाउँस्तरमा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान र सीप साथै कृषिका विभिन्न विधाहरू (उन्नत अन्न खेती, फलफूल खेती, आलु साथै तरकारी खेती तथा बाली विरवाहरूमा लाग्ने रोग किराहरू र तीनका रोकथाम तथा उपचार) बारे ज्ञान भएको मानिस गाउँमा हुनु चाहिँ आवश्यक भएको कुराको महशुस इकाईस्-नेपालले १६ वर्ष भन्दा बढी देशका विभिन्न भागका गाउँघरहरूमा काम गरेको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । यसै व्यक्तिहरूको व्यवस्था गर्न विभिन्न निकायहरूसँग सहयोगमा इकाईस्-नेपालले कृषि विकास तथा पशु स्वास्थ्य बारे गत केही वर्षदेखि कृषि तथा भेटीनरी कार्यकर्ताको तालिम गर्दै आएको छ । यसरी तालिम पाएका गाउँका ती अनुवा कृषकहरूले आफ्नो गाउँमा गइ बसेर तालिममा सिकेका विभिन्न शीपहरूलाई गाउँमा परी आउने कृषि तथा पशुपालनका विभिन्न समस्याहरूसँग जुम्नेर ती समस्याहरूको समाधान गरी कृषकका सच्चा सहयोगी बन्न पुगेका उदाहरण र अनुभवहरू हामीसँग छन् । यसै शिलशिलामा ती तालिम कार्यक्रमहरूमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको सकलन गरी एउटा सहयोगी पुस्तक निकाल्ने मनसायले इकाईस्-नेपालले यो प्रयास गरेको छ । यो पुस्तक कृषि र पशुपालन कार्यमा विभिन्न तालिम लिई ग्रामीण कृषि सहायक वा ग्रामीण पशु सहायक साथै अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट रही ग्रामीण क्षेत्रमा कृषकहरूका दैनिक सरोकारका विषयमा कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताहरूलाई उपयोगी हुने हामीले देखेका छौं । यसको उपयोग यहाँहरूकै हातमा छोडेर यहाँहरूबाट भएको यसको उपयोग र यसमा रहेका कमी कमजोरी बारे हामीलाई जानकारी दिनुहुन संबन्धित सबैलाई इकाईस्-नेपाल अनुरोध गर्दछ । त्यसो भएमा आगामी संस्करणहरूमा यसलाई परिमार्जित गरी अझ उपयोगी बनाउने प्रण गर्दछौं ।

यस पुस्तकबाट पाठक वा प्रयोगकर्ताले पशुपक्षीका सामान्य रोगहरू र तिनका औषधि, आन्तरिक परीक्षी, पशु बन्ध्याकरण, पशु सेवासँग सम्बन्धित विविध पक्षहरू बारे प्रारम्भिक ज्ञान एवं सिप, कृषि (विशेषतः बाली संरक्षण, वागवानी, रासायनिक मल) साथै सहकारीको महत्त्व र संचालन साथै कृषि ऋण सम्बन्धित ज्ञान र मत्स्य पालनसँग संबन्धित विभिन्न

अगुवा कृषक र निजको कार्यक्षेत्र

जानकारी पाउने छन् । यो पुस्तक इकाईस्-नेपालले विभिन्न दातु तथा सहयोगी संस्थाहरूसँग मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, दोलखा, मकवानपुर, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा संचालित तालिमका सामग्रीहरू र आफ्नै संस्थाका विशेषज्ञहरूबाट लेखिएका विषय वस्तुहरू पनि समावेश गरी तयार गरेको हो । अतः उक्त दातु संस्थाहरू र ती तालिम कार्यक्रममा संलग्न भएका साथै यो पुस्तकलाई यस रूपमा ल्याउन सहयोग गर्ने सबै विज्ञहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । पुस्तकका कति ठाउँहरूमा एकातिर भाषागत स्थानीयता भेटिएला त अर्कोतिर अंग्रेजी भाषाको बढी प्रयोग भएकोले कति प्रयोगकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । अंग्रेजी शब्दहरूको प्रयोग हाम्रो वाध्यता हो किनभने धेरैजसो औषधिहरूको नाम अंग्रेजीमा मात्रै भेटिन्छन् । यी वाधाहरूलाई छिचोल्दै संबन्धित सबैले यो पुस्तकबाट बढी भन्दा बढी लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहना र कामना छ ।

यो पुस्तकको पहिलो संस्करण २०६० साल वैशाखमा निस्केको हो । यसको उपयोगिता हामीले अपेक्षा गरे भैं नै हुन गएको पथार्थ यस संस्करणका सबै प्रति सोचे भन्दा पहिले नै वितरण भै सके । हामीलाई यस पुस्तकको मागको चाप खेप्न गाह्रो भएतापनि विविध कारणले यसलाई चाडै प्रकाशमा ल्याउन नसकेकोमा माग पेश गर्नु भएका सबै जिज्ञासुहरूसँग हामी क्षमा माग्दछौं र हिलै भए पनि यसलाई तपाईंहरूको हातसम्म ल्याउन पाउदा हामी धेरै खुशी छौं र यसका पाठक तथा उपयोगकर्ताहरू प्रति आभारी व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको शुभेच्छाको चाहना राखेका छौं भन्ने व्यहोरामा छुलन चाहन्छौं ।

पहिलो संस्करणमा विविध प्रतिकृया मध्ये पशुसँग सम्बन्धित जानकारी पुरानो भए पनि बाली सम्बन्धी जानकारी कम भएको भन्ने गुनासोलाई हामीले अझै कम गर्न सकेका छैनौं । यसको लागि सहृदयी पाठकहरूसँग क्षमा याचना गर्दै चाडै दोश्रो संस्करण लिएर तपाईं समक्ष आउने प्रण गर्दछौं । हाल यसलाई पहिलो संस्करण कै पुनःमुद्रणको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेका छौं ।

हाम्रो देशका कृषक दाजुभाई, दिदीबहिनीका दिनानुदिन पर्ने कृषि प्रविधि सम्बन्धी समस्या पहिल्याई ती समस्याहरू समाधानमा केही योगदान भएको कारणले हामी आफ्नो प्रयास सफल भएकोमा खुशी छौं र आगामी दिनहरूमा यो पुस्तकलाई अझ उपयोगी बनाउन सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं ।

२४ असोज २०६४

इकाईस्-नेपाल

इकाईस्-नेपालको दृष्टिमा सामान्यतया कृषि र पशु पालन व्यवसायमा लागेको, त्यस सम्बन्धमा ग्रामीण स्तरमा कृषि विकास सम्बन्धी सल्लाह दिने, पशुपक्षीको साधारण उपचार गर्न सक्ने साथै कृषि र पशुपालन सम्बन्धी नयाँ प्रचार प्रसार गर्ने कृषकलाई अगुवा कृषक भन्न सकिन्छ । अतः गाउँमा रहने एउटा अगुवा कृषकले सामान्यतः निम्न बमोजिम काम गरी आफ्नो नाम सार्थक बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमहरू समूहगत रूपमा संचालन हुने हुनाले आफ्नो गाउँमा कृषक समूहहरू गठन र परिचालन गर्ने वा सो कार्यमा सहयोग गर्ने । साथै ती समूहहरूलाई जिल्लाका कृषि तथा पशु विकासमा संलग्न निकायहरूका काम कारवाही बारे पनि जानकारी गराएर ती कार्यक्रमहरूबाट फाइदा लिन सक्ने बन्न समेत सहयोग गर्ने ।

कृषक समूहहरूको बैठकमा भागलिई कृषि र पशु बजार सम्बन्धी काममा सहयोग गर्ने ।

कृषि, पशु सेवा केन्द्र, उपकेन्द्रको लक्ष्य र माग अनुसार गा.वि.स. स्तरीय तालिम संचालनमा सहयोग गर्ने ।

कृषि ऋण तथा सामग्री चाहने कृषकहरूलाई आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा लिनको लागि सहयोग गर्ने ।

कृषक समूहहरूसँग वातावरण सुहाउंदो खेतीपातीबारे छलफल गर्ने र उनीहरूलाई त्यस प्रविधिमा सरीक हुन सहयोग गर्ने ।

आफूले सिकेका सीपहरूको सुदृपयोग गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुधनको संरक्षण र विकासमा सेवा, टेवा पुर्‍याउने ।

कृषक र कृषि विकास साथै पशु सेवा कार्यालयहरूको बीचमा पुलको रूपमा रही कृषकका समस्या कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरूसम्म पु-याउने र ती कार्यालयहरू माफत आएका नयाँ प्रविधि कृषकको दैलीमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने ।

पशुहरूको लागि औषधी तथा अन्य कृषि कार्यक्रमको लागि आवश्यक कोष (औषधी कोष तथा हितकोष) स्थापना र परिचालन गर्ने सहयोग गर्ने ।

औषधी साथै कृषि सामग्रीको अभाव भएको ठाउँमा कृषि सामग्री तथा औषधी पसल (एग्रोभेट) संचालन गर्ने र यसलाई आफ्नो पेशाको रूपमा अधि बढाउने ।

आफ्नो गाउँ वा कृषक समूहमा उन्नत जातको अन्नवाली, फलफूल, तरकारी तथा अन्य नयाँ कृषि प्रविधि साथै उन्नत पशु पालन प्रविधिको उचित प्रयोगको लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

यसरी गाउँमा रही कृषकहरूलाई सेवा पुर्‍याएमा उक्त सेवा पुर्‍याए बापत नौजहले पाउने "मेवा" ले स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि निर्जना हुने कुरा स्पष्ट छ । यसरी देशका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा कम से कम एकजना यस्तो काममा लाग्ने अगुवा कृषक हुन अत्यावश्यक भएको कुरा इकाईस्-नेपालले महशुस गरेको छ । अतः यस कृषि तथा पशु विकासकोलागि अत्यन्त जरुरी व्यवस्थाकोलागि सम्बन्धित गा.वि.स., वि.वि.स., जिल्लास्थित सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नैर सरकारी संस्थाहरूले समेत तुरन्त ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।

नेमाकोल

नेपालमा सर्वप्रथम संगठित रूपमा अनुभवी एवं दक्ष कृषि स्नातकहरुको समूहद्वारा सञ्चालित नेपाल बहुदेशीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नेमाकोल (NEMACOL) को मुख्य उद्देश्य नै कृषि व्यावसायमा संलग्न कृषकहरुलाई चाहिने कृषि सामग्री, प्राविधिक तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादनमा सक्दो योगदान पु-याउनु रहेको छ ।

नेमाकोलबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु

१. तरकारी, फलफुल, अन्नबालीका उन्नत एवं वर्णशंकर जातका बीउबिजनका साथै विभिन्न कृषि उपकरणहरु
२. कीरा/रोगनाशक विषादी एवं सूक्ष्म तत्व, मलखादहरु ।
३. चीनमा उत्पादित पेन्सीबाओ मलखाद ।
४. माहुरी पालन तथा रेशम खेति सम्बन्धी उपकरण एवं सूक्ष्म जैविक मल ।
५. कृषि व्यावसायहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, तालिम तथा कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा सहयोग
६. गडयौला खेति सम्बन्धी परामर्श सेवा तथा गडयौला साथै भर्मि कम्पोष्ट ।
७. मौरी एवं शुद्ध मह ।

नेपाल बहुदेशीय कृषि सहकारी संस्थान लिमिटेड (नेमाकोल)
NEPAL MULTIPURPOSE AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY LTD (NEMACOL)
कालीमाटी, काठमाण्डौ
पो.ब.नं. २०४८०
फोन नं. ०१ ४२७८५६४, २२०००७३

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पेज
१.	पशुपक्षीहरूको शारीरिक संरचना तथा बाह्य अंगहरूको पहिचान	१
२.	निरोगी तथा रोगी पशुहरूमा भिन्नता	७
३.	पशु पक्षीहरूको शारीरिक तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया	१०
४.	पशुको शारीरिक तौल पत्ता लगाउने तरिका	१३
५.	पशुको प्राथमिक उपचार	१४
६.	पशुहरूको स्वास्थ्य परिक्षण	१७
७.	क्लिनिकल व्यवहारिक ज्ञान	१८
८.	एण्टिबायोटिकस् बारे सामान्य जानकारी	२१
९.	पशु पक्षीहरूको लागि गोठ तथा खोरको व्यवस्था	२३
१०.	गोठ र खोरको सफाईमा प्रयोग हुने विभिन्न रसायनहरू ... विधि	२५
११.	जनावरलाई काबुमा ल्याउने तरिका	२७
१२.	पशु उपचारमा प्रयोग हुने सामान्य औजारहरू	३१
१३.	औजार तथा उपकरणहरूको निर्मलिकरण	३४
१४.	पशुहरूमा सुईले औषधि प्रयोग गर्ने तरिका र सिरिन्ज	३६
१५.	बजारमा उपलब्ध पशु औषधि, प्रयोग गर्ने तरिका तथा माध्यम	४२
१६.	औषधिहरूको समूह विभाजन	४३
१७.	आयुर्वेदिक औषधिको पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग	४५
१८.	स्थानीय जडिबुटीको पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग	४७
१९.	बोटविस्वाहरूबाट लाग्ने विष र उपचार	४८
२०.	औषधिहरूको हेरचाह, भण्डारण तथा संरक्षण गर्ने विधि	४९
२१.	औषधि बिक्रेताको काम, कर्तव्य तथा औषधि बिक्रेतामा हुनुपर्ने गुणहरू	५१
२२.	नेपालमा उत्पादित विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू, विधि	५२
२३.	प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने	५६
२४.	गोबर परीक्षणको लागि स्याम्पल पठाउने तरिका	५७
२५.	महत्वपूर्ण औषधिहरूको प्रयोग	५८
२६.	प्रेस्कृप्सन अनुसार औषधि बिक्री प्रयोग	६२
२७.	कुनै जनावरलाई दिन नहुने औषधिहरू	६२
२८.	जनावरमा औषधि र खोप प्रयोग गर्ने तरिका तथा माध्यमहरू	६७
२९.	आलो घाउबाट रगत बगेको रोक्ने तथा छालामा टाँका लगाउने विधि	६९
३०.	आँखा पाक्ने तथा रोकथामका उपायहरू	७३
३१.	कान पाक्ने रोग	७५
३२.	भाँचिएको, मर्किएको हाड तथा जोनीमा काप्पी बाँध्ने तरिका	७६

१०३. काउली जालका तरकारी खेती उत्पादन प्रविधि	२६५
१०६. काउली, बन्दा बालीमा लाग्ने मुख्य शत्रुहरू उत्पादहरू	२७३
१०७. जरे तरकारी मुला, गाजर, सलगमको उत्पादन प्रविधि	२७६
१०८. जरे तरकारी बाली समूहको उत्पादहरू	२७८
१०९. जरे तरकारी बाली समूह (मूला, गाजर, सलगम, चुकन्दर) का रोगहरू	२८१
११०. गोलभेंडा तथा भन्टा खेती	२८४
१११. गोलभेंडाको रोग तथा किरा र तिनको नियन्त्रणका उपायहरू	२८६
११२. भन्टामा लाग्ने रोग तथा किरा र तिनको नियन्त्रणका उपायहरू	२९०
११३. अन्य फल तरकारी समूहको शत्रुहरू तथा तिनको व्यवस्थापन	२९३
११४. गानो तरकारी समूहको खेती प्रविधि	३०८
११५. आधुनिक आलु उत्पादन प्रविधि	३०९
११६. आलुका समस्याहरू र तिनका रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू	३१२
११७. केराउ बोडी र सिमीको उन्नत खेती प्रविधि	३१६
११८. कोसे तरकारी समूहका मुख्य शत्रुहरू उत्पादहरू	३२०
११९. अन्य कोशे (दाल) बालीका मुख्य शत्रुहरू र उपायहरू	३२१
१२०. फलफूलका मुख्य किराहरू, तिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू	३२६
१२१. गहुँमा लाग्ने शत्रुहरू र तिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू	३२९
१२२. फलफूलको रोग र तिनको रोकथाम	३३३
१२३. फलफूल तथा तरकारी नर्सरीमा लाग्ने रोग र किरा व्यवस्थापन	३३८
१२४. तेल बालीमा लाग्ने मुख्य शत्रुहरू उत्पादहरू	३४०
१२५. मकै बालीमा लाग्ने मुख्य शत्रुहरू, उत्पादहरू	३४५
१२६. केराको जाल र आधुनिक उत्पादन प्रविधि	३५१
१२७. किटनाशक विषादीहरू	३५२
१२८. हुरीनाशक विषादीहरू	३५८
१२९. विस्वाबाट किटनाशक विषादी र सो को प्रयोग	३६१
१३०. घरेलु विषादी र रासायनिक विषादीबीचमा फरक र प्रयोग विधि	३६४
१३१. एकीकृत सञ्चालित व्यवस्थापन	३६८
१३२. जीवनाशक विषादीको सुरक्षित परिवहन	३६९
१३३. गाउँघरमा किटनाशक विषादीको भण्डारण	३७१
१३४. ऋण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र ऋण प्रवाह	३७६
१३५. सहकारीलाको माध्यमबाट अगुवा कृषक लाभान्वित हुन सक्छन्	३८१
१३६. सहकारीका सिद्धान्तहरू र यसका उपदेयताहरू	३८५
१३७. दोहोरो लेखा प्रणाली	३८९
१३८. रासायनिक मल विक्रेता सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका	३९३

१. पशुपंक्षीहरूको शारीरिक संरचना तथा बाह्य अंगहरूको पहिचान

शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूको वनोटलाई संरचना भनिन्छ । शरीर विभिन्न प्रणालीहरूको संयुक्त रूप हो । शरीरको स्वस्थ अस्वस्थ अवस्था जान्न शरीरका विभिन्न अंगहरूको वनावट बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । आँखाले देख्न सक्ने देखि लिएर सुक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहायताले हेर्नु पर्ने शरीरका अंगहरूको वनावटको समेत शरीर संरचनामा पर्दछ । शरीरमा देखा पर्ने विभिन्न रोगहरूको निदान एवं उपचार सेवा गर्न पशुपंक्षीहरूको शरीर संरचना तथा बाह्य अंगहरूको पहिचान हुन अति आवश्यक हुन्छ । अतः यस पाठमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्नेछौं ।

पशुहरूको शरीर रचना

शरीर कुन कुन तत्व मिलेर बनेको छ भन्ने थाहा पाए पछि मात्र कुन तत्वको कमी शरीरमा भयो भन्ने कुन रोग लाग्दछ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ । भनि त्यही तत्वको कमी हुनबाट बचाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि: पशुको शरीरको ७० देखि ९० भाग पानीबाट बनेको हुन्छ । यदि पशुको शरीरमा पछाला लागेर या अरु कुनै कारणले पानीको मात्रा घट्न गयो भने पशु सुकेर मर्न सक्छ र ठूलो नोक्सानी हुन्छ । त्यसैले अगुवा कृषकले शरीर बन्ने तत्वहरू बारे जान्नु अति आवश्यक छ । तलका पंक्तिहरूमा शरीरको वनोट तथा रचनामा भाग लिने तत्वहरूको बारेमा छोटो जानकारी दिइएको छ ।

शरीर रचना: कुनै पनि प्राणीको शरीर करोडौं कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ । तर वनस्पति र जनावरहरूका कोषहरू अलग अलग हुन्छन् । त्यही भिन्नता थाहा पाउनको लागि चित्र नं. १ मा वनस्पति र जनावरहरूका कोषका प्रकार दिइएका छन् । जनावरको शरीर करोडौंको संख्यामा रहेका कोषहरू मिलेर बनेका टिस्युले बन्दछ । टिस्यु भनेको सानो चोक्रटा जस्तै हो । धेरै टिस्यु मिलेर अंग बन्दछ । अंगहरू मिलेर प्राणीको पुरा शरीर बन्दछ ।


पशुको शरीरको रासायनिक रचना वा वनावट: कुनै पनि प्राणीको शरीर मुख्य पाँच वटा रासायनिक तत्वहरूका साथमा निश्चित मात्रामा अरु पनि तत्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ ।

१) पाँच तत्वहरूको नाम:	२) हाइड्रोजन (H)	३) अक्सिजन (O)
४) कार्बन (C)	५) फस्फोरस (P)	
६) नाइट्रोजन (N)		

६) सल्फर (S)	७) क्याल्सियम् (Ca)	८) सोडियम् (Na)
९) आइरन (Fe)	१०) लकोरिन (Cl)	११) म्याग्नेसियम (Mg)
१२) पोटैसियम (K) आदि		

बिरुवाको कोष

पशुको कोष



A plant cell

An animal cell.

विरवा र पशुको कोष

शरीर संरचनामा भाग लिने तत्वहरूको छोटकरी ब्यानः प्रकृतिमा ११२ जति तत्वहरू छन् । ती मध्ये कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, पोटासियम आदि करिव ६२ तत्वहरू मिलेर प्राणीको शरीर रचना भएको पत्ता लागेको छ ।

शरीरको विभिन्न प्राणालीमा भाग लिने तत्वहरूको नाम तल लेखिएको छः

क्र. स.	शाहीरक प्रणाली	बनेका अंगहरू	अंग बन्नामा आग लिन मुख्य तत्वहरू
१	अस्थिज्वर	२०० भन्दा बढी हाइड्रहरू जस्तै: टाउको, मेरुदण्ड, करंग, खुट्टा, घुडा, जोनी र दातहरू	क्याल्सियम र फस्फोरस आदि
२	रक्त संचार	रगत संचार गर्ने नलिहरू र मुटु	कार्बन हाइड्रोजन, अक्सिजन, फलाम आदि
३	स्वास प्रस्वास	फोक्सो, फोक्सोनालि	कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन आदि
४	पाचन	जिबो, आन्त्रा, भुँडी, मलाद्वार	कार्बन, हाइड्रोजन,

कृषक सहयोगी

2


इकार्ड्स-नेपाल

शारीरिक प्रणाली	बनेका अंगहरू	अंग बननमा भाग लिन मुख्य तत्वहरू
प्रणाली	निस्काशन र प्रजननमा भाग लिन अंगहरू जस्तै: मृगौला, मुत्रथैली ।	अक्सिजन, नाइट्रोजन आदि कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फल्योरेस, क्याल्सियम आदि कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटिन आदि
मुत्र प्रणाली		
प्रजनन प्रणाली	सन्तान बृद्धि गर्ने अंगहरू ।	

पशुको शरीरका बाहिरी अंगहरू चिनाँ

गर्भको शरीरका बाहिरी अंगहरू:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| १) मुख (Mouth) | २) शृङ्गो (Muzzle) | ३) नाक (Nostri) |
| ४) अनुहार (Face) | ५) आँखा (Eye) | ६) कान (Ear) |
| ७) तल्लो च्यापु (Jaw) | ८) निधार (Fore head) | ९) सिङ्ग (Horn) |
| १०) टुप्पी (Poll) | ११) माहा (Dewlap) | १२) घाँटी (Neck) |
| १३) ह्याकुलो (Bristlet) | १४) पातो (Shoulder) | १५) कुहिनो (Elbow) |
| १६) पावुरा (Arm) | १७) नौलखुट्टा (Shank) | १८) गालीगाँठो (Fetlock) |
| १९) खुर् (Hoot) | २०) चौखुर (Dew claw) | २१) जुरो (Hump) |
| २२) ढाड (Back) | २३) कमर (Loin) | २४) फिला (Rump) |
| २५) तिघा (Thigh) | २६) हक (Hock) | २७) पच्छर (Tail) |
| २८) पुच्छरको झुप्पो (Switch) | २९) कलचौडो (Udder) | ३०) पेट (Abdomen) |



गार्डका बाहिरी अङ्गहरू


प्रणवक सहयोगी

इकार्ड्स-नेपाल

- मुख क्यागमदी (Mouth Cavity): दांत जिवाे भएको छाती क्यागमदी (Chest Cavity): मुटु, फोक्सो
- पेट क्यागमदी (Abdominal Cavity): भुइँडी, कलेजो, फियो, सानो आन्दा, ठुलो आन्दा, मूगोल, डिम्यासय
- पेलभीक क्यागमदी (Pelvic Cavity): पोथीको गर्भासय, पिसाब थैली आदि ।


१) अस्थिपञ्जर प्रणाली (Skeletal System): यो हाडले बनेको हुन्छ । अस्थिपञ्जरले शरीरको आकार दिन्छ । साथै सोभो गरि अड्याउने र भित्री नरम अंगहरूलाई जोगाउने समेत काम गर्छ । शरीरलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्दा हाडलाई नै आधार मानिएको हुन्छ । तसर्थ ती भागहरूलाई चिन्न कुन-कुन हाडहरू कहाँ-कहाँ हुन्छ भन्ने जान्नु आवश्यक हुन्छ ।

(Circulatory System):
जानवरको शरीर अत्यन्त
कोषहरूबाट बनेको हुन्छ ।
प्रत्येक जीवित कोष बाँच्न
र कृयाकलाप संचालन गर्न
विभिन्न पौष्टिक तत्व र
प्राण वायुको आवश्यक
परिद्व, सो काम यस
प्रणालीबाट हुन्छ । मुटु,
सिरा, धमनी र रगत
मिलेर रक्त संचार प्रणाली
बनेको हुन्छ । खाना र
अक्सिजन शरीरको विभिन्न
भागमा पुर्‍याउने रक्त




१) वास प्रन्वास प्रणाली (Respiratory System): प्राणवायु (अक्सीजन) युक्त शुद्ध वावा बाहिरबाट फोक्सोसम्म लैजान र रगतद्वारा फोक्सोमा आएको कार्बनडाईअक्साइड जस्ता अनावश्यक तत्व बाहिर फ्याँकेने काम हुन्छ । नाक, गोलिबस, ल्यारिड्स, श्वासनली, ब्रोनकाइ र फोक्साले स्वास-प्रन्वास (सास फेर्ने)को काम गर्छन् । शरीर जिउंदो हुन रगत शुद्ध र सफा हुनु पर्छ । । नाक र फोक्सोले सफा अक्सिजन सहितको वायु भित्र पठाई रगत सफा गर्छन् र असुद्ध खराब कार्बनडाईअक्साईड बाहिर फ्याँकछन् ।

ज्ञाना खाने, पचाउने,
 गन्धको खानाबाट
 पोषणारु सोस्ने तथा
 भयबोको र नसोसीएको
 नाचगरु फाल्ने सम्पूर्ण
 भ्रमगरु पाचन
 प्रणालीमा पर्दछन् ।
 पशुगरुका पाचन
 प्रणाली दुई प्रकारको



५) मूत्र तथा प्रजनन् प्रणाली (Urinary and Reproductive System): जनावरमा मूत्र प्रणाली र प्रजनन् प्रणालीको नजिक सम्बन्ध रहेकोले एकै पटक छलफल गरिन्छ । प्रयोगी ज्ञाना र अरिसंजन रगतद्वारा टिपुमा पुर्‍याइए पछि नयां टिपु बनाउने काम गर्नुपर्छ । त्यस कामलाई Anabolism भनिन्छ । नयां टिपु केही दिन काम गर्छ र नष्ट हुन्छ ।

भएर जान्छ । नष्ट हुने प्रक्यालाई Catabolism भनिन्छ । यी दुवै क्रियालाई एकै पटकमा मेटाबोलिजम् (Metabolism) भनिन्छ । टिस्यु नष्ट हुदा युरिया र युरिक एसिड, कार्बनडाई-अक्साईड, पानी, सल्फेट, परफेट जस्ता शरीरलाई काम नलाने चिजहरू बन्छन् । यिनै चिजलाई बाहिर फाल्ने काम भुज प्रणालीले गर्छ ।



गोरको प्रजनन प्रणाली

मुगौला, मूत्रवाहिनी नली, पिसाब थैली, पिसाब नली आदि भुज प्रणालीका भाग हुन् । शरीरबाट काम नलाने वस्तु बाहिर फ्याक्ने काममा भाग लिने अरु अंगहरू:

- फोक्सोले कार्बनडाई अक्साईड र जलवाष्प फाल्छ ।
 - आन्त्राले नपचेको भोजन दाना आदि फाल्छ ।
 - मूगौलाले युरिया, युरिक एसिड र एमोनिया फाल्छ ।
 - छालाले पसिना युरिया र कार्बनडाईअक्साईड फाल्छ ।
- प्रजनन प्रणालीले सन्तान वृद्धिको काम गर्छ । ती प्रणाली दुई प्रकारका हुन्छन्:
- भाले प्रजनन प्रणालीका अंगहरू: अण्डकोष, स्क्रोटम, भोसिडोफेन्स, स्पर्मेटिक कर्ड, सिंग आदि
 - पोथी प्रजनन प्रणालीका अंगहरू: डिम्बकोष, डिम्बवाहिनी नली, पाठेघर, पाठेघरको सिङ्ग, योनी आदि ।

६) स्नायु प्रणाली (Nervous System): यो नसाहरूको प्रणाली हो र शरीरको सन्धान, श्रोत र माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।

२. निरोगी तथा रोगी पशुहरूमा भिन्नता

पशुहरू स्वस्थ छन् वा रोगी छन् ? कतिपय कुराहरू हामीले झट्ट हेर्दैमा पनि भन्नु सक्छौ । बाहिरी लक्षणहरू, पशुका चाल चलन, व्यवहार, घाँस दाना पानीको खिच आदिबाट वास्तवमा पशु रोगी छ कि छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रोग कस्तो प्रकारको हो ? सरवा हो वा होइन, तुरुन्त उपचार गर्नु पर्ने हो वा होइन, उपचारको लागि रोग पहिचान गर्न अरु के के गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरू पशुको विभिन्न लक्षणहरू र पशु धनिले बताएका कुराहरूबाट यकिन गर्न सकिन्छ । अतः पशुहरू आफै विरामीको अवस्था भएवा आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न नसक्ने अमुक प्राणी भएको कारण लामो विभिन्न आधारहरूलाई विचार गरी पशु रोगी छ वा छैन भन्ने कुरा निर्धारित गर्नु पर्दछ । स्वस्थ र रोगी पशुका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन्, रोग पहिचानको लागि गर्नु पर्ने कुराहरू के के हुन्, संक्षेपमा तल वर्णन गरिएको छ ।

रोगी तथा निरोगी पशुका लक्षणहरू

निरोगी पशुका लक्षणहरू

- झट्ट हेर्दा फुरितला देखिन्छन् ।
- सामान्यतया उभिएको अवस्थामा टाउको शरीरको भन्दा माथि उठेको हुन्छ ।
- भागहरू ठाडा, बरपरको मातारणतर्फ पशु सचेत र सजग भएको जस्तो देखिन्छ ।
- पशुधनिले बोलाउँदा वा अन्य कुनै चाल गर्दा प्रत्यक्ष रुपबाट विभिन्न अभिनय तर्फ सकारात्मक व्यवहार देखाउँछ ।
- भाला, कान, नाक, मुख तथा शरीरमा बाहिरी कुनै पनि क्रियात्मको रोगका संकेतहरू देखिदैनन् ।
- मुख (शुतुनो) सधैं पानी अथवा चरा रहेका ग्रन्थीको रसको कारणले सधैं ओसिलो रहेको हुन्छ ।
- घाँस, दाना, पानी रचाएर खाने गर्दछ ।
- झट्ट हेर्दैमा झोक्रिएको, चहल पहल गर्न त्यतिको नसक्ने देखिन्छन् ।
- टाउको शरीरको लेवल भन्दा तल झुकाएको हुन्छ ।
- श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भन्ने, जिब्रो निकालेर घाँटी तन्काइरहेको हुन्छ ।
- कानहरू लत्रेका, तल तिर झुकेको र पशु बरपरको वातावरणसँग कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउने हुन्छ ।
- पशुधनिले बोलाउँदा वा कुनै आवाज तथा साधनहरूद्वारा चहलपहल गराउन खोज्दा कुनै पनि चाल नगर्ने हुन्छ ।
- आँखाबाट कचेरा बग्ने, मुखबाट प्याल, फिज काढ्ने, नाकबाट बाक्लो सिंगान फ्याक्ने आदि गर्दछ ।
- मुख अथवा शुतुनो सुख्खा भएको देखिन्छ ।
- घाँस, दाना, पानी प्रति कुनै खिच देखाउँदैन ।
- उग्रोडैन वा पाउर मर्दैन ।
- गोबर पातलो र दुर्गन्धयुक्त (गन्हाउने) हुन्छ ।
- गोबरमा मासि(म्युकस) मिसिएको वा आउ

- उग्राउछ वा पाउर मार्छ ।
- साविक बमोजिम पशुले (गाई, भैसीले गोबर र भेडा, बाखाले जुला) घिसा गर्दछन् ।
- घिसाब समयमै सामान्य किसिमले गर्दछ ।
- शरीरको तापक्रम, श्वास प्रश्वास गति साविक बमोजिम हुन्छ ।
- हिड्डुल गर्दा बिना कुनै कठिनाई अवरोध महसुस नगरी खुल्ला रूपले सामान्यसँग हिड्डुल गर्ने गर्दछ ।
- बाहिरी शरीरमा घाउ, चोटपटक आदि केही भएको हुँदैन ।
- शरीरको छाला नरम, चमिकलो र रौहल सफा देखिन्छन् ।
- बसेको अवस्थामा टाउको सिधा गरी कान हल्लाउने र पुच्छर चलाइरहने गर्दछ ।
- गर्भिणी पशुहरू समय पुगेपछि बिना कुनै कठिनाई बच्चा पाउने र साल फाल्ने गर्दछन् ।
- शरीर सधैं हृष्टपुष्ट देखिन्छ ।
- घास दाना बाहेक अन्य चिजबिजहरू खाने बानी प्रायः हुँदैन ।

- परेको जस्तो वा रगत भिसिएको देखिन्छ ।
- घिसाब अति पहुँलो वा रगत भिसिएको रातो देखिन सक्छ र घिसाब गर्दा अस्थिरो महसुस गर्न सक्छ ।
- ज्वरो आउने, स्थायी गर्ने, श्वास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ ।
- राम्रो सँग उभिन तथा सन्तुलन मिलाएर हिँड्न सक्दैन ।
- बाहिरी शरीरमा घाउ, चोटपटक आदि देखिन सक्छ ।
- शरीरको छाला खस्रो, फुस्रो र रौहल फोहोर देखिन्छन् । छालामा रोगका लक्षणहरू देखिन्छन् ।
- बसेको अवस्थामा टाउको भुईँमा वा छतिमा टासिएको हुन्छ र कान तथा पुच्छरको गति केहि पनि देखिँदैन । कहिले काहिँ खुट्टा, घाटी तन्काउने, नजिकमा कुनै आवाज दियो भने तर्सिने आदि लक्षणहरू पनि देखिन्छन् । जस्तै: टिटानस भएको खण्डमा यस्तो हुन्छ ।
- गर्भिणी पशुहरूमा समय नपुग्दै बच्चा जनिमो(जुहिने), बच्चा अडकिने तथा साल नबन्ने आदि हुन्छ ।
- जनावर क्रमिक रूपले दुब्बाउँदै जाने गर्दछ ।
- माटो चाट्ने, कपडा, काठ, कागज आदि सुब्बा वस्तुहरू चपाउने गर्दछन् ।

पेटको अवस्था र गति: उग्राउने जनावरहरूमा पेटको गति के कस्तो छ ? अर्थात् पेटको अवस्था कस्तो छ, जाँच गर्नु पर्दछ । पेट फुलेको छ वा ढाडिएको छ पत्ता लगाउनु पर्दछ । पशुको बायाँतिर पछाडिको अन्तिम करहको हाड र माथि उठेको हाडको बीचको खोपिल्टा(पारा लम्बर फोसा) परेको भागमा हातले छामेर पेटको गति थाहा पाउन सकिन्छ । पेट फुलेको र ढाडिएको अवस्थामा पेटको गति हुँदैन । सामान्य अवस्थामा पेटको गति २ देखि ३ पटक प्रति ५ मिनेट हुन्छ । त्यस्तै गरेर उक्त ठाउँमा हातले हिकोउदा पेट फुलेको भए दमाहा जस्तो आवाज आउँदछ । पेट ढाडिएको अवस्थामा घना महसुस हुन्छ ।

कामपप पशुहरू बाहिर स्वस्थ देखिए तापनि भित्र नाम्ने, गोलो जुका आदिको माया परेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा गोबर जाँच गरेपछि आन्तरिक गर्भिणीको असर छ, छैन थाहा लाग्दछ:


- तापक्रम सामान्य स्थितिमा बढी देखियो भने पशुलाई कुनै रोगको शुभवात भएको सिन्धुन पर्दछ । जस्तै: भ्यागुते, खोरेत, गौगोटी रोगहरूमा ज्वरो अधिकतम आउने गर्दछ । सामान्य भन्दा केहि मात्रामा तापक्रम बढ्न सक्ने सामान्य अवस्थाहरू: घाम, कसरत, रास आदि ।
- भिलक फिबर (सिताङ्ग) रोग, विष लागेको अवस्था र घिटिघिटि भएको अवस्थामा शरीरको तापक्रम सामान्य तापक्रम भन्दा कम हुन्छ ।
- गाई, भैसीमा नाडीको गति थाहा पाउन पुच्छरको फेदमा औँलाले हल्का समालेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्रायः आन्तरिक रोगहरू जस्तो फोक्सो, मुटु, कलेजो आदिमा रोगको प्रभाव परेको अवस्थामा र अधिकतम ज्वरो आएको अवस्थामा नाडीको गति बढी हुन्छ । न्युमोनिया रोग लागेको अवस्थामा श्वास फेर्न कठिन हुन्छ । साथै श्वास प्रश्वास गति पनि तिब्र हुन्छ ।
- पशुहरूमा तापक्रम लिदा गुदद्वारमा थर्मिटर राखी होसियारी पूर्वक लिनु पर्दछ । तापक्रम लिएपछि स्वस्थ पशुमा हुने तापक्रम भन्दा बढी वा घटी के छ हेर्नु पर्दछ ।
- श्वास प्रश्वासको गति थाहा पाउन हातको पन्जाको पछिल्लो भाग नाकको अगाडि राखेर वा छातिको चालबाट एकिन गर्न सकिन्छ ।

वस्तुभाऊ, बोट बिरुवा तथा वालीनालीहरूलाई माया गरेर हुर्काउने गरौं ।

३. पशु पंक्षीहरूको शारीरिक तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वास प्रकृया

तापक्रम भनेको के हो ?

शरीरको तातो वा थिसोपनालाई तापक्रम भनिन्छ । सामान्यतया पशुको तापक्रम मलद्वाराबाट लिइन्छ । तापक्रम उमेर, जात, ब्रास, गर्मी, ठण्डी, धपेडी जस्ता कारणबाट केही थपघट हुन सक्छ । तर पनि सामान्य भन्दा धेरै फरक पर्न गएमा जनावरलाई कुनै प्रकारको रोगको शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले पशु बिरामी छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन तापक्रम लिनु र तापक्रमको बारे जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । तापक्रम थर्मामिटरको सहायताबाट लिइन्छ ।



सामान्य अवस्थाको जनावरको तापक्रम तल दिइएको छ ।

क्र.स.	जनावर	तापक्रम	नाडी दर	श्वास-प्रश्वास दर
१	गाई/भैँसी	१०१	४०-६०	१२-१६
२	भेडा	१०३	६०-८०	१४-२२
३	बाख्रा	१०४	६०-८०	१४-२२
४	बंगुर/बंगुर	२०२	६०-९०	१४-२४
५	घोडा	१००	३५-४५	८-१२
६	खरायो	१०२	१२०-१५०	४०-६०
७	कुबुरा	१०६-१०८	१२०-१६०	२०-५०
८	कुकुर	१०१-१०२	७०-१००	१४-२५
९	बिरालो	१०१-१०२	१००-१३०	२०-३०

नोट: तापक्रम, नाडी श्वास-प्रश्वास विभिन्न कारणले फरक पर्न भए जस्तै विभिन्न पुस्तकहरूमा पनि केही फरक-फरक लेखिएको पाइन्छ तापनि हामीले काम गर्दा कुनै एक तालिकालाई आधार बनाई गर्नु पर्छ ।

नाडी भनेको के हो ?

पशुको ढड्कनको गती नै नाडी हो । हामीले जनावर स्वस्थ, अस्वस्थ के छ भन्ने छुट्याउन नाडी छान्ने (लिने) गरिन्छ । नाडी छान्दा जनावरको जात अनुसार फरक-फरक ठाउँबाट लिने गरिन्छ । जस्तै: गाई, भैँसी, याकको नाडी पुच्छरको नशा (कक्सीजियल आर्ट्री) बाट, घोडाको नाडी तल्लो बंगारामा भागको फेसियल वा मेकसीलरी आर्ट्रीबाट, सानो जनावर जस्तै: कुकुर, बिरालो, भेडा, बाख्राको नाडी पछाडि खुट्टाको साँगोको भित्र भागमा रहेको फिमोरल आर्ट्रीबाट, खरायो, बंगुरको नाडी कानको नशा छामेर लिने गरिन्छ । सामान्य अवस्थाको नाडी माथि दिइए अनुसार हुन्छ । नाडी हेर्दा कमजोर छ वा जोरले चलेको छ, घटबढ के छ, ध्यान दिनु पर्छ ।

श्वास-प्रश्वास प्रकृया भनेको के हो ?

सास शरीर भित्र लिने र बाहिर छोड्ने प्रकृतिलाई श्वास-प्रश्वास भनिन्छ । श्वास-प्रश्वास गती सामान्यतया जनावरको करिबको गतीबाट तथा नाकको फोडा चलेकोबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अर्थात् नाकको फोडामा कपास टाँसेर पनि श्वास-प्रश्वास गती पत्ता लगाउन सकिन्छ । सामान्य अवस्थाको गती भन्दा छिटो वा ढिलो, सजिलो वा अघ्यारो कस्तो किसिमले श्वास फेरेको छ, खोक्ने वा छिक्ने गरेको आधारमा पनि जनावर स्वस्थ र अस्वस्थ के छ थाहा पाउन सकिन्छ ।

तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वास भनेको थाहा पाईसके पछि अब हामीले सामान्य अवस्थाको तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वास गती बारे थाहा पाउनु त्यतिकै आवश्यक छ, जुन तल उल्लेख गरिएको छ ।

तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वास गतीको जाँच गर्दा हामीले जहिले पनि प्रति एक मिनेटका दरले नाच्छौ र त्यो मिनेट भित्रको गती नै सो जनावरको तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वासको गती हो । हामीले मौसम, उमेर, जात, धपेडी जस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै तापक्रम, नाडी र श्वास-प्रश्वासको गती जाँच गर्नु पर्छ ।



जिल्लाका कृषि तथा पशु विकासमा संलग्न निकायहरूका काम कारवाही बारे जानकारी लिई ती कार्यक्रमहरूबाट फाइदा लिन सिकौं ।

४. पशुको शारीरिक तौल पत्ता लगाउने तरिका

शारीरिक तथा व्यावसायीक रूपमा पशुपालन गर्दा पशुको शारीरिक तौल तथा चरभिर पत्ता लगाउन निरन्तर आवश्यक छ । फार्मलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, फार्मबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।

पशुको शारीरिक तौल लिंदा निम्न फाइदाहरू हुन्छन्:

- दाना, पानी तथा घाँसको मात्रा निर्धारण गर्दा शारीरिक तौल अनुसार दिन पर्छ ।
- आहारको अनुपातमा शरीर र शारीरिक तौल वृद्धि भए नभएको अनुमान हुन्छ ।
- घाँस र दानाको सदुपयोग भए नभएको अनुमान गरिन्छ ।
- औषधिको मात्रा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
- मासुको लागि पालिने पशु बिक्री गर्न फाइदा बेफाइदाको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पशुको उमेर पत्ता लगाउदा निम्न फाइदाहरू हुन्छन्:

- पशुको प्रजनन उमेर ठिक छ हैन अनुमान गर्न सकिन्छ ।
- उमेरको अनुपातमा वृद्धि, तौल भए नभएको हेर्न सकिन्छ ।
- फार्ममा प्रजननको लागि राख्ने वा हटाउने अनुमान गरिन्छ ।
- उमेर अनुसार शारीरिक गुण विकास भए नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शारीरिक तौल लिने तरिकाहरू:

- हक तराजुको प्रयोग गरेर ।
- अनुभवीको अनुमानको आधारमा ।

पशुको उमेर पत्ता लगाउने तरिका:

- रेकर्डको आधारमा: रेकर्ड फारममा जन्मेको भित्ति रेकर्ड गरेको आधारमा उमेर पत्ता लगाइन्छ ।
- सिङ्गको घेराको आधारमा: पशु वस्तुको प्रति वर्ष १ घेरा (Ring) बन्ने गर्दछ । ती घेराहरूको संख्या नोट गर्ने र त्यसमा १ जोड्ने र उमेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसमा वातावरणीय प्रभाव तथा खानपान समेतले असर पर्छ । साथै १ वर्ष मुनिको उमेर पत्ता लगाउन पनि कठिन पर्छ ।
- दातको आधारमा पनि पशुहरूको उमेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

५. पशुको प्राथमिक उपचार

पशु लडेर शरीरमा चोटपटक लागेमा वा हाड भाँचिएमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । यसमा पनि यदि जोर्नी खुस्कने भएमा ठूलो पशुलाई त उपचार गर्न प्रायः असम्भव हुन जान्छ । तसर्थ भिरालो र अप्ठ्यारो ठाउँमा गार्ड भैसीलाई लैजान वा चराउन हुदैन । तर सानो पशुलाई तरिका पुर्‍याएर राखी उपचार गरेमा उपचार लाग्न सक्छ ।

लडेर पशु उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ भने तल दिए अनुसारको कुनै एक जोखिम भएको हुन सक्छः

- घाउ चोट मात्र लागेको हुन पनि सक्छ ।
- छुटाको जोर्नी वा शरीरको कुनै भाग मर्केको पनि हुन सक्छ ।
- यी माथिका समस्या केही नभएमा पनि पशुको शरीरको गह्रौं हुने हुनाले नउठ्ने हुन सक्छ ।
- शरीरको कुनै भाग धेरै जसो छुट्टा भाँचिने हुन्छ र कुनै अवस्थामा त गेडी खुस्कने (Dislocation) हुन पनि सक्छ ।

के भएको हो कसरी पत्ता लगाउने ? साधारण चोट पटक भएमा सानो र स्थानीय पशु छिटो उठ्छ तर ठूलो र विकसे पशुलाई उठ्न गाह्रो पर्छ । क) जानावरलाई सजिलोसँग सुत्ताएर वा राम्ररी तानी मिलाएमा र छाभेर हेरेर जाँच गरेमा कहाँ दुखेको छ, कहाँ घाउ लागेको छ; पत्ता लाग्छ । तर कहिले काहीँ शरीरको भित्री भागमा चोट लागेको वा मर्केको रहेछ भने छिटो पत्ता नलाग्न पनि सक्छ । ख) यदि भाँचिएको वा गेडी खुस्केको नै रहेछ भने छुट्टा तान्दा वा छाभेर हेर्दा पत्ता लाग्न सक्छ ।

उपचार कसरी शुरू गर्ने ?

- साधारण चोट पटक मात्र लागेको रहेछ भने टिन्चर आयोडिन वा कुनै पनि उपलब्ध एण्टिसेप्टिक औषधी प्रयोग गरी घाउ राम्ररी सफा गरेर ड्रेसिंग गर्ने ।
- यदि राम्ररी तानेर हेर्दा जोर्नी वा अन्यत्र मर्केको मात्र छ भने पशुलाई आराम दिने र मर्केको ठाउँ पत्ता लगाएर मालिस गरिदिने ।
- भाँचिएको वा गेडी खुस्केको रहेछ भने यसको उपचार गर्नु भन्दा पहिले साह्रै सतर्क हुनु पर्छ । सानो पशुलाई त घटनास्थलबाट उठाएर सुरक्षित ठाउँमा लैजान सकिन्छ तर ठूलालाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान सम्भव हुदैन । यस्तो अवस्थामा घटनास्थलमा नै सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

गाई छुट्टा भाँचिएको रहेछ भने छुट्टाको हाड होशियारी पूर्वक तानेर भाँचेलकै ठाउँमा मिलाएर सफा कपडाले बाधीहाल्नु पर्छ । कहिले काहीँ पुरा हाड नटुटी आधा वा केही भाग मात्र टुट्न वा भाँचिन सक्छ । हातले छाभेर मात्र यो सबै पत्ता लगाउन सकिन्छ । जे होस् भन्दाको प्रकृति हेरेर दुवै पशुलाई एक फिट लामा र साना पशुलाई ६ ईन्च लामा पातलो बाँसका खपडाका टुक्राहरू बनाई सफा कपडा (व्याण्डेज) ले बाँधी उपचार गर्ने सकिन्छ ।

यो उपचार त अझै मात्र हो त्यसपछि सम्भव भए डाक्टर वा पशु सेवा केन्द्रका प्राविधिक बोलाएर प्ल्याटर अफ् पेरिस प्रयोग गरी स्थाई उपचार गर्नु पर्छ ।

यदि गेडी नै खुस्केको भएमा ठूला पशुमा उपचार लाग्न प्रायः असम्भव हुन्छ तर सानालाई टाँड बनाई भाँचिएको भाग निको नभएसम्म सुरक्षित राखेमा उपचार लाग्न सम्भव छ ।

भन्जानक आलो घाउ भएमा गर्ने प्रक्याहरूः

- घाउ कसरी र कहिले भएको हो पत्ता लगाउने
- घाउमा किरा परेको वा आलो घाउ आफ्नै आँखाले हेर्ने ।
- रगत बगिरहेको छ वा रोकिएको छ हेर्ने ।

उपचार कसरी शुरू गर्ने ?

- रगत बगिरहेको छ भने त्यसमा टिन्चर व्यान्जेन, टिन्चर आयोडिन वा अरु कुनै उपलब्ध औषधी प्रयोग गर्ने र यदि नभएमा गाउँमा उपलब्ध हुने जस्तै तेल, बैसार र खरानी पकाएर घाउमा लगाउने वा अरु जडीबुटी पनि प्रयोग गर्नसकिन्छ ।
- यतिले पनि रगत नरोकिएमा आर्टिफर्सप प्रयोग गरी घाउका रगत बग्ने नशाहरू च्यापी दिन सकिन्छ र रगत बन्द हुन्छ । त्यसपछि घाउको प्रकृति हेरी ड्रेसिङ गरी व्याण्डेज गरिन्छ । घाउ नपाकोस् भन्नको लागि पेनिसिलिन सुई पनि ३-५ दिन सम्म दिनुरामो हुन्छ ।

औषधी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूः

- औषधीको मात्रा ठिक हुनु पर्छ । कम भएमा रोग निको हुदैन, बढी भएमा खराब असर गरेर जनावर मर्न सक्छ ।
- विषालु जिवानु जताततै हुने हुनाले औषधी गर्न प्रयोग हुने सबै औजारहरू निर्मलीकरण गरेको हुनै पर्छ ।
- एन्टीबायोटिक्स सम्बन्धी जानकारी यसै पुस्तकमा पनि दिईएको छ ।
- अगुवा-कृषकले आफुले राम्ररी नसिकेको र नजानेको औषधी प्रयोग गर्नु हुदैन ।
- म्याद नाघेका रासायनिक औषधीहरू प्रयोग गर्नु हुदैन ।

- औषधी छरिद गर्दा एक वर्ष भित्रै म्याद नाघ्ने वा सड्ने औषधी किन्नु हुदैन। कुनै पनि रासायनिक औषधीहरू केटाकेटी र पशुले पुग्ने ठाउँमा राख्नु हुदैन।
- चिनी र जून जस्तो देखिने रासायनिक औषधीहरू हावामा पल्लो हुँदा हावा नछिर्ने गरी राख्ने।
- सि.टि.सि. जस्ता तुरन्त उडेर जाने भोल औषधीहरू हावा नछिर्ने गरी राख्ने।
- किटनाशक विषादीहरू जस्तै: वि.एच.सी., सार्थिपिन आदि खाने औषधीसँगै राख्नु हुदैन।
- विषादीको प्रयोग गर्दा हातमा पंजा लगाउनु पर्छ र प्रयोग गरी सके पछि हात साबुन पानीले धुनु पर्छ।
- सुईबाट रोग सर्ने नदिन सुई प्रयोग गरी सके पछि निर्मलीकरण गरेर मात्र अर्को पशुमा प्रयोग गर्नु पर्छ।
- पटक, टि.बी.र रेबीज रोग लागेर मरेको शका लागेमा पशुलाई जलाएर खरानी बनाउनु पर्छ।
- रोगी र निरोगी जनावर अलग अलग राख्नु पर्छ।
- रोगी जनावरको दूध खान खुवाउनु हुदैन।
- सुई लगाउने, सिंग बुर काट्ने र खसी पार्ने काम गर्दा जनावरलाई पुरा काबुमा राख्नु पर्छ।
- सि.टि.सी र लकोरन हाईडेट जस्ता औषधीले जनावरलाई बेहोस समेत पार्ने हुँदा माडमा भिसाएर पशुलाई सजिलो हुने गरी खुवाउनु पर्छ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय,
पशु सेवा केन्द्र, पशु सेवा उपकेन्द्रमा
गर्दै आफ्ना पशुपालन सम्बन्धी
समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस्।

पशुको स्वास्थ्य बारेमा कृषकहरू सधैं सर्तक रहन्छन् र रहनु पनि गर्छ। पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सबभन्दा पहिले टाढाबाट हेर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। एककासि धेरै नजिक जादा पशु तर्सिन सक्छ। हामीले पशुलाई हेरेर पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै कुनै नयाँ चिज वा आभिसलाई देखा तर्सिन्छ वा लाटो भै उभिरहन्छ:

- उल्लेखित भै छटपटाइ रहेको छ वा छैन ?
- एकैति उभिएको छ वा बथानसँग छ ?
- यदि बसेको भए, राम्रो उठ्ने सक्छ वा सक्दैन ?
- ठिकसँग हिड्न सक्छ वा सक्दैन ? खुट्टाहरू ठिक छन् वा छैनन् ?
- सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि ?
- त्यसलाई कतै दुखे जस्तो देखिन्छ कि ?
- भ्राला ठिक छ वा छैन ?
- घट ढाकिएको छ वा छैन ?

पशुको स्वास्थ्य परिक्षण निम्नानुसार ३ तहमा गर्नु पर्छ:

- रोगीको सही इतिहास लिएर।
- रोगी पशुलाई जांच गरेर।
- जनावरको जांच गरेर।

रोगी पशुको सही इतिहास पशुधनीसँग सोधपुछ गरी लिनु पर्दछ।

रोगीका विभिन्न भागहरूको परीक्षण

जनावरहरू: आंखालाई राम्ररी हेर्नु पर्दछ। आंसु वा पिप आएको छ वा छैन ? आंखाको सेतो भागमा केही परिवर्तन आएको छ वा छैन ? विचार गर्नुपर्छ। नाम्ने वा अरु कलेजोको रोग भएमा आंखा पहेलो हुन्छ। ज्वरो भएमा आंखा रातो देखिन्छ। त्यस्तै रगतको कमी वा कुनै जीर्ण रोग भए आंखाको रंग धेरै फिक्का सेतो देखिन्छ।

नाकको प्वालहरू: नाकबाट सिंगान वा अन्य कुनै पदार्थहरू निस्केको छ वा छैन निरिक्षण गर्नुपर्दछ। साधारणतया स्वस्थ पशुको नाक रसाएर ओसिलो भएको हुन्छ। पिप वा बाक्लो सिंगान आएमा यो नाक कान घांटी वा फोक्सो सँग सम्बन्धित रोगको लक्षण हो भन्ने बुझ्नु पर्छ।

मुखः पशुको मुखमा विसर पनि एकैचोटि हात हाल्नु हुदैन । सही इतिहास लिएर हातमा पजा लगाएर मानै निरिक्षण गर्नु पर्दछ । मुखमा घाउं छ कि ? इत्यादि सबै हेर्नु पर्दछ ।

छाती: पशुले सास फेर्दा छाती सधै जस्तो छ वा छैन ? कतै करंग भाषिएको छ कि ?

मुटु: मुटुको धड्कन मुटुमा हात राखेर नराप्नो आवाज छ कि विचार गर्नु सकिन्छ । यदि पशु निरोगी छ भने कान राखेर सुन्न सकिन्छ । विरामी पशुको मुटुको धड्कन अनियमित तथा छिटो छिटो हुन्छ । स्वस्थ पशुको धड्कन नियमित वा एकनासको हुन्छ ।

फोक्सो: पशुले सास फेर्दा निरोगी तथा मोटो पशुमा आवाज सुन्न गाह्रो हुन्छ । तर विरामी पशुले सास फेर्दा सासबाट दुर्गन्ध आउन सक्छ । कुनै पशुमा सिट्टी । सुसेली बजाएको आवाज पनि आउन सक्छ । यसरी फोक्सोको आवाज सुनेर फोक्सो ठिक छ वा छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

पेट: उग्राउने पशुको देखेपट्टि पेटमा थिच्दा ५ मिनेटमा ३ पटक पेट चल्छ । पेट नचलेमा पशु विरामी भएको मान्नु पर्दछ ।

छाला: पशुको शरीरमा पानी पर्याप्त भए नभएको छालाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । छालालाई हातले माथि तानेर छोड्दा त्यो तानिएर नै रहन्छ । वा तान्दा सजिलै तानिने तर तानी सकेपछि तुरुन्तै पहिलेकै ठाउँमा जान्छ कि जादैन ? यदि पशुको शरीरमा पर्याप्त पानीको मात्रा भएमा त्यसरी छाला तानी छोड्दा त्यो तुरुन्तै आफ्नो ठाउँमा फर्कन्छ । यदि पानी कम भएमा छाला तानिएर नै रहन्छ पहिलेको ठाउँमा तुरुन्तै जादैन ।

कल्चौडा: पोथी पशुमा कल्चौडाको राम्रो निरिक्षण गरिनु पर्दछ । कल्चौडाको आकारमा केही परिवर्तन भएको छ वा छैन ? शुनहरू फुटेको छ वा छैन ? शुन सुनिएको, शुनबाट सजिलै दुध बाहिर आउछ वा आउदैन हेर्नु पर्दछ । दुधको रंगमा केही फरक छ वा छैन ? शुन चिसो अथवा तातो छ । निरिक्षण गर्नु पर्दछ ।

७. क्लिनिकल व्यवहारिक ज्ञान

रोगीको घुमे कडी तुरुन्त पत्ता लगाउनुमा पर्छ । रोग पत्ता लागेन भने तबै उपचार खर्च नोक्सान हुन्छ । रोग पत्ता लगाउनु सजिलो छैन । भन्नु पशुको रोग पत्ता लगाउनु अति नै गाह्रो हुन्छ । किनभने पशु स्वास्थ्य जायकालाई पशुले सहयोग गर्दैन । त्यसैले निम्नलिखित क्रमबद्ध तरिकाले रोग पत्ता लगाउने प्रयास गर्नु पर्छ । १) समस्या के हो ? २) समस्याको कारण के हो ? ३) समस्या समाधानका उपायहरू के के हुन ? ४) हामीले रोगीको रोगी कुन चाहिँ समाधानको उपायले निको हुन्छ आदि ।

रोग पत्ता लगाउने तरिका: क) रोगीको इतिहास लिने ख) रोगीको स्थानीय लक्षणहरू बुझ्ने ग) रोगीको जाच गर्ने ।

रोगीको इतिहास पशु धनीसंग सोधेर:

- विरामी भएको कति भयो (अवधि) ?
- पहिला पनि यस्तो भएको थियो कि ?
- कस्ता लक्षणहरू देखिएका थिए ? हाल कस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् ?
- ब्रश जनावरलाई पनि यस्तो भएको छ कि ?
- धामी भान्नी, जडिबुटी आदि पहिला गरेको उपचार बुझ्ने ।

नोट: विरामी पशुको उपचार गर्दै नगरेको, धेरै उपचार गरेर सही नबताएको र भुटो खस्रोत भनेको समेत थाहा पाउनु पर्छ ।

रोगीको घालावरण बुझेर रोग पत्ता लगाउने किनभने रोगी बसेको हुर्केको छैन भन्नुसार रोग लाग्ने पनि हुन्छ । जस्तो:

- उच्च पहाड लेकमा: लहुमूले हुने, बुलु, अंगेरी खाने आदि
- मध्य पहाड: नाभले
- भौसिलो सिम क्षेत्र: क्षेत्र अनुसार रोग हुन्छ ।
- माटोको खनिज तत्वकोफरक: घासमा खनिज तत्वफरक पर्छ र त्यही अनुसार रोग लाग्छ ।

रोग देखिए अनुसार पशुको पुरा शरीरको जांच गरेर रोग पत्ता लगाउने तरिका:

- हेरेर (Inspection)
- छामेर वा थिचेर (Palpation)
- औंलाले टक टक ठोकेर (Percussion)
- सुनेर (Auscultation)

हेरेर रोग पत्ता लगाउने तरिका: शरीरको अवस्था हेरेर आखामा आंसु, चिप्पा, पेट फुलेको आदि । रौं ठाडो के कस्तो छ ? कसरी उभिन्छ, हिड्न सक्छ, सक्दैन । बोलाउदा, धपाउदा कसरी देख्छ, महशुस गर्छ ? शरीर चटक्क मिलेको छ छैन ? बानी ब्यहोरा फरक भएकोछ कि, टोकन, हान्न आउछ की ? छाला उठेको फोका, सुनिएको छ की ? आखा, मुख, कान मिलाएर चलाउछ की चलाउदैन ? बस्दा उठ्दा अप्ठ्यारो पर्छ पढ्न ? आखा, मुख, मलद्वार, मुत्रद्वार, नाकबाट पिप, रगत, पानी, बगेको छ की ? अरु कुनै लक्षण जस्तो पशु बिरामी रहेछ भनेर जान्न सकियोस् ।

छामेर रोग पत्ता लगाउने: दुबेको ठाउं र कति दुबेको छ ? भन्ने कुरा छामेर या धिचेर थाहा पाउन सकिन्छ । छामेर धिचेर थाहा पाइने कुराहरु: कति ठूलो र कति धेरै ठाउँमा दुबेको रहेछ थाहा हुन्छ । दुबेको भाग अगाको अवस्था थाहा हुन्छ । अरु कुनै अस्वभाविक किसिमको केही भए पनि छामेर धिचेर थाहा हुन्छ ।

औंलाले ढक ढक हानेर रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । फुलेको, सुनिएको, पेट फोक्सो र कलेजोको आवाज निरोगी जनावर भन्दा फरक हुन्छ ।

सुनेर रोग पत्ता लगाउने आफ्नो कान पशुको पेटमा जोडेर पेटको र मुटुको आवाज सुन्ने र रोग पत्ता लगाउने । १) डाक्टरी यन्त्र (Stethoscope)को सहायताले पेट गडबड भएको सुनेर रोगी र निरोगी पत्ता लगाउन सकिन्छ । २) एक मिनेटमा पशुको करड पेट कति पटक सुक्ने गरेको छ भन्ने आधारमा रोगी पत्ता लाग्छ । धड्कन भैसीको पुच्छरको फेदको भित्री भागमा छामेर, भेडा बाखा, कुकुर, बिरालो, बंगुरको पछाडिको खुट्टाको भित्र पट्टिको उपर्लो भागबाट पत्ता लाग्छ ।

निष्कर्ष: अगुवा कृषकले आफुले उपचार गर्नु पर्ने रोग पत्ता लगाउन तलका उपायहरु अपनाउनुपर्छ ।

- पशुधनीसंग पहिलाको र अहिलेको इतिहास सोध्ने ।
- आफ्नो आखां र हातले रोगी पशु जाच्ने ।
- आफुसंग भएको थर्मामिटर र Stethoscope को र अरु रोग पत्ता लगाउने औजारको प्रयोग गर्ने ।
- रोगीको नियमित रेखदेख र जांच गर्ने ।
- पशुको अनुहार र हेराई, खाना पचेको नपचेको, पिसाब फेरे नफेरेको, स्वास प्रस्वास कस्तो छ । धड्कन कस्तो छ ।
- अन्तमा आफुले गरेको उपचारले निको भए नभएको हेरी निको नभए सम्म उपचार गरिरहने । यदि रोग आफ्नो खुबी भन्दा बाहिरको छ भने सेवा केन्द्र वा पशु अस्पतालमा पठाउने ।

८. एण्टिबायोटिक्स बारे सामान्य जानकारी

एण्टिबायोटिक्स भनेको के हो ? एण्टिबायोटिक्स भनेको एक थरी सुक्ष्म जीवाणुले उत्पादन गरेको रासायनिक पदार्थ हो जस्तै अर्को थरी सुक्ष्म जीवाणुको बृद्धि र कृयकलपमा रोक लगाउछ ।

एण्टिबायोटिक्सको प्रयोग किन गरिन्छ ?

- जीवाणुको कारणले लागेको रोग निको पार्न ।
- ब्याउ जातीको रसायनले लागेको रोग निको पार्न ।
- ठुला जातको विषाणुले लागेको रोग निको पार्न
- प्रोटोजोवाबाट लागेको रोग निको पार्न भ्यागुले, शुनेलो, चरचरे, छमासे, इन्टेरोटोक्सीमिया आदि रोगलाई निको पार्न ।

एण्टिबायोटिक्स कति किसिमका हुन्छन् ? तल दिए अनुसार एण्टिबायोटिक्स दुई किसिमका हुन्छन् ।

- दुई चार थरि रोगका कारण नाश गर्ने खाले (Narrow Spectrum Antibiotics) जस्तै: पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ओरीयोमाइसिन आदि।
- धेरै थरि रोगका कारण नाश गर्ने खाले (Broad Spectrum Antibiotics) जस्तै: क्लोरोमफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन, ओरीयोमाइसिन आदि ।

एण्टिबायोटिक्स कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

- पाउडर वाउमा लगाउन सकिन्छ ।
- पाउडर पानीमा घोलेर कुछुरालाई खुवाउन सकिन्छ ।
- गोली र क्याप्सुल मुखबाट खुवाउन सकिन्छ ।
- बोल्स (गोली) पाठेघरमा राख्न सकिन्छ ।
- सुई मासुमा दिन सकिन्छ ।
- सुई नशामा दिन सकिन्छ ।
- मलहम आखामा लगाउन सकिन्छ ।
- मलहम शुनेलो भएको शुनबाट कल्चौडोमा राख्न सकिन्छ ।

एण्टिबायोटिक्स मात्रा फरक पार्ने तत्वहरु के के हुन् ?

- उमेर: कलिला बच्चालाई कम्ति मात्रा चाहिन्छ ।
- शारीरिक तौल र आकार: सानो जातको लागि मात्रा थोरै र ठूलो जातलाई केही बढी पर्न जान्छ ।
- लिंग: पोथी जातीलाई केही कम मात्रा चाहिन्छ ।
- हावापानी: सुख्खा र जाडोमा बढी मात्रा चाहिन्छ ।
- औषधी दिने समय: खाली पेटमा बढी लाग्छ ।
- कसरी दिने: नशामा सुई लगाउदा, कम औषधीले छिटो असर गर्छ ।

बजारमा पाइने केही एण्टिबायोटिकसहरू

क्र.सं.	एण्टिबायोटिकको नाम	मात्रा	प्रयोग विधि
१	पेनिसिलिन सुई	४,००० देखि २०,००० युनिट के.जी. शारीरिक तैल (१ ग्राम पेनिसिलिन भनेको १० लाख युनिट हो) ।	दिनको ६ पटक सम्म सुई लगाउने
२	स्ट्रेप्टामाडिसिन सुई (मासुमा वा छालामुनि)	ठुलो पशु १ (२ ग्राम दिन सानापशु ४० मि.ग्रा के.जी. शारीरिक तैल दैनिक २) ४ मात्रामा बाँडेर ।	दिनको ६ पटक सम्म सुई लगाउने
३	क्लोरोफेनिकल (USP) (छालामुनि सुई)	४० मि.ग्रा.के.जी. शारीरिक तैल ।	दिनको ३-४ पटक ।
४	टेटासाईक्लिन (USP) क्लोराइड IV	ठुलो पशु १०-२० ग्राम दिन सानापशु ४०-१०० मि.ग्रा प्रति के.जी. शारीरिक तैल ।	कुछुरा ४-६ मि.ग्रा, १/म गोति वा पाउडर दिनको ३-४ पटक खेवाउने ।
५	अक्सिटेट्रासाईक्लिन हाइड्रोक्लोराइड IV	ठुलो पशु २-४ ग्राम दिन र सानापशु ४० मि.ग्रा प्रति के.जी. शारीरिक तैल ।	दैनिक सुई लगाउने ।

एण्टिबायोटिकको मात्रा अडकलन अगुवा कृषकले जान्ने पर्ने नापतौल:

- १ लि.सि., १ एम.एल, १ मि.ग्रा., १ ग्राम र १ मि.सि. सबैको तैल एउटै हुन्छ ।
- १००० माइक्रोग्रामको १ (एक) मिलिग्राम हुन्छ । १००० मिलिग्रामको एक ग्राम हुन्छ ।
- Oxytetracycline Injectable Solution (Tetracyclin) 30 ml को बोतलबाट मात्रा अडकल गर्ने तरिका: प्रत्येक एम.एल. मा ४० मि.ग्रा. Oxytetracycline Hydrochloride (I.P.) हुन्छ । जम्मा ३० एम.एल. ह ४० मि.ग्रा. १५०० मि.ग्रा. खास औषधी रहेछ । जुन चाहि १.५ ग्राम मात्र Oxytetracycline हो । त्यसकारण ३० एम.एल. मा १.५ ग्राम घटाउँदा २८.५ एम.एल. तैलमा घोलेर सुई बनाएको रहेछ । ३० एम.एल.को टेरासाईक्लिनको सुईमा २८.५ एम.एल. तैल र १.५ ग्राम Oxytetracycline रहेछ ।
- कुनै ३०० के.जी. शारीरिक तैल भएको भैसीलाई टेरासाईक्लिन कति एम.एल. सुई दिने भनेर हिसाब निकाल्ने तरिका: औषधी बनाउने कम्पनीले भैसीको लागि तोकोका मात्रा २ देखि ४ मिलिग्राम प्रति के.जी. शारीरिक तैल दैनिक हो । २ मिलिग्राम प्रति के.जी.का दरले हिला ३०० के.जी. को भैसी १२०० मि.ग्रा. Oxytetracycline को लागि २४ एम.एल. हिनु पर्छो ।


नोट: १) कम्पनीले तोकेको मात्रा र आदेश अनुसारमान्य औषधी प्रयोग गर्ने । २) औषधीको बोतल वा प्याकमा लेखिएको I.P. ले इन्डियामा बनाएको, B.P. ले बेलायतको शुत्रले बनाएको र U.S.P. ले अमेरिकाको शुत्रले त्यस प्याक वा बोतलमा राखिएको औषधी बनाएको भन्ने बुझिन्छ ।

९. पशु पंक्षीहरूको लागि गोठ तथा खोरको व्यवस्था

पशु पंक्षी पालन एउटा रोजगारी तथा आयमुलक व्यवसाय हो । यो व्यवसाय किसानहरूको एउटा आयश्रोतको पेशा पनि हो । त्यस कारण पशु पंक्षी पालन गर्दा गोठ खोरको आवश्यक व्यवस्था गर्नु अति जरुरी छ । निम्न अनुसार पशु पंक्षीहरूको गोठ खोरको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

गार्ह/भैसीको गोठको व्यवस्था:

- गोठ निर्माण गर्दा गोठमा जाने बाटो र स्वच्छ पानीको सुविधा हुनु पर्छ ।
- गोठ अलि अग्लो ठाउँमा हुनु पर्छ ।
- गोठमा प्रकाशाधाम) लाग्ने र सफा स्वच्छ हावा बहने हुनु पर्छ ।
- गोठको भुईँ पक्का र कडा हुनु पर्छ सिमेन्ट लगाएको भुईँ चिसो हुने हुँदा बढी सोतर बिछ्याउनु जरुरी हुन्छ ।
- गार्ह भैसीको मलमूत्र राख्ने मलखाल्डो गोठको केही पर खाल्डो खनी बनाउनुपर्छ । गोठजार्ह दैनिक सफा गर्नु पर्छ र समय-समयमा फिन्याल पानी छर्कीरहनु पर्छ ।



- नली गरी**
- गोठमा**
- गोठपचाट**
- पछी फाखा**
- मिच**
- खोरको**
- छोटा**
- बगरमा हुनु**
- पर्छ । खोर**
- निर्माण गर्नु**
- पछि खोर निर्माण गर्ने ठाउँको छनौट गर्नु आवश्यक पर्दछ:**
 - खोर निर्माण गर्ने स्थान अन्य ठाउँबाट अग्लो, घाम लाग्ने र स्वच्छ हावा बहने हुनु पर्छ । कलकारखाना नजिक वा अन्य प्रदुषण हुने ठाउँ हुनु हुँदैन ।
 - जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने हुनु हुँदैन ।
 - बारत, आहार र स्वच्छ पिउने पानी नजिक हुनु पर्छ ।
 - बिरामी भए पछि उपचारको व्यवस्था नजिकै हुनु पर्दछ ।
 - यातायातको सुविधा भएको ठाउँ हुनु पर्दछ ।

बाख्राको खोर निर्माण: बाख्राको खोर निर्माण दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ ।

पुर्णको सतहमा बनाइने खोर: बाख्राको लागि उपयुक्त हुने खोर टाँड बनाएर बनाउने खोर हुन्छ । यस्तो खोर बनाउँदा पक्की वा काठको दुई प्रकारले

बनाउन सकिन्छ । काठको खोर बनाउँदा खम्बाहरू गाढी भुईँबाट १० सेन्टीमिटरको उचाई भएको टाँड बनाउनु पर्छ । टाँड बनाउँदा टाँडमा लगाउने फल्याकको बीचमा १.५ से.मी.को खाली ठाउँ राख्नु पर्छ । जहाँबाट बाखाको मल (जुत्तो) सोझै तल झर्ने किसिमको र बाखाको खुट्टा नअडकिने किसिमले बनाउनु पर्छ । टाँड भन्दा माथि ६ फिटको उचाईमा छाना लगाउनु पर्छ । दिनहुँ तल रहेको जुत्तो सफा गरी बाहिर खाल्डोमा थुपार्नु पर्छ । भुईँ १ प्रतिशतको फिनाएल पानीले सफा गरीदिनु पर्छ । माउ, ब्याउने बाखी र बोकाको लागि अलगगै खोरको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।

खोरमा जमीन (भुईँ) को आवश्यकता:

- भेडा बाखाको लागि १.५ वर्ग मिटर जमीन आवश्यक हुन्छ ।
- पाठा पाठीको लागि ०.३ वर्ग मिटर जमीन आवश्यक हुन्छ ।
- बोकाको लागि २.८ वर्ग मिटर जमीन आवश्यक हुन्छ ।
- ब्याउने बाखीको लागि १.९ वर्ग मिटर जमीन आवश्यक हुन्छ ।

कुखुराको खोरको व्यवस्था

कुखुरा पालन छाडा राखी, पिजडा (केज)मा पाल्ने, डिप लिटर प्रणाली आदि विभिन्न प्रणालीबाट पालिने गरिन्छ तापनि नेपालमा डिप लिटर प्रणाली प्रचलित रहेको छ । यस तरीकामा कुखुरा घरको भुईँमा चिसोबाट बचाउन २-४ इन्च बाक्लो सोतर राखिन्छ । यसको लागि काठको धुलो, पराल कोटेर, धानको भुस आदि प्रयोगमा ल्याइन्छ । यो तरीकाले खोरको भुईँ माटाले पोतेको वा ईट ओख्छ्याएको, सिमेन्ट ढलान भएको भुईँमा कुखुरा पाल्न राम्रो हुन्छ । खोरमा हावा बहने (भेन्टिलेशन)को उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कुखुराको खोर निर्माण गर्दा पानी नजम्ने, केहि ओरालो, घरको मोहडा पूर्व वा दक्षिण र प्रसस्त घाम आउने स्थानमा हुनु पर्छ । गर्मी ठाउँमा झ्याल भुईँबाट २-३ फिटको उचाईमा लगाउनु पर्छ । त्यसको माथी जाली लगाएको हुनु पर्छ । घरको गाह्रोको उचाई ६ फिट, चौडाई ३०-४० फिटसम्म र घुरीको उचाई ७-८ फिटसम्म हुनु पर्छ । छाना जस्ता-पाता, एस्बस्स सिट, टायल, खर, पराल आदि सामग्रीहरू ठाउँ सुहाउँदो प्रयोग गर्नु पर्छ । कुखुराको छाना गाह्रो भन्दा ३ फिट जति बाहिर निस्केको हुनु पर्छ, जसले गर्दा पानीको छिट्टा घर भित्र जान पाउँदैन ।

चल्ला ल्याउनु अघि २ हप्ता पहिले नै कुखुरा राख्ने घरको तयारी गर्नुपर्छ । यसको लागि भुईँ, छाना र गाह्रोमा भएको धुलो सफा गरी पानीले पखाल्नु पर्छ र ४०% कास्टिक सोडा वा फिनाइल पानीले सफा गरेर केही दिन सुक्न दिनु पर्छ । साथै उपकरणहरू फर्मािलिन वा पोटास पानी छर्की झ्याल होका बन्द गरी राख्नु पर्छ । कुखुराको खोर वरिपरि चुन छर्ने गर्नु पर्छ ।

१०. गोठ र खोरको सफाईमा प्रयोग हुने विभिन्न रसायनहरू तथा प्रयोग विधि

गोठमा पशु पक्षी र विरवामा रोग निर्याउन सक्ने कारक तत्व सुक्ष्म जिवजन्तु तथा विषाणु आदि कुनै स्थान वा अजिवीत वस्तुमा रहन सक्ने बाक्लो तयस्वा विषाणुहरूलाई नष्ट पार्न गोठ तथा खोरको सफाई गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसरी गोठ तथा खोरको सफाईमा प्रयोग हुने रसायनहरूलाई डिसाइनफेक्टन्ट (Disinfectant) भनिन्छ । जिवजन्तु नष्ट गर्ने विभिन्न रसायनहरू भएतापनि त्यस्ता उपयुक्त रसायनमा निम्न गुण हुनुपर्छ ।

- गन्ध हुनु पर्छ ।
- गोठमा, पशु पक्षीलाई विषालु हुनु हुँदैन ।
- बजारमा सजिलैसग उपलब्ध हुनु पर्छ ।
- मानवमा खुला राख्दा पनि स्थिर हुनु पर्छ ।
- बगैँडाफुडलाई नोक्सानी नगर्ने हुनु पर्छ ।
- नराम्रो गन्ध नआउने हुनु पर्छ ।
- घरको अवशेष जम्मा हुनु हुँदैन वा रहनु हुँदैन ।

गोठ तथा खोरबाट पशु पक्षीलाई हटाइ सकेपछि त्यस घरको सरसफाई पूर्ण रूपले गरेर पानीले धेरै पटक पखाल्नु पर्छ र भित्ता वा भुईँमा प्वाल आदि भागमा त्यसमा आगोले पोती दिनु पर्छ । त्यस्तै दाना पानीको भाँडो, फूल पाने गुड र अन्य सामग्रीहरू पनि सफा गरेर पानीले राम्ररी पखाल्नु पर्छ । यो भाग गोठ तथा खोरलाई जिवजन्तु रहित पार्न रसायनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

गोठ तथा खोर सफाई गर्दा प्रयोग हुने रसायनहरू:

- पोटासियम परम्यांगनेट (Potassium Permanganate): यो पानीमा भिसिएर गोठ भित्र र वरपर छर्ने सकिन्छ । यो प्रयोग गर्दा ०.१% प्रयोग गर्नु पर्छ ।
- फर्मािलिन: यसको ३% झोल गोठको सफाईको लागि प्रयोग हुन्छ । यो छरे पछि १ हप्ता पछि मात्र जनावर राख्नु पर्छ ।
- क्रिसोल सोप: २%-३% झोल प्रयोग गरिन्छ । यो औषधि छरेको १ हप्ता पछि मात्र जनावर राख्नु पर्छ ।
- फरमलडीहाइड र्यास: यो र्यासको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
- फिनाइल झोल: ३% झोल बनाएर खाली गोठको बाहिर भित्र छर्ने ।
- क्रोसोलिन टी.एच. (Khosolin TH): यसको पनि ३%-४% झोल बनाएर गोठ र खोरमा छर्नु पर्छ ।
- चुना वा चुना पानी: यो पनि गोठ भित्र र बाहिर छर्ने सकिन्छ ।

कुबुराघरमा जिवाणुको संख्या कम गराउने अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू:

- प्रवेश द्वारमा फुट पाथ राख्ने: खोरको प्रवेश द्वारमा कुनै रसायन याखेर खुट्टा त्यसमा डुबाएर मात्र प्रवेश गर्ने । जसले गर्दा शरीर र खुट्टामा आएका जिवाणुहरू भित्र खोरमा जान पाउँदैनन् ।
- कपडालाई जिवाणु रहित बनाउने: भित्र जता शरीरमा रसायनको झोलले स्पे गर्ने ।
- कुबुरा फार्ममा लैजाने ट्रक, सवारी साधन र अन्य उपकरणहरू जिवाणु रहित बनाउने ।
- कुबुराघरबाट जिवाणु हटाउने: कुबुराघर खाली भए पछि सर्व प्रथम घर भित्र रहेको सुली सोतर आदि हटाएर पानीले राम्रोसँग बुस लगाएर सफा गर्ने । त्यस पछि मात्र जिवाणु हटाउने रसायन (Disinfectants) को प्रयोग गर्नु पर्छ ।
- चल्ला काड्ने फुल, दाना, तथा सोतरलाई किटाणु रहित पार्नु पर्छ । यस्तो बेला फरमल्डीहाइड ग्यास फ्युमिनेसन गर्नु पर्छ ।
- धेरै जसो रसायनहरू कडा फर्ममा (Conceivable) आउने भएको हुँदा तातो वा चिसो पानीमा मिसाएर आवश्यक मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्छ ।

रासायनिक औषधीहरूको प्रयोग सकेसम्म कम गरौं ।

११. जनावरलाई काबुमा ल्याउने तरिका

११.१ वस्तुलाई समाउनु वा नियन्त्रणमा ल्याउनु नै काबुमा ल्याउनु नै ।

११.२ किन काबुमा ल्याइन्छ ?

- जनावर/पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने ।
- उपचार गर्ने तथा औषधि खुवाउन, सुई दिन, खोप लगाउन ।
- ११.३ र आफ्नो सुरक्षाका लागि ।

११.४ वस्तुको बेला, उत्तेजित भएको बेला, भोकाएको बेला, भाले लाग्ने बेला । जनावर सायमा भएको बेला बढी खतरनाक हुने भएकोले यस्तो अवस्थामा नियन्त्रणमा लिन वा काबुमा ल्याउन विशेष ध्यानदिनु वा सतर्क रहनु पर्छ ।

११.५ जनावरलाई काबुमा ल्याउने तरिकाहरू के-के हुन् ?

जनावरलाई काबुमा ल्याउने तरिका जनावर अनुसार फरक-फरक हुन्छन्:


- जनावरमा बाधेर
- जगाडिको एक खुट्टा खुम्च्याएर
- दुई खुट्टाले च्यापेर
- चारै खुट्टा समातेर
- दोरीले लडाएर
- खोर (ट्रैविज)मा याखेर

जनावरमा बाधेर (दुई दाम्बोको फाले लगाएर): ठूला जनावर (गाई, भैँसी)को पछिमा दुई दाम्बो लगाई दुई तिर किलामा तन्काएर बाधी दिँदा जनावर गुनन पाउँदैन । अर्थात् खुट्टामा फाले लगाउँदा उफ्र्दैन र मुखमा मुखालो लगाई दिँदा जनावर कम चल्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ । यो तरिका पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, औषधि खुवाउन र खोप लगाउन तथा डुह्न प्रयोग गरिन्छ ।

जगाडिको एक खुट्टा खुम्च्याएर: यो तरिका घोडालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोग गरिन्छ । यसमा घोडाको अगाडिको कुनै एक खुट्टा हातले उचालेर वा पशुको चौखुरीमा डोरी बाधी जुरो भन्दा पछाडी पेट तिरको भागमा बाधी दिँदा घोडा काबुमा आउँछ । यसबाट उपचार गर्न जाँच गर्न सकिन्छ ।

दुई खुट्टाले च्यापेर: भेडा, बाखालाई दुई खुट्टाले च्यापेर कबुमा ल्याई स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार गर्न सकिन्छ ।

चारै खुट्टा समातेर लडाउने: भेडा, बाखालाई चारै खुट्टा समाती लडाएर पनि कबुमा ल्याइन्छ । यसरी कबुमा ल्याई खसी पार्ने, अप्रेशन गर्ने र उपचार गर्ने काम गरिन्छ ।



ठूला पशुहरू कबुमा ल्याएको

डोरीले लडाएर: डोरीले लडाउने तरीका जनावर अनुसार फरक-फरक हुन्छन् । ठूला जनावरको अप्रेशन गर्ने, खसी पार्ने, बच्चा झिक्न र उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

• गाई/गोरु लडाउने तरीका: लगभग २५ हात लामो डोरीको एक छेउ सिङ्गमा नसुक्ने गरी बाँध्ने र अर्को छेउ पशुको पिछुबाट अर्को तिरको मान्छेलाई (दायाँ/बायाँ) र उक्त डोरी पशुको अधिल्लो खुट्टा मुनीबाट कटाएर पहिलो व्यक्तिलाई दिने । सो डोरी जुरो नजिक समीची पारी तलबाट पहिलो व्यक्तिलाई दिने र पहिलो व्यक्तिले सो डोरीको चाके हाड निर सान्नी पारी पछाडि लैजाने । १/२ जना बलिया मान्छेले पछाडिको डोरी र १ जनाले अगाडिको डोरी तान्ने । जनावर ढलीसके पछि १ जना बलियो मान्छेले टाउको थिच्ने र १ जनाले जनावरको चारै खुट्टा (चौबुरी) कसेर बाँध्ने । यसरी लडाउँदा मान्छे कम भए अगाडिको डोरी कुनै खम्बा वा किलामा बाधेर पछाडिको डोरी मात्र तानेर लडाउन सकिन्छ । यो तरीका सबैभन्दा

प्राचीन एवं भरपर्दो कबुमा ल्याउने तरीका मानिन्छ । यस तरीकाबाट खसी पार्ने, अप्रेशन गर्ने, बच्चा तान्न तथा अन्य उपचार गर्न सजिलो हुन्छ ।

भैसी/राना लडाउने तरीका: एउटा सानो लगभग ५ हात लामो डोरीले अगाडिका दुई खुट्टा कसेर बाँध्ने र २५ हात लामो ठूलो डोरीको एक मुखले दायाँ तथा एक मुखले बायाँ खुट्टा बाँधी उक्त डोरीलाई अगाडिको बाँधेको खुट्टाको डोरी भित्रबाट घुसाई पछाडिको खुट्टाबाट निकाली २/३ जना बलिया व्यक्तिले डोरी तान्दै जाँदा जनावर लड्छ । १ जना बलियो व्यक्तिले टाउको पछि अर्कोले (चौबुरी) चारै खुट्टा बलियोसँग बाँध्ने । यस तरीकाबाट घोडा समेत लडाउन सकिन्छ । यस तरीकाबाट खसी पार्ने, अप्रेशन गर्ने, बच्चा तान्न तथा अन्य उपचार गर्न सजिलो पर्छ ।

बोर (ट्रिबिज)मा राखेर: ठूला जनावर गाई, भैसी, घोडाका लागि ठूलो फलामे भा काठको ट्रिबिज बनाइएको हुन्छ भने साना जनावर कुकुर, बिरालोका लागि सानो ट्रिबिज बनाइएको हुन्छ । ट्रिबिजमा राखेर जनावरको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, खोप, डेसिङ्ग, खसी पर्ने काम सजिलो हुन्छ । यसका अलावा साना जनावरलाई कान समातेर, सिङ्ग समातेर पनि कबुमा ल्याउन सकिन्छ भने गाई/रानालाई नत्थी लगाएर पनि कबुमा ल्याउन सकिन्छ । कुकुर र बिरालोको मुख बाधेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।






ठूलो बंगुर बाँधेको



ठूलो बंगुरलाई बाँट्टी मुजुमा रोखेर हिँड्नुको



मध्यम र सानो आकृतिका बंगुर समाउने तरिका



मध्यम आकृतिका बंगुर समाउने तरिका



बंगुरको पाठा समाई रहेको



बाखा समाउने तरिका



खुरापो समाउने तरिका


साना पशुहरू काबुमा ल्याएको

१९. पशु उपचारमा प्रयोग हुने सामान्य औजारहरू

पशु उपचार गर्दा प्रयोगमा आउन सक्ने केही औजारहरूको नाम र प्रयोग यो प्रकारको ताल दिईएको छ ।

सामान्य औजारहरू

- **हड्डिलाईदः** औजारहरू निर्मलिकरण गर्न प्रयोग गरिने भाँडो ।
- **पिचदण्ड** र **स्केचलः** स्लेट र दाविलो जस्तो चक्कु ।
- **गोदर पिस्टनः** सिलौटो (खल) र लोहोरो जस्तो औषधी पिस्ने भाँडो
- **भेजडागल स्केकुलमः** पशुको सुतमा राखेर पाठेघरको मुख हेर्न यन्त्र ।
- **ए.आई.गन** र **प्लाष्टिक सिटः** पाठेघरमा धिर्ध र औषधी राख्न प्रयोग गरिने नली ।
- **दीकार क्यानुलाः** अरु उपचार नलागेपछि फुलेको पेटको हावा निकाल्न प्रयोग गरिने औजार ।
- **हिट साईफनः** शुनलो भएको पिप रात निकाल्ने यन्त्र ।
- **बाईजो क्यास्टेटरः** खसी पार्न औजार
- **शुल क्यानः** घाउ सफा गर्दा प्रयोग गरिने बट्टा जस्तो भाँडो
- **भारदी फर्सेपः** रात रोकन गारा समाउने चिन्टी जस्तो कैची ।
- **मिजरः** कैची ।
- **फर्सेपः** घाउ सफा गर्न रवा समाउने कैची जस्तो औजार ।
- **पि.पी.हयाण्डिल** र **वि.पी. स्लेडः** चिरफार गर्ने ब्लेड ।
- **आईओस्कोपः** आंखाले नशेखिने किकाणु र परजीवी हेर्ने यन्त्र ।
- **बलिंग / ड्रेन्चिंग गन** (Irrigating / Drenching gun): औषधी ख्याउने यन्त्र ।
- **थर्मामिटरः** ज्वरो तापक्रम नाप्ने यन्त्र ।
- **स्टोथेस्कोपः** कानमा राखेर धड्कन सुन्ने यन्त्र ।
- **थिक्टरः** पानी नाप्ने चुन्ने भाँडो ।
- **इन्जेसन बोतलः** भोल औषधी ख्याउने बोतल ।



बलिंग गनले पाठेघरमा बोल्स (चक्की) राखेको



जनानरलाई भोल औषधि खुवाउने तरिका

माइकोस्कोप, ए.आइ.गन र भेजाइनल स्केकुलम, क्यानुला जस्ता कठिन खाले औजारको प्रयोग व्यवहारमा आएपछि मात्रै राम्ररी सिक्न सकिन्छ ।

औजार तथा उपकरणहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रयोग विधि:

- धर्माभितर: यो उपकरण पशु पंक्षीको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ । धर्माभितर भित्र पारो नलीमा भरको हुन्छ । तापक्रम बढेमा पारो बढेर माथिल्लो छेउसम्म पुग्छ र तापक्रम कम भए पछि फेद तिर झर्दछ । तापक्रम नाप्ने इकाई सेन्टिग्रेड र फरेनहाइट हुन् । प्रयोग गर्नु अघि चिल्लो अथवा भेसलिन लगाएमा भित्र राख्न सजिलो हुन्छ । प्रयोग भै सके पछि स्पिटले भित्रको खाले पुछी खाले भित्र जतन साथ सुरक्षित राख्नु पर्छ ।
- सिरिन्ज: शरीर भित्र औषधि पुर्‍याउन शरीरको विभिन्न बाहिरी अंगमा सिरिन्ज, इनजेक्सन वा सुई लगाइन्छ । यो धेरै किसिम तथा आकारको हुन्छ । खास गरी बढी प्रयोगमा जान्नेहरूमा ५, १०, २० र ५० एम.एल.को साइजको हुन्छ । सिरिन्ज ग्लास र सिसा, प्लाष्टिक तथा धातुको बनेको हुन्छ । तर जानावरको लागि प्लाष्टिकको सिरिन्ज प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसमा टुटफुट हुदैन ।
- कास्टीङ रोप (पशु लडाउने डोरी): ३/४ देखि १२ मिटर लामो साइज सुतीको डोरी प्रयोग गर्नु पर्छ । सो नपाइएमा नाइलनको डोरी प्रयोग गरिन्छ ।
- इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रे (ढक्नी सहित): यसमा सिरिन्ज, निडल, टाँका लगाउने सुई, वि.पि. हेन्डील, सिजर, फोरसेप किटाणु रहित राख्न प्रयोग गरिन्छ । यसमा सेभलोन तथा फर्मालिनको झोल (१०:१०००) राखिन्छ ।
- इन्चिड बोतल (औषधि खुवाउने ढुङ्ग्रो): पशुलाई औषधि खुवाउने ढुङ्ग्रो विभिन्न किसिमको (धातु, प्लाष्टिक आदिले बनाइएको) विभिन्न पशुको साइज अनुसारको हुन्छ ।

पशु जन्म र होस पाइप: यो घाउ, पाठेघर, सुत गुद्द्वाराको डुस गर्न तथा सफा गर्ने प्रयोग गरिन्छ ।

पेटोभर षण्ड क्यानुला: यो पेट फुलेको बेला पेटबाट तत्काल हावा वा वायु निस्काने औजार हो । यो जानावरको साइज अनुसारको बनाएको हुन्छ ।

माफा (स्टेथोस्कोप): यो मुटु र फोक्सोको आवाज र अवस्था बारे जाँच गर्ने औजार हो ।

ढक्नी (थिन्जर): सिजर पोष्ट मार्टम तथा शल्य क्रियामा प्रयोग गरिने औजार हो । यो पनि विभिन्न साइजको हुन्छ । बनौटमा सिधा तथा घुमेको आकार हुन्छ ।

फोरसेप (थिन्टर): यो तन्तु तथा अन्य सामान समान प्रयोग गरिन्छ । जस्तै: भाउ सफा गर्दा, शल्य क्रिया गर्दा आदि ।

भाट्टे फोरसेप: रगत बन्द गर्न (नशा च्याप्न) प्रयोग गर्ने औजार आदि फोरसेप हो ।

घाउ भिउने धागो (सुचर थ्रेड): यो विभिन्न वस्तुले बनेको हुन्छ । नाइलन धागो, बाहिरको छाला सिउन प्रयोग गरिन्छ, क्याटगाट: भित्री अंगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ किनकि यो तन्तुमा बिलाएर जान्छ ।

थिन्जर ब्रेड र हेण्डलित: अप्रेसन गर्न, घाउ बनाउन, छाला, मांशपेशी काट्न गी औजारको प्रयोग गरिन्छ ।

बाइभो क्यास्टेटर: यो खसी पार्न प्रयोग परिने मेसिन हो ।

गोचुला र पिलटायल: मलहम बनाउन प्रयोग गरिने पन्थु तथा पत्थर हो ।

बेथ्र मेसिन: औषधि तैलन प्रयोग गरिने तराजुलाई वेड्र मेसिन भनिन्छ ।

इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेरिलाईजर: यो औजार, उपकरण निर्मलीकरण गर्न प्रयोग गरिने भाँडो हो ।

गन्ध/कपास: यो घाउ ड्रेसिङ गर्न प्रयोग गरिन्छ ।


संरक्षण र प्रयोग विधि: पशु उपचारमा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण सामान तथा उपकरणहरू प्रयोग गर्दा सफा तथा किटाणु रहित (स्टेरलाइजेशन) भएको हुनु पर्छ र काम गरी सिद्धिए पछि पनि सामानहरूलाई धोएर सफा गरी स्टेरलाइजेशन गर्नु पर्छ । अनि च्याक वा ट्रेमा भिलाएर राख्नु पर्छ ।

रोग लागेर औषधि गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु राम्रो हो ।

१३. औजार तथा उपकरणहरूको निर्मलीकरण

निर्मलीकरण नगरेको औजारहरू प्रयोग गरी अपरेसन गर्दा रोग फैलाउने तथा घाउ छिटो निको नहुने हुन्छ । त्यसैले निर्मलीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

निर्मलीकरण (Sterilization): कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण रूपले किटाणु मुक्त गर्नुलाई निर्मलीकरण (Sterilization) भनिन्छ । जस्तै: कुनै पशुलाई रोगको विरुद्ध श्याक्सीन तथा सुइ दिनु भन्दा अगावै सामानहरूलाई पूर्ण रूपले किटाणुमुक्त गर्नु पर्दछ । प्रायः प्रयोगशालामा र डिस्पेन्सरीमा भएका सामानहरू जस्तै: फर्सेप, आरडीफर्सेप, सिजर, टिट् साईफन, सिरिन्ज, निडल, ए.आई गन, कांचबाट बनेका औजारहरू इत्यादिलाई निर्मलीकरण गरिन्छ ।



निर्मलीकरण गर्नुपर्ने केही औजारहरू

निर्मलीकरण साधारणतया निम्न तरिकाले गरिन्छ:

- ताप (Heat) द्वारा निर्मलीकरण ।
- रासायनिक पदार्थद्वारा ।
- छान्ने (Filtration) विधिद्वारा

साधारण निर्मलीकरण गर्ने विधि २ प्रकारका छन्:

- शुष्क ताप (Dry Heat)
- नमीबाट तताएर (Moist Heat)

ताप (Dry Heat):

- सामानहरूलाई आगोमा राखेर तताइन्छ भने त्यसलाई (RP) भनिन्छ ।
- सामानहरूलाई तताइन्छ । जस्तै फर्सेप, आरडी फर्सेपको टुप्पा, स्पेचुला, ब्लाइभलका टुप्पा इत्यादि ।

हट एयर ओभन (Hot Air Oven): यो तरिकामा एउटा बाक्स जस्तो ठूलो भाँडाको आकारको उपकरण हुन्छ । जसमा हावालाई तताउने रड तथा पछा फिट भएको हुन्छ । निर्मलीकरण गर्दा यसमा राखिने उपकरणहरू जस्तै ह्याटपुल, पेटीडिस, अलन्वास सिरिन्ज इत्यादि हुन् । यी सामानहरूलाई गरिमा सफा पानीमा धोई कागज अथवा कपडामा लपेटेर बाक्स भित्र राखिनु पर्दछ । त्यस पछि मेथिन चालु गरिन्छ । १६० देखि १८० डिग्री सेन्टीग्रेडसम्म १ देखि १.५ घण्टा तताईन्छ । मेथिन भित्र तापक्रम नाप्ने यन्त्रबाट हुन्छ । जसबाट तापक्रमको नाप लिन सकिन्छ ।

नमीबाट तताएर निर्मलीकरण गर्ने तरिका (Moist Heat) यो तरिकाबाट निर्मलीकरण गर्ने निम्न औजारहरूको प्रयोग गरिन्छ:

- स्टेराइजर् (Sterilizer)
- ओटोक्लेभ (Autoclave)
- दुध प्रशोधन (Pasteurization)

शुष्क तापमा स्टेराइजर् भने एक किसिमको भाँडाको प्रयोग गरिन्छ, जसमा भाँडा र औजारहरू राखिन्छ । यो इलेक्ट्रिक वा आगो बालेर दुवै तरिकाबाट चलाउन सकिन्छ । यसमा १०० डिग्री सेन्टीग्रेडमा आधा घण्टा तताइन्छ । भाँडामा काम लाग्ने यही तरिका हो ।


ओटोक्लेभ (Autoclave): यो प्रेशर कुकर भै विभिन्न साईजको भाँडो हुन्छ । यस भाँडामा पानी र औजारहरू राखिन्छ र उमालेर किटाणुमुक्त गरिन्छ ।

साधारण पदार्थद्वारा निर्मलीकरण गर्दा क्लोरोफर्म, क्लोरिन सोलुसन १ प्रतिशत फिर्मेल १ प्रतिशत फर्मिलिडहाईड सोलुसन २ प्रतिशत इत्यादि रसायनद्वारा उपकरणको निर्मलीकरण गरिन्छ ।

छान्ने विधिद्वारा: छानेर पनि व्याक्टेरियाहरूलाई हटाउन सकिन्छ । यसको लागि फिल्टर पेपरको आवश्यकता पर्दछ ।

१४. पशुहरूमा सुईले औषधी प्रयोग गर्ने तरीका र सिरिन्ज

पशु पंक्षीहरूमा, मानिसमा सुईको माध्यमबाट औषधिको प्रयोग आजकल धेरै मात्रामा गरिन्छ । जति मात्रामा प्रयोग गरिन्छ त्यति नै मात्रामा सुईको प्रयोग विधि संवेदनशील छ । सुई लगाउनु; देख्दा सजिलो लाग्छ तर त्यसको प्रयोग विधि गलत भएमा पशु पंक्षीको अकालमै मृत्यु हुन सम्भ्र्छ । त्यस कारण सुई लगाउने प्राविधिक दक्ष, धैर्यवान, निडर हुनु जरुरी छ । प्रयोग गरिने औषधी सम्बन्धि राम्रो ज्ञान हुनु पर्छ । आफूलाई ज्ञान नभएको औषधि सुई कहिल्यै पनि प्रयोगमा ल्याउनु हुदैन । यसले गर्दा अर्को समस्या खडा गर्दछ ।



सुईद्वारा औषधीको प्रयोग गरेको

पशु पंक्षीमा सुईले औषधी प्रयोग गर्ने तरीका सम्बन्धि विशेष प्रकारको ज्ञान हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो । पशुहरूमा औषधी विभिन्न किसिमबाट प्रयोग गरिन्छ:

- सुईको माध्यमबाट प्रयोग गरेर ।
- मुखबाट खुवाएर ।
- बाहिरी शरीरमा लगाएर वा मालिस गरेर ।

औषधी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

- पशुको किसिम ।
- पशुको अवस्था ।
- रोगको किसिम र अवस्था ।
- औषधीको प्रयोग विधि ।

सम्बन्धि जानकारी: सिरिन्ज र सियोहरू धेरै प्रकार र साइजमा भिन्न भिन्न । सामान्यतया पशुसँग काम गर्दा प्लाष्टिकको सिरिन्ज नै बढी उपयोगी ल्याइन्छ । किनभने प्लाष्टिकको सिरिन्ज बलियो हुन्छ । सुई लगाउँदा पशु घातउला चलेमा खसेर फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ । जबकि सिसाको सिरिन्ज खसेमा फुट्न सक्छ । गाई बैसीहरूमा प्रयोग गरिने सिरिन्जहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् । चलनचल्तीमा निम्न अनुसार सिरिन्जहरू छन्:


- Plastic Syringe
- All Glass Syringe
- Automatic Syringe

Plastic Syringe: यो सिरिन्ज (Syringe) दुई प्रकारको हुन्छ:

- निर्मलीकरण गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने ।
- Disposable Syringe- एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने ।

Syringe तल दिइए अनुसार विभिन्न नापका हुन्छन्:

- | | | |
|---------|---------|----------|
| • 1 ML | • 2 ML | • 3 ML |
| • 5 ML | • 10 ML | • 20 ML |
| • 30 ML | • 50 ML | • 100 ML |



सिरिन्ज र यसका अंगहरू

प्रत्येक सिरिन्जको प्रयोग रोगको अवस्था, औषधिको मात्रा र पशुको किसिम हेरेर प्रयोग गरिन्छ । Syringe मा प्रयोग हुने सियो (Needle) को लागि सियोको नम्बर जति बढी छ, त्यती नै त्यसको मोटाई कम हुन्छ । उदाहरण: गाई बैसीमा ठूलो सियो (१६ वा १८ गजको) राम्रो हुन्छ । बाख्रा, भेडा र कुकुरलाई सानो सियो (१९ वा २० गजको) राम्रो हुन्छ ।

सामान्यतया ठूलो पशुको लागि सियोको लम्बाई १ वा १.५" को हुनुपर्छ । सानो पशुको लागि सियोको लम्बाई १" लामो हुनु पर्छ । गाई बैसीको छाला बाक्लो हुने हुनाले सानो साइजको सियो प्रयोग गर्दा बाझिएर भीच्चन जान्छ । मानिसलाई प्रयोग गरिने सियो कुकुर र साना भेडा बाखालाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सिरिन्ज र निडलको सफाई

पशु पंक्षीहरूलाई सुई लगाउन प्रयोग गरिने सुई सिरिन्ज सधैं सफा हुनुपर्छ । प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले र प्रयोग गरिसके पछि पनि सफा गरेर राख्नु पर्छ । प्लास्टिक सिरिन्जलाई पूर्णतया किटाणु रहित बनाउनलाई उमाल्न सम्भव हुदैन । यसले हाम्रो सिरिन्ज खराब मात्र हुनेछ । प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले र प्रयोग गरिसके पछि उमालेर मनतातो भए पछि सफा पानीले सफा गर्नुपर्छ । सिरिन्ज निडललाई सेभलोन पानीमा डुबाएर राखेमा पनि सफा हुन सक्छ । सिरिन्ज प्रयोगको बेलामा कुनै रसायनिक पदार्थ लागेको हुनु हुदैन ।

सिरिन्ज भर्ने तरीका

पशुलाई काबुमा ल्याउनु अघि नै सुई तयार पार्नु पर्छ । सुई दिने पाउडर औषधि किटाणु रहित (उमालेर सेलाएको) पानीमा पाउडर औषधी राखेर तयार

पानी । भने प्रथम कति पानी मिसाउनु पर्ने हो यकिन गर्नु पर्छ । यदि नानीले औषधि ज्यादा बाक्लो बनायो भने सियोको प्वाल शुनिन्छ र धेरै पानीले पानी भएमा पनि एकै ठाउँमा धेरै मात्रामा सुई दिनु पर्ने हुन्छ ।

माथिभानगा हामीले चाहिने औषधिको मात्रा भन्दा एक एम.एल. कम पानी नानीले भने हामीले चाहे जति मात्रा बन्न पुग्छ । किनकि पाउडरले पनि केही मात्रा भित्रको हुन्छ । उदाहरण: २० लाख इकार्ड भएको पेनिसिलिनको सुई १६ भने त्यसबाट हाम्रो बाखालाई दिन १० लाख मात्र चाहिन्छ । अर्को बर्षमा नानीलाई बोटलको औषधि मध्ये अद्या मात्र आवश्यक हुन्छ । यदि बाखालाई ४ एम.एल. मात्र दिन चाह्यौ भने औषधि ८ एम.एल. हुने गरी बर्षामा १६ । अतः हामीले ७ एम.एल. मात्र पानी मिसायौ भने त्यो ८ एम.एल. हुन जान्छ । अनि ४ एम.एल. (१० लाख) निकालेर मासुमा दिन सकिन्छ ।

१७ नगान्ग्रा विशेष ध्यानदिनु पर्ने कुराहरू

१. भोभस वा अन्य वस्तुमा सुई लगाउँदा सिरिन्ज भित्र हावा रहित हुनु पर्छ । हावाको मात्रा कति पनि हुनु हुदैन । पुरै हावा सिरिन्जबाट निकालेको हुनु पर्छ । हावाले गर्दा कहिले काही पशु मर्ने पनि सक्छ ।

भोभबाट औषधि निकाल्ने तरीका

हामीलाई ४ एम.एल.को औषधि चाहिएको छ भने सिरिन्जमा ४ एम.एल. बाक्ल हावा भर्ने अनि बोटलको रबरलाई छेड्दै भित्र लाने र अब सिरिन्जलाई बोटल भन्दा तल पर्ने गरी समाउने । अतिकति हावा भित्र पठाई अलिकति औषधि भित्रिन्जमा तान्ने । त्यस पछि बाँकी रहेको हावा भित्र पठाएर ४ एम.एल. नआउन्जेल सम्म तानीरहने, अनि सियोलाई बोटबाट निकालेर हामीले बाहि जाँदै औषधि छ/छैन हेर्ने गर्नु पर्छ ।

१८ दिने टाउ: पशुहरूमा सुई विभिन्न स्थानबाट दिइन्छ । यसको लागि पशु औषधिको प्रकार, रोगको अवस्थाको आधारमा सुई विभिन्न तरीकाबाट प्रयोग गरिन्छ । जस्तै:

- I/M (Intra-muscular Injections) मासुमा दिने सुई ।
- S/C (Sub-cutaneous Injection) छाला मुनी दिने सुई ।
- I/V (Intra-venous Injection) नशामा दिने सुई ।
- I/U (Intra-uterine) पाठेघरमा दिने सुई ।



१. सियो गाड्ने ठाउँ रोज्ने । यसका लागि चिन्मा देखाए भैं गरी पत्ता लगाउने ।

२. ठाउँ सफा गर्ने । सफा गर्न डिटोल, सेब्लोन वा रक्सीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

३. सफा गरेको ठाउँमा हल्केलाको पछिल्लो भागले तीन पटक हिकोउन र सियो गाड्ने ।

मासुमा सुई दिने तरिका

भ्याक्सिनहरूको सही प्रयोग

पशुलाई रोग लाग्न नदिन खोपको प्रयोग गरिन्छ । मोटर बाटो र विजुली नभएका अति दुर्गम इलाकाका गाउँहरूमा पशु खोप कार्यक्रम चलाउनु कठीन हुन्छ । यस्तै कठीन परिस्थितिमा खोप गर्ने तरिका मिलाउन गर्नु पर्ने कुरा यसमा छलफल गरिएको छ । भ्याक्सिनहरूको सही प्रयोग कसरी गर्ने ? भ्यागुते र खोरेत भ्याक्सिनहरू (H.S. & FMD Vaccines) चिसो र अँध्यारो कोठामा ८ डिग्री सेण्टिग्रेडको तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ । जथाभावी कोठामा र घाममा राख्न हुन्न । ढुवानी गर्दा नतातोस् भन्नको लागि कागजको पेटी वा बाक्लो प्याक भित्र राख्नु पर्छ । प्रायः सबै भ्याक्सिनहरू तयार गरेको निश्चित समय भित्र प्रयोग गर्नु पर्छ । जस्तै भ्यागुतेको खोप ६ महिना भित्र वा लेखिए बमोजिम लगाई सम्नु पर्छः

- गौगोटि भ्याक्सिन (Preze Dried Goat Tissue Vaccine, FDGTV) बरफमा १-२ डिग्री सेल्सियस भित्र राखिन्छ ।
- एण्टिरेविज् भ्याक्सिनहरू २ देखि ८ डिग्री सेण्टिग्रेड बीचको तापक्रममा राखिन्छ । यो बरफमा राखिदैन । फ्रिजको तल्लो भागमा भण्डारण गर्ने सकिन्छ । गरम मौसममा थर्मसबाट र ठण्डा बाक्लो कागजको पेटीमा प्याक गरेर ढुवानी गर्न सकिन्छ ।
- कुखुराका भ्याक्सिनहरूः सबै बरफमा भण्डारण गरिन्छ । फ्रिज वा थर्मसबाट मात्र ढुवानी गर्न सकिन्छ ।

व्यागुते नरिकाः

- भ्यागुतेको भ्याक्सिन (नेपालमा बनेको) २५० एम.एल. को बोतलमा प्याक हुन्छ । ठूलो पशु जस्तै गाई भैसीलाई बर्षमा दुई पटक ६/६ महिनामा दिनुपर्छ । आश्विन, कार्तिक र चैत-वैशाखमा उपयुक्त मानिन्छ ।

- खोरेत रोगको भ्याक्सिन नेपालमा बन्दैन । भारतको हेन्ट्स कम्पनीमा बनेको भ्याक्सिन नै प्रायः प्रयोग गरिन्छ । यो १०० एम.एल. को बोतलमा हुन्छ । ठूला गाई र भैसीलाई १० एम.एल. छालामा सुई दिईन्छ । साना दूध चुस्ने पाडावाछालाई दिन पढैन । धेरै दूध दिने विकास पशुलाई ६-९ महिना पछि यसलाई दोहोर्चाएर दिन अनिवार्य छ ।

- गौगोटि भ्याक्सिनः यो घाटीको छाला तानेर छालामुनी दिईन्छ । यसको मात्रा १ एम.एल. मात्र हो । एक पटक भ्याक्सिन दिईसकेपछि फेरि दिईरहनु पर्दैन । दूध चुस्ने बाच्छा/पाडालाई दिन जरुरी छैन । दूध चुस्ने छाडेपछि दिईरहनु पर्छ । यो कुनै पनि समयमा दिन सकिन्छ ।

- एण्टिरेविज् भ्याक्सिनहरू २ प्रकारका छन् ।

- पालतु कुकुर विरालोलाई नियमित दिने भ्याक्सिनः रक्षारब टोक्स पहिला रेविजबाट बचाउन लगाउने खोप हो । पालतु कुकुर विरालोलाई १ एम.एल. छालामा वा मासुमा दिईन्छ । वर्ष दिन पछि बुस्टर डोज (booster dose) दिईन्छ । साधारणतयाः रोग नलागेका स्वस्थ पशुहरूलाई मात्र यस्तो प्रकारको भ्याक्सिन दिन पर्छ ।

- टोके पछि दिने (Attler Bite) Vaccine बौलाएका स्याल, कुकुर, विरालो र बाघ मध्ये कसैले घरका पालतु जनावरलाई जस्तै कुकुर, विरालो, गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा र बंगुर मध्ये कसैलाई टोक्यो भने रक्षारब भ्याक्सिन ०, ३, ७, १४, २८, र ९० गरी जम्मा ६ पटक छाला वा मासुमा सुई दिन सकिन्छ । ० दिन भन्नाले पहिलो भ्याक्सिन गरेको दिन मान्नु पर्छ ।

- एण्टिरेविज् भ्याक्सिनेसन पछि हुन सक्ने संभाव्य असरहरूः साधारणतः यसबाट केही नराम्रा असरहरू देखिदैनन् । कहिले काही सुई लगाएको ठाउँमा साना साना फोकाहरू हुन सक्छन् ।

हाम्रा कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूको सहभागिता बढाऔं ।

१५. बजारमा उपलब्ध पशु औषधि, प्रयोग गर्ने तरीका तथा माध्यम

पशु औषधि: जनावर (पशु पक्षी) हरूलाई रोग लाग्नाबाट बचाउन रोग लागिसके पछि रोग निको पार्ने बाह्य वा आन्तरिक (शरीर छालाबाट, सुईबाट, मुखबाट) रूपमा प्रयोग गरी रोग निको पार्ने रासायनिक पदार्थ नै औषधि हो ।

औषधि विज्ञान: औषधि विज्ञान चिकित्सा विज्ञानको त्यो शाखा हो जसले औषधिले जीवित वस्तुमा (रोगी, निरोगी, औषधिको श्रोत र औषधिको विषालु असर) ल्याउने परिवर्तनको अध्ययन गर्छ ।

औषधिको प्रयोग विधि: औषधिको प्रयोग गर्दा रोग, पशुको जात, आयु, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था आदि अनुसार औषधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । औषधिको प्रयोग विधि निम्नानुसार दिइएको छ ।

- Logically Use: कान, आँखा, छाला, पठेघरमा प्रयोग गरिन्छ ।
- With Injection (सुईद्वारा): शुनबाट: मासुबाट: एन्टीबायोटिक्स, एनालजेसिक छालाबाट: Inj. Invomec, Vaccines नशाबाट: Inj. Dextrose, Inj. Calcium, Inj. Neurobion इपिडुरल: Coeical Vertima, Anesthesia, Inj. Lignocane, Inj. Xyllocane.
- Througth Mouth: पाउडर, द्याबलेट्स, बोलस ।

विभिन्न प्रणालीमा असर पार्ने औषधिहरू:

- पाचन प्रणालीमा असर पार्ने: (a) Himmahyan Baitis (b) H.B. Strong (c) रेचामेम्स (d) लिबेल (e) नेबलेन (f) केओलिन (g) धी केयर बोलर (h) पाराफिन (i) म्याग्नेसियम सल्फेट (j) कास्टर आयल (k) रसैन बोलस (l) बोभिरम बोलस (m) फ्लोराटोन (n) Turpentine Oil (o) अफालिन (p) टिम्पोल (q) Herminsa. श्वास-प्रश्वास प्रणालीमा असर पार्ने: (a) क्याफलोन (b) कफगो पाउडर (c) कफमेम्स झोल (d) एभिल एम्पेकटेरेन्ट (e) कोडिन (खोकी कम गराउने) (f) डेरीफाइलिन (g) थियोफाइलिन (h) क्युराल (i) कोराभिन (स्वास बन्द हुनबाट बचाउने) (j) थ्रोन् । रक्त सञ्चार प्रणालीमा असर पार्ने: (a) ई. स्ट्रेप्टोकोम (b) ई. स्ट्रेप्टोविट (c) Vit (रगत जमाउने) (d) Adrenaline (मुटुको गति बढाउने) (e) हेपारिन (f) सोडियम साइट्रेट (रगत जन्म नदिने) (g) आइरन (h) कोबाल्ट (i) कपर (Cu) । मुत्र प्रणालीमा असर पार्ने: (a) Inj. Lasix (b) नेफटोन (c) सिस्टोन (d) युराल (e) Inj. Amoxicillin (f) Inj. Gentamycin (g) Inj. Redima (h) सिट्राल (i) एसिटासोल । प्रजनन प्रणालीमा असर पार्ने: (a) रतरात (b) Inj. Oxytocin (c) Ergot (d) Replantha (e) Methargun (f) Exapar (g) Cofficu (h) न्युट्रीसेक (i) प्रजना । स्नायु प्रणालीमा असर पार्ने: (a) Inj. Xylaxine (b) Morphine (c) Larguati (d) Lignocane (e) Xyllocane. छालामा असर पार्ने: (a) Paraffine (b) Glycerine (c) बोरिक एसिड (d) Zinc (e) Turpentine (f) Himax (g) Charmil.

१६. औषधिहरूको समूह विभाजन

Antibiotics: यी औषधिहरू शरीरमा प्रवेश भएका जिवाणुहरूलाई बढ्दनाबाट रोक्ने र मार्ने काम गर्छन् । यस्ता धेरै प्रकारका औषधिहरू छन् जो एन्टिबेशन थिन वा खुवाउन, बाहिरबाट लगाउन, गर्भाशय भित्र राख्न र मुखमाथि थिन सकिन्छ । पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लीन/क्लोस्ट्रीडोग्राइसीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन र पेनिसिलिन सुई (डाइक्रिस्टिसिन) Antibiotics का उदहरणहरू हुन् ।

Anthelmintics: भित्री परजिवीहरूको रोकथाम र उपचार गर्ने यो औषधि उपचार गरिन्छ । कुनै Anthelmintics ले एक/दुई प्रकारको जुका मात्र मार्छ जबकि Broad Spectrum भनिन्छ । नाम्ने सहित धेरै शरीका जुकाहरू मार्ने Anthelmintics लाई Broad Spectrum भनिन्छ । एल्बोमार, जोमार, अल्बेन्डाजोल, डेलाइड, पिप्राजिन लिक्विड, डिस्टोडिन, पानाकुर द्याबलेट, पाराजिप्लस, ई. बाइथरपेटीन ।

Analgesics and Anti-Inflammatories: एकदमै दुखेको र सुनिएको बेलामा यी औषधिको प्रयोग गरिन्छ । ईन्जेक्शन नोभाल्जीन, एस्वीपाइन, बाइफेनोहेनिक, पाइरीनील, एल्जीसेन, बोलीन, पारासिटामोल ।

Antihelmintics: यो औषधि विष लागेमा, चिलाएमा वा एलर्जी भएमा प्रयोग गरिन्छ । जनावरलाई विष लाग्ने वा एलर्जी हुने बित्तिकै यो औषधि दिएमा धेरै राम्रो हुन्छ । एभिल, क्युराल जीट (Zee) ।

Diuretics: शरीर सुनिएर पानी भरीएको भए यो सुईले बढी भएको जनावरमा पानी शरीरबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ । कहिले काहीँ नासले वा जुकाले धेरै ग्रसित भएको अवस्थामा घाटी, खुट्टाहरू सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा Injection Lasix and Redima दिनु पर्दछ । यदि पिसाब कम भएमा वा बन्द भएमा स्टेनील, युराल पाउडर प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

Local Anesthetics: जनावरलाई उपचार गर्न, चिरफार गर्न, छालालाई लाटो बनाउन यो औषधिको प्रयोग हुन्छ । Novocaine, Zylocaine Locaine यसका उदाहरण हुन् ।

Hormones: शरीरका कुनै पनि प्रजनन अङ्ग (पोथी)मा खराबी भएर सन्तान उत्पादनमा गडबडी भयो भने त्यो अवस्थामा यो औषधिको हुन्छ । जस्तै: Chorlhan, Luthalys, आयुर्वेदिक औषधिहरूमा Praxana, Janova, Braujiana आदि ।

Vitamins & Minerals: शरीरमा भिटामिनको कमी र खनिजको कमी हुँदा यो सुई दिइन्छ । शारीरिक तन्दुरुस्ती र उत्पादन वृद्धि गराउने औषधिहरू:

- खनिज मिश्रण: एणिसीन, मिल्कमीन, मिनामील, कन्सीमीन, कन्सीटोन, क्याल्डीप्लस, रेभिकल, बुटाकल, क्यालअपजेल को.फि.क्यू., कोकोरान आदि।
- भिटामिन: इन्जेक्शन वेलाभाइल, ई. लिभोजिन, ई. कन्सीप्लेक्स, ई. विकोमएल, मेरीटोन ।

Blood Parasitic Medicine: रगतमा पाइने परजीवीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने औषधि ई. बेरेनिल (Berenil), लहुमुते (Babeliosis).

External Parasite Medicine: यो औषधि बाह्य परजीवी नियन्त्रणमा प्रयोग हुन्छ । Pestoban, B.H.C. Powder, Butox, Cutox, लुतोमा: Sulphur, Seabial, Seabex, दुवैमा Ivermectin.

Sedatives & Tranquillizers: यी औषधिहरू जनावरलाई शान्त पार्न र सम्वालन सजिलो पार्न दिइन्छ । चिरफार गर्नु भन्दा पहिले पनि यो सुई दिइन्छ । Sequil, Largociti:

- पेट फुलेमा: टिम्पोल, एफोन पाउडर, अफानील, व्योटासिल झोल दिने
- अरुची वा अपच भएमा: रुमेन सक्रिय पार्ने औषधि वोभीरम, रुपेन्टोन, एनोरेक्शन, लोराटोन, हिमालयन वतिसा, रुचान्पाक्स ।
- दिशा कब्जीयत (Constipation) भएमा: Mag. Sulphate.
- छेरेमा वा आउ परेमा: नेबलोन, डाइरोक, डायडिस्को, कोजेल वोल्स, वोरीप्रीम वोल्स, सल्फा वोल्स ।
- रुची बढाउने: लिभर टोनिक, लिभोल, हेपासिन, लिन्टो, हिपानिस्ट, वेलाभाइल, लिभोजीन, मेरीटोन ।
- खोकि लाग्ने, नाक बग्ने भएमा (श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने): क्या-लोन, कफ्फो, कफमिन्ट, एभील, क्युरल, ई. डेक्साभेट, ई. डेक्सीना।
- शुनेलोमा प्रयोग हुने औषधि: पेनडिस्टीन, एच्. एस्, अल्सीकलक्स, टाइलेक्स र बाहिर मस्टिलेप ।
- मिल्क फिचरमा प्रयोग हुने: क्याल्बोरल, मिफेक्स, थाइकल ।
- आँखा र नाकमा प्रयोग हुने: डेक्सीना, आइड्रप, सोफ्रामाइसिन आइ आइन्टमेन्ट, क्लोरमफेनिकल आइड्रप, नाकको आइड्रप ।
- पक्षघात भएमा: न्युरोवियन, अन्टीन्युरोन ।

१०. आयुर्वेदिक औषधिको पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग

औषधिहरूको प्रयोगले पशु रोगहरू निर्मूल एवं नियन्त्रण भैराखेका रोगहरूको समय लामो हुने भएकोले जनमानसमा भने तुरुन्तै उपचार भइ निको होस् भन्ने चाहना कायमै रहेको छ । आयुर्वेदिक औषधिको मुख्य २ वटा गुणहरू हुन्छन्:

- यी पनि दुस्रभाव हुँदैन ।
- यीको वातावरणसँग साधित्व व्यवहार कायम गरी रोग विरुद्ध लडिरहन्छ।


पशु आयुर्वेदिक औषधिहरू र प्रयोग विधि:

- लोभना क्याप्सुल: ज्वरो आएमा, जाडोले कट्याङ्ग्रीएमा, हिउँमा हिडेमा गाई, बैसीलाई २ क्याप्सुल तथा साना पशुलाई १ क्याप्सुल दिनको २ पटक तीन दिनसम्म दिने ।
- फिभाइल पाउडर: ज्वरो आएमा, पिसाब बन्द भएमा, शरीर सन्निष्टमा गाई, बैसीलाई ६० देखि १०० ग्राम तथा साना पशुलाई ३० देखि ६० ग्राम दिनको २ पटक ३ दिनसम्म खुवाउने ।
- भुमिको झोल: जुम्रा उपिया, किर्ना (बाह्य परजीवी) परेमा सुर्तिको झोल साबुन मिश्रण बनाइन्छ । यो औषधि केटाकेटीले भेट्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन । यो औषधिलाई प्रयोग गरिसकेपछि नुहाउनु पर्छ । सुर्ति र साबुन पकाउदा ब्याल ठोका खुल्ला राख्ने र औषधि लगाएपछि २ दिनसम्म पशुलाई ननुहाउने ।

विधि: उपिया र किर्नाको लागि एक पटक मात्र प्रयोग गर्ने, जुम्राको लागि १ पटकका दरले लगातार ४ हप्तासम्म प्रयोग गर्ने । यो औषधिको फेदसम्म पुग्ने गरी दल्नु पर्छ । प्रयोग गर्दा पशुको नाक, मुख, आँखा, छोत्रु पर्दछ ।

- फिभासय बतिसा, हरमिन्सा, शिला बतिसा: घाँसपात मन लगाएर नखाएमा, नउप्राएमा, दुब्लो र कमजोरलाई ताम्बेको औषधि खुवाउनु पर्दछ । ठूलो पशुलाई ५० ग्राम, सानो पशुलाई १५ ग्राम दिनको २ पटक ३ दिनसम्म ।
- टिम्पोल/एफोन: पेट फुलेमा, धेरै अन्न खाएमा, कुहिएको घाँसपात र पराल खाएमा, नयाँ, कलिलो, हरियो घाँस खाएमा, कोशघाँस बढी खाएमा । ठूलो पशुलाई १०० ग्राम तथा सानो पशुलाई ३० ग्राम दिनको २ पटक ३ दिन सम्म ।
- मेक्सीनोन: रगतमासी परेमा, जुकाको प्रकोप भई छैरैटी लागेमा । ठूलो पशुलाई ३० देखि ५० ग्राम तथा सानो पशुलाई १० देखि २० ग्राम दिनको २ पटक ३ दिनसम्म खुवाउने । साथै जुका परेको अवस्थामा जुकाको औषधि पनि दिने ।

- तोरीको तेल: पेट फुलेमा, धेरै अन्न खाएमा, कोशेघास बढी खाएमा, कलिलो घास धेरै खाएमा । गाई, बैसीलाई १ देखि २ माना तथा भेडा, बाख्रालाई १/४ माना खुवाउने ।
- तारपिन तेल: घाउको किरा मार्न, पेट फुलेकोमा आदि । ३० देखि ४० मि.लि. पेट फुलेकोमा खुवाउने वा १ भाग तारपिन तेल १० भाग तोरीको तेलमा मिसाएर खुवाउने ।
- नुन, चिनी, पानी: छेरैटी लागेमा, लामो समयसम्म खाना नखाने पशुका लागि यसको प्रयोग गर्ने । पशुले जति छेर्छ, त्यसको दुई गुणा खुवाउने (१ चिम्टी नुन, ३ चिम्टी चिनी र १ माना पानीको दरले) ।
- हिमैक्स, चर्मेल आदि: लुतो, घाउ, दाद आदि भएमा दिनको १ पटक घाउ सफा गरी आवश्यकतानुसार लगाउने ।
- एकापार/रिक्नाटा: साल नझरेमा र बच्चा पेटमा कुहिएमा, साल र कुहिएको बच्चा फाल्न तथा पाठेघर सफा गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ । ठूलो पशुलाई ४० देखि १०० मि.लि. तथा सानो पशुलाई २० देखि ३० मि.मि. दिनको २ पटक साल तथा बच्चा नझरेसम्म खुवाउने ।



पशु पन्थीलाई प्रशस्त पानी खुवाउनु पर्छ ।

१८. स्थानीय जडिबुटीको पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग

पशु चिकित्सकहरू जडिबुटीको प्रयोग भैरहेको छ । हाल डाक्टरले युगमा पनि जडिबुटीको प्रयोग कम भएको छैन र भविष्यमा पनि मानिस र पशु स्वास्थ्यमा स्थानीय जडिबुटीको प्रयोग भै नै रहनेछ । आजकल बजारमा र बजारभित्रमा पाईने औषधीको मुख्य श्रोत जंगलमा पाईने जडिबुटी नै हो । जंगलमा भएको आयुर्निक औषधीको मुलतत्त्वको मात्रा किटान हुने हुँदा, मात्रा कम्यो हुने तर असर छिटै देखिने हुन्छ । जडिबुटीको मात्रा किटान गर्न गाह्रो हुन्छ । जडिबुटी केही धेरै या बढी खाए पनि प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने हुन्छ ।

स्थानीय स्थानमा भिभिन्न ठाउँमा पाईने जडिबुटी तथा चिजबीजहरूको नाम, पशु स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय स्तरमा प्रचलित मात्रा र प्रयोग विधी बारे जानकारी गराउन सार्वभौमिक वीच छलफल गर्दा निस्केका विवरणहरू तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

जडिबुटीको नाम	कुन रोगमा प्रयोग	मात्रा विवरण
कोक टिपु	पेट फुलेको ज्वरो आएमा	१० दाना जति पानीमा १ मट्टि घुलो
बिजडा	पेट फुलेकोमा ज्वरो	१ पाटी
बाह्र सुनुन	साल भर्छ (पेट/पाठेघर)	विजडी पाल ७, १५ गोटा पाल
गुण्डो	पेटको जुका	एउटा कुचिपडा
गुण्डोको पाल	पेट फुल्दा	आधा माना भोल
गुण्डोको पाल	पेट गडबड/ दुबेको	१ मुठी
गुण्डोको पाल	पेट टाढिएको	२० ग्राम बैसीलाई
गुण्डोको पाल	अरोरी बुलु, विष खाएमा	१ गाना / ४० १०० ग्राम
गुण्डोको पाल	डह पोलेको	गाना / एक (४० / १००)
गुण्डोको पाल	ताजा घाउ	चोप लगाउने
गुण्डोको पाल	जन्डिस	तेलम फिटेर
गुण्डोको पाल	विष खाएको बेला	२ / ४ किलो उरिनेर ख्वाउने
गुण्डोको पाल	लाटो रागे, निमोनिया	२ / ३ गोटा
गुण्डोको पाल	ज्वरो	पिठो संग मिसाएर
गुण्डोको पाल	जोन्डिस	२ / ३ चम्चा
गुण्डोको पाल	निमोनिया घटी ज्वरो	४ / ५ गुणा
गुण्डोको पाल	सुगरको गोली जुका	८ थोपा पिठेमा मुखेर
गुण्डोको पाल	फिटो जुका चिरुछ	बोका पिठेमा मुखेर
गुण्डोको पाल	गोलो जुका	१ दाना घुलो बनाई पानीमा
गुण्डोको पाल	किर्ना जुगा	पहेलो भोल लगाउने
गुण्डोको पाल	ज्वरो र सुनिएको	४ / १० ग्राम ख्वाउने, लगाउने
गुण्डोको पाल	अरबी, पेट फुलेको	२०/३० दाना पानीमा ख्वाउने
गुण्डोको पाल	अरबी, पेट फुलेको	एक मुठी पानीमा ख्वाउने
गुण्डोको पाल	पेट सम्बन्धी	१० / १५ पोटी ख्वाउने
गुण्डोको पाल	अपच	२ चम्चा ख्वाउने
गुण्डोको पाल	पेट गडबड, पिसाब बन्द	ठूलोपशु आधा लिटर ख्वाउने
गुण्डोको पाल		१० ग्र. घुलो पानीमा ख्वाउने

१९. बोटबिरवाहरूबाट लाग्ने विष र उपचार

बिषालु घासहरू खाएर वर्षेनी सयौं पशुहरू मर्ने गरेको कुरा हामीले अनुभव गरेकै छौं । मर्नेहमा भेडा, बाछा, गाई, भैसी सबै जनावरहरू पर्दछन् । देशका विभिन्न भागमा पाईने बिषाल बिरवाहरूमा हुने एकोनाईट वा हाइड्रोसाइनिक एसिडले पशुहरूलाई खराब असर गर्छ ।

बिषालु बिरवाहरूको स्थानीय नाम:

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------|
| • बल | • अंगेरी | • सिटो | • आट |
| • सिरिस | • गायो | • दर्शने | • जुनेलो |
| • गुरांस | • आर | • ओडर | • चित्त/चतु |
| • आरुपाते | • सिंगुडे | • बद्रीफुल | |
| • सिमलतलको बोक्रा | • चिउरीको पिना | | |

बिषालु बिरवा खाए पछि पशुमा देखिने लक्षणहरू:

- अलि अलि ज्वरो आउने ।
- धड्कन घटबढ हुने ।
- मुखबाट फिन निकाल्ने साथै चाल काढ्ने ।
- पेट फुल्ने, ओकल्ने, छैरोटी लाग्ने ।
- काम्ने, दाँत किट्ने, छटपटाउने ।
- स्वास प्रस्वास मुस्किल हुने, दिशा, पिसाव गर्न खोज्ने ।
- तापक्रम घट्ने, बेहोश भएर लड्ने र मर्ने ।

उपचार:

- बिषालु बिरवा खान रोक्नु ।
- खाएको बिरवा पच्न र सोस्न नदिनु ।
- बिषादि शरीरबाट बाहिर निकाल्नु, जस्तै: छैरोटे लगाएर, डुम दिएर, पखालेर, बान्ता गर्न लगाएर ।
- बिषलाई अशक्त बनाएर: यूनिभर्सल एण्टिडोट (Universal Antidot) भनेको सधै किस्मिको बिषको क्षमता कम गर्ने औषधि हो । त्यो औषधि क्यान्सियम हो ।
- दुध २ - ३ लीटर र ५ - १० गोटा अपडा घोलेर गोरे, भैसीलाई खुवाउने ।
- छटपटाएको शान्त पार्न सकिल सुई ८ देखि १० एमा एला मासुमा दिने ।



१०. औषधिहरूको हेरचाह, भण्डारण तथा संरक्षण गर्ने विधि

औषधि जलावन गर्ने कम्पनीले औषधिहरूको उत्पादन गर्दा यतिसम्मको गुण म नै १ गुणस्तर निर्धारण गरेको हुन्छ तर ती औषधिहरूलाई राम्रोसँग लज्जावाण र गरभण गरिएन भने तिनको गुणस्तर बिग्रन जान्छ । यदि गर्मी, शर्करा, हावा, पानी, कुसी लगायत किरा र मुसाबाट औषधिहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने भने औषधि को नोक्सानी तथा गुणस्तर बिग्रनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

औषधिमा शुष्का कसरी गर्ने: माथि उल्लेख गरिए जस्तै औषधिहरूको सुरक्षा १ गुणस्तर बिग्रन नदिन गर्मी, प्रकाश, हावा, पानी, चिस्यान, कुसी लगायत किरा र पुचाले बिगार्न नसक्ने गरी सुरक्षित राख्नु पर्छ । यसका अलावा भिन्न शुष्काहरूमाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ:

- औषधि उत्पादन भिति र म्याद समाप्त हुने भिति देखिने गरी राख्ने ।
- पाउडर, मलहम, झोल, सुई, खोपहरू सबै अलग-अलग राख्ने व्यवस्था भिनाउने वा स्पष्ट देखिने गरी भिलार राख्ने ।
- औषधि राख्ने कोठा सितल, ओभानो र घामको प्रकाश नपर्ने गरी बनाउने ।
- भ्यार भिड्का औषधिहरू तत्कालै हटाउने ।
- औषधिमा लागेका धुलो, जाली दैनिक हटाई सफा राख्ने ।
- इटाफट, बिघ्रेका औषधि अलग राख्ने । आदि

औषधिहरूको भण्डारण तथा संरक्षण कसरी गर्ने ?

- ज्वारीयत रुपले औषधि राख्ने कोठा चिसो, अन्धकार, सुख्खा, राम्रो हावा चर्ने, सफा ठाउँ भएको हुनु पर्छ ।
- औषधिलाई च्याक वा काठको तखतामा राख्नु पर्छ ।
- औषधिलाई कम्पनीको नाम वा जेनेरिक नाम वा अल्फबेटिक अर्डरमा भिनाउने ।
- एउटै किस्मका औषधिलाई एकै ठाउँमा राख्ने, जस्तै: पाउडर, चक्की, भण्डार, सुई, खोप सबै भिल्ले-भिल्ले ठाउँमा (पाउडर - पाउडर एक, सुई-सुई एक ठाउँमा) राख्ने ।
- पुराना तथा म्याद सिद्धि लागेका औषधिलाई अगाडि देखिने गरी राखी चाडै बिक्की वितरण गर्न सकिने गरी राख्ने ।
- इटपुटेका र बिग्रोका औषधि अलगगै राख्ने ।
- चक्की, धुलो, क्याप्सुल जस्ता औषधि भुईँ र चिस्यान भएको ठाउँमा नराख्ने ।
- झोल, मिक्सचर, आखाका औषधि, सुईलाई प्रकाश र गर्मीले बिगार्ने भएकोले भेध्यारो तथा चिसो कोठामा राख्ने । अर्थात् कोठा नभए पर्दा हाल्ने ।

- मलम र क्रिम जस्ता गर्भाशय र शरीरका अन्य भित्री भागमा प्रयोग हुने औषधिहरू पनि चिसो ठाउँमा राख्ने ।
- भ्याक्सीन, एन्टीसिरम र इन्सुलिनलाई रेफ्रिजेरेटरमा ८°C भन्दा तलको तापक्रममा राख्ने । तर जम्ने गरेर नराख्ने ।
- जल्ने, उड्ने औषधि जस्तै: स्पिट, इथर, रक्सीलाई अथ्यारो रंगको सिसिमा बिक्रो राम्ररी बन्द गरी प्रकाश र आगोबाट टाढा राख्ने ।
- बेहोस पर्ने र खतरा खालका औषधिलाई ताल्चा लगाएको ठाउँमा वा ताल्चा लगाउने गरेर राख्ने ।
- औषधि कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा माथिका बुदा बाहेक औषधि कम्पनीको निर्देशन अनुसार संरक्षण गरी राख्ने । यदि कुनै कम्पनीले केही पनि नलेखेको भए पनि कुनै पनि औषधिलाई, चिस्यान, बढी गर्मी (तातो) र जमो (फ्रिज)मा राख्नु हुदैन ।

खेतीपाती र घरको काममा समेत महिलाको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले महिला श्रमको महत्त्व बुझौं ।

२१. औषधि बिज्ञेताका काम, कर्तव्य तथा औषधि बिज्ञेतामा हुनु पर्ने गुणहरू

औषधि बिज्ञेताको काम, कर्तव्य:

- आफ्नो पसल सफा र औषधिहरू राम्ररी मिलाएर राखेको हुनु पर्छ ।
- डाक्टरले लेखेको कागज (प्रेस्क्रिप्शन) राम्ररी बुझे पछि मात्र औषधि दिनु पर्छ ।
- राम्रो गुणस्तरको औषधि उपभोक्ता वर्ग समक्ष उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
- भविषी सँगिएको र कम गुणस्तरको औषधि कहिल्यै पनि बेच्नु हुदैन ।
- बजारमाका औषधिलाई डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शन बिना नबेच्ने र बेच्दा यो औषधि खरिदमाक हो भनी जानकारी समेत दिने ।
- कुनै पनि किसान वा उपभोक्ताको आन्तरिक कुरा र व्यक्ति विशेष को बानी ब्यवहार हेरी अर्कांलाई कहिल्यै बताउनु हुदैन । नत्र विश्वास टुट्न जान्छ ।
- उपभोक्ताले आफ्नै भिटामिन, टोनिक खोज्न आए पनि डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शन माथि मात्र औषधि बेच्ने वा आफू खुशी औषधि बेच्नु हुदैन ।
- औषधि बिज्ञेताले स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा पुर्याउनु डाक्टरको जतिकै देन छ । नाथनि "मेरो ठूलो देन छ" भन्दै "डाक्टर नै किन चाहियो, औषधि म आफ्नै शिन सम्छु" भन्ने घमण्ड कहिल्यै गर्नु हुदैन, जोखिममा पर्ने सकिन्छ ।
- औषधि बिदा डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्शन अनुसार किसान/उपभोक्तालाई औषधि प्रयोग बारे राम्ररी बुझाई दिने ।
- डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शनमा कुनै गल्ती फेला परेमा उपभोक्ता समक्ष नभनी डाक्टरसँगै सल्लाह गर्ने ।
- औषधि बिज्ञेताले औषधि नियमावली अनुसार काम गर्नु पर्छ ।

औषधि बिज्ञेतामा हुनु पर्ने गुणहरू: कतिपय गुणहरू काम, कर्तव्यसँगै सम्बन्धित भए तापनि हामी यहाँ प्रमुख गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्दै छौं:

- जनतामा पशु स्वास्थ्य सेवा कर्मिका हिसयतले सेवा पुर्याउने ।
- आफूलाई फाइदा र अरुलाई रोजगार एवं सहयोगको व्यवस्था मिलाउने ।
- यो पेशा अरु सबै पेशा भन्दा छुट्टै र बढी सम्बेदनशील किसिमको भएकोले वा जीवन र मरणसँग सम्बन्धित भएकोले समाज सेवा प्रति आस्था राख्दै औषधि र स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञानको सदुपयोग गरी काम गर्नु पर्ने भएकोले तालिम प्राप्त व्यक्तिले, सहयोगका साथै सान्त्वना दिन सक्ने हुनु पर्छ ।
- जनताको रिस र गाली सहन (खुल्न) सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्छ ।
- आफूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र शिप दिन प्रतिदिन बढाउँदै लैजानु पर्छ ।
- पैसा कमाउने उद्देश्य राखी म्याद सिद्धिका तथा मात्रा नपुग्ने औषधि दिएर जनताको शोषण कहिल्यै गर्नु हुदैन । बर नभएका औषधि तत्काल मगाउने वा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
- यदि कसैले पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै राय, सुझाव, सल्लाह, लिन आएमा आफ्नै ज्ञानले नभई राम्रो ज्ञान भएको दृष्ट व्यक्तिकै कहीं पठाई दिनु पर्छ ।
- औषधि खरिद र बिक्रीमा कहिल्यै लापरवाही र हेलचेक्र्याई गर्नु हुदैन ।

२२. नेपालमा उत्पादित विभिन्न किसिमका भ्याक्सीनहरू, संज्वय तथा प्रयोग विधि

पशुपालनबाट बढी उत्पादन लिन र पशु जन्म पदार्थको उत्पादनको शुद्धता निरोपिता) कायम राख्न पशु निरोगी र स्वच्छ हुनु नितान्त आवश्यक छ । बातावरणमा विभिन्न प्रकारका रोगका कारक तत्व (बिषाण, विषाण, दुग्धी, परजीवी आदि) हरू रहेका हुन्छन् । हाल यातायातको सुविधा, बाह्य सम्पर्क, विदेशबाट आयात गरिने पशुपंक्षी, पशु आहार, पशुजन्य पदार्थ आदिबाट पनि रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

हुन त पशुपंक्षीहरूको शरीरमा रहेका रक्त कोषहरूले रोग प्रतिरोध शक्ति प्राप्त गरिरहेको हुन्छ तर जब रोगका कारक तत्वहरूको चाप बढी हुन्छ पशुपंक्षीमा पौष्टिक तत्वको अभाव हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा रोग प्रतिरोध क्षमतामा कमी भएर पशुपंक्षीमा रोग लाग्दछ । यस्तो रोगहरूको उपचार गर्नुका साथै निरोगी पशुपंक्षीहरूमा रोग विरुद्ध खोप लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।

खोप भनेको के हो ?

विषाणबाट रोग लाग्नु भन्दा पहिले नै रोगको रोकथामका लागि प्रयोग गरिएको प्रकारको औषधि (पदार्थ) नै खोप हो । यस्ता खोपहरूले शरीरमा निश्चित रोगको विरुद्ध प्रतिरोधक शक्तिको विकास गर्दछ र निश्चित समय सम्म कार्य गरिरहन्छ । खोपको ढुवानी, उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी नअपनाएमा घातक पनि हुन सक्छ ।

विभिन्न प्रकारका खोपहरूको भण्डारण र प्रयोग विधि

गार्ड, बैसीमा प्रयोग गरिने खोपहरू

भ्यागुते रोग (H.S.) विरुद्ध भ्याक्सीन:

- Alum Precipitated Formalin Killed H.S. Vaccine: मात्रा ५ एम.एल. छाला मुनी (S/C) । यसले खोप लगाएको १० दिन देखि ६ महिना सम्म रोग प्रतिरोध गर्छ । प्रत्येक ६ महिनामा लगाउने ।
- H.S. Oil Adjuvant Vaccine: मात्रा ३ एम.एल., छालामुनी तथा मासुमा । प्रतिरोधक क्षमता ६ दिन देखि ६ महिना सम्म ।

बाख्खाका खोपहरू:

- 1. H.S. Alum Adjuvant Vaccine: मात्रा ठुलो पशुमा ५ एम.एल. र साना पशुमा ३ एम.एल. S/C. प्रतिरोधक क्षमता १० दिन देखि ६ महिना सम्म ।
- 2. Aluminium Septicemia + Black Quarter Vaccine: Quantity 2-4 ml S/C, I.M. प्रतिरोधक क्षमता १० दिन देखि ६ महिना सम्म ।
- 3. अश्वरोक्त Vaccines कोठाको तापक्रममा भण्डारण गर्ने सकिन्छ । फ्रिजमा भण्डारण गर्नु हुँदैन । तर धेरै न्यानो र सूर्यको प्रकाश पर्ने ठाउँमा भण्डारण गर्नु हुँदैन ।
- 4. Black Quarter Vaccine: मात्रा ३-४ एम.एल. छाला मुनी, प्रतिरोधक क्षमता १० दिन देखि १२ महिना सम्म, ३ वर्ष मुनीका बाख्खाबाच्छी र गधागाढीहरूमा प्रत्येक वर्ष लगाउनु पर्दछ ।
- 5. H.M. + B.Q. Combine Vaccine: मात्रा ४ एम.एल. छाला मुनी, प्रतिरोधक क्षमता १० दिनदेखि १२ महिना सम्म । यो Vaccine भण्डारण गर्दा कोठाको तापक्रममा गर्ने सकिन्छ, फ्रिजमा राख्नु हुँदैन ।
- 6. Anthrax Spore Vaccine: यसका बिबीत Bacillus Anthracis नामका बिषाण रहने हुँदा ५० रसीसिरिन (Glycerine) सलाइनमा तयार पारिएको हुन्छ । मात्रा १ एम.एल. प्रति जनावर छाला मुनी लगाउने । यो खोप लगाएको १४ दिन देखि १ वर्षसम्म काम गर्छ । बिबीत बिषाणको Spore रहने हुँदा प्रयोग गरेको साधन सुरक्षित तरिकाले नष्ट गर्नु पर्दछ । यो रोग मानिसमा समेत गर्न सक्ने हुँदा रोगको शंका लागेको तथा शंका लागी मरेका पशुलाई सावधानि सँग नष्ट गर्ने वा गाड्ने गर्नु पर्दछ ।
- 7. रोग विरुद्ध खोप (F.M.D. Vaccine): मात्रा १० एम.एल. छाला मुनी, खोप लगाएको १० दिन देखि ६ महिनासम्म काम गर्दछ । यो खोप 6°C - 10°C को तापक्रममा मात्र भण्डारण गर्नु पर्दछ । प्रत्येक ६ महिनामा पशुमा खोप लगाउनु पर्दछ ।
- 8. गौगौटी खोप (R.P. Vaccine) र (Rinderpest Vaccine)
- 9. R.P. Vaccine (Tissue Culture): मात्रा १ एम.एल. छाला मुनी, खोप लगाएको १५ दिन देखि ३ वर्षसम्म कार्य गर्दछ । यो औषधि 0°C भन्दा तलको तापक्रममा मात्र भण्डारण गरिन्छ । खोप तयार पारेको २ घण्टा भित्र लगाई नष्ट गर्नु पर्दछ ।

- F.M.D. Vaccine: मात्रा ५ एम.एल. छाला मुनी, 5°C - 10°C मा भण्डारण गर्ने।
- Sheep र Goat Pox Vaccine: खोपलाई ५०% Glycerine मा तयार पारी लगाउने। कान सफा गरी छाला सुक्ने खोप प्रयोग गर्ने, १ हप्ता देखि १ वर्षसम्म काम गर्दछ।

बगुर/ सुगुरको खोप:

- H.S. Vaccine - 3 ml छाला मुनी।
- F.M.D. Vaccine - 5 ml छाला मुनी।
- Hog Chaltara Vaccine (Swine Fever Vaccine) 5 ml छाला मुनी।

कुकुर/ बिरालोको खोपहरू:

- A.R.V. 20%: कुकुर, बिरालोलाई टोक्नु भन्दा पहिले लगाउने। यसको मात्रा कुकुरमा छाला मुनी ५ एम.एल. र बिरालोमा छालामुनी ३ एम.एल.। यो खोप प्रत्येक ६ महिनामा लगाउनु पर्दछ।
- A.R.V. 5% Carbalsed Vaccine: यो टोकेपछि लगाउने खोप हो। यसको मात्रा कुकुरमा छाला मुनी ५ एम.एल. १४ दिनसम्म र बिरालोमा छालामुनी ३ एम.एल. १४ दिनसम्म लगाउनु पर्दछ।
- NOBI Vaccine R. (Inactivated Vaccine): प्रथम पटक ३ महिनामा र प्रत्येक वर्ष १ एम.एल. छाला मुनी लगाउने। यो खोप 0°C - ४°C को तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्दछ।

कुबुराका खोपहरू:

- R.D.F. 1 Strain Vaccine: खोपको १०० मात्रालाई ८ एम.एल. Diluter मा मिसाई २ थोपा नाक तथा अखामा राख्ने। यो खोप १ देखि ७ दिनको चल्तामा दिइन्छ।
- F.D.F. 1 Vaccine (एक दिने चल्ताको लागि): १ Ampul लाई १० ml Dist. Water मा मिसाई १०० चल्तालाई नाक तथा अखामा दिने।
- R.D.R.B. Strain Vaccine: 3 - 4 Weeks Age & 16 - 18 Weeks Age का चल्ताहरूलाई दिने। १०० चल्ताको खोप 20ml Dilute मा मिसाई ०.२ ml छाला मुनी दिने।
- Rankhet M Strain Vaccine: १०० मात्रालाई ५० एम.एल. चिसो Normal Slinc मा मिसाई ०.5ml छाला मुनी दिने।
- Mareks Vaccine: १ दिने चल्तामा 0.2ml छाला मुनी दिने। ५०० मात्रालाई 100ml Diluter मा मिसाई प्रयोग गर्ने। ३ हप्तामा दोहोर्‍याउने।

Formal Live Vaccine: ५०% ग्लिसिरिन सलाइनमा मिसाई पखेटाको छालामा भिर्‍योले थोक्ने प्रयोग गर्ने। प्रथम पटक ६-७ हप्ता र दोश्रो पटक १८ महिनामा लगाउने।

गर्भणी १ हप्ता भित्र Kild Gumboro Vaccine लगाउने। ८-१० हप्तामा Kild Gumboro Vaccine दोहोर्‍याउने। १६-२० हप्तामा Live Vaccine लगाउने।

उभयै खोपहरूको प्रयोग विधि उत्पादकको निर्देशन अनुसार फरक-फरक हुन सक्छ। माथि उल्लेखित कुबुराका खोपहरू सावधानीसित फ्रिजमा भण्डारण गर्नु पर्छ र तयार पारेका खोपहरू सक्ने चाडो प्रयोग गरिसक्नु पर्दछ।

किसम गभार्को, च्यातिएको, अस्पष्ट भएको खोप कहिल्यै पनि प्रयोग गर्ने नभइ। साथै निर्दिष्ट भण्डारण विधि विपरित भण्डारण गरिएको खोप कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नु हुदैन।

नोट: उपरोक्त खोप बाहेक आवश्यकता हेरी Titanus खोप तथा कुकुर, बिरालो बाहेकका पशुहरूमा पनि Rabies विरुद्ध A.R.V. ५% (टोकेपछि लगाउने खोप) पशुको उमेर, जात, शारीरिक तौलको आधारमा उत्पादकको निर्देशनका तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित चिकित्सक वा प्राविधिकहरूको सुझाव अनुसार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।

सकेसम्म स्वदेशी गर्औं।

२३. प्रेरिकप्सन लेखने

प्रेरिकप्सन भनेको औषधीवाला वा औषधी पसलेलाई लेखिए बमोजिमको औषधी रोगीको धनीलाई दिनु भनी, त्यसको सेवन विधी र सेवन अवधी समेत लेखिएको आदेश हो । प्रेरिकप्सनमा हुनु पर्ने कुराहरू:

- प्रेरिकप्सन लेखिएको मिति
- पशु धनीको नाम र ठेगाना
- पशुको जात
- पशुको उमेर
- निदान गरेको रोगको नाम औषधी लेख्नु भन्दा पहिले Rx भन्ने शब्द लेखिन्छ । जसको अर्थ ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नु हो । विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो पाराले आ आफ्ना देवताहरूको नाम लेख्दा एकरूपता नहुने हुँदा एकरूपता ल्याउन संसारका डाक्टरहरूले ल्याटिन शब्द Rx लेख्छन् जसलाई रोमन देवता जुपिटरको प्रतिक मानिन्छ ।
- औषधीको विवरण उपचारको लागि लेखिने औषधी कति चाहिन्छ लेखिन्छ ।
- निर्देशन: यसमा औषधीको मात्रा, दिनमा कति पटक दिने खुवाउने र सोको प्रयोग विधी समेतको निर्देशन दिइन्छ ।
- अन्तमा आफ्नो दस्तखत र मिति अनिवार्य रूपले लेखिनु पर्दछ । प्रेरिकप्सनको नमुना:

- मिति
- पशु धनीको नाम र ठेगाना
- पशुको जात:
- उमेर:
- दिशा जाँचको रिपोर्ट:
- Rx १ ट्याब्लेट गोली ग्राम (१ ग्राम)
- मात्रा १. ग्राम ५५ के.जी. शरीरको तौल अनुसार
- आयुर्वेदिक औषधीमा १ क्रिमोस पाउडर १ प्याकेट । र मात्रा: २०-३० ग्राम औषधी सखरमा मिलाई खुवाउने ।
- हस्ताक्षर
- मिति २० / /

५४. गोबर परीक्षणको लागि स्याम्पल पठाउने तरिका

गर्न चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू: गोबर राखिने सफा काँचको

संकलन गर्ने तरिका:

गोबर ताजा हुनु पर्दछ

गोबरमा कुनै फोहर पदार्थ हुनु हुदैन, जस्तै: हिला, माटो इत्यादि ।

गोबर भुईँमा भएको गोबर संकलन गर्नु परेमा माथिको गोबर फाली बिचको कोरे भाग मात्र ३-४ ठाउँबाट जम्मा गरी एकै ठाउँमा भिसाएर १० ग्राम

मात्रा बाब संकलन गरिनु पर्दछ ।

गोबर चक्कन गर्दा हातले नछोई छेस्काले मात्र शिशीमा संकलन गर्नु पर्दछ ।

एउटा छेक्का एक पटक प्रयोग गरी सकेपछि पुनः अर्को पटक प्रयोग नगर्ने ।

ठूला पशुहरूको गोबर संकलन गर्दा हात सफा गरी साबुन पानीले चिस्को

बसाएर मलद्वाराबाट करिब १० ग्राम जति गोबर निकाली शिशीमा राख्नु पर्छ ।

गोबर: स्याम्पल पठाउदा कुन शिशीमा कसको स्याम्पल र कुन बसाउने
 १। परिधानको लागि निम्न कुराहरू लेखिएको लेबल टाँसीदिनु

संकलन गर्ने तरिका:

गोबर ताजा हुनु पर्दछ

गोबरमा कुनै फोहर पदार्थ हुनु हुदैन, जस्तै: हिला, माटो इत्यादि ।

गोबर भुईँमा भएको गोबर संकलन गर्नु परेमा माथिको गोबर फाली बिचको कोरे भाग मात्र ३-४ ठाउँबाट जम्मा गरी एकै ठाउँमा भिसाएर १० ग्राम

मात्रा बाब संकलन गरिनु पर्दछ ।

गोबर चक्कन गर्दा हातले नछोई छेस्काले मात्र शिशीमा संकलन गर्नु पर्दछ ।

एउटा छेक्का एक पटक प्रयोग गरी सकेपछि पुनः अर्को पटक प्रयोग नगर्ने ।

ठूला पशुहरूको गोबर संकलन गर्दा हात सफा गरी साबुन पानीले चिस्को

बसाएर मलद्वाराबाट करिब १० ग्राम जति गोबर निकाली शिशीमा राख्नु पर्छ ।

परिधान गर्ने तरिका:

गोबर ताजा हुनु पर्दछ

गोबरमा कुनै फोहर पदार्थ हुनु हुदैन, जस्तै: हिला, माटो इत्यादि ।

गोबर भुईँमा भएको गोबर संकलन गर्नु परेमा माथिको गोबर फाली बिचको कोरे भाग मात्र ३-४ ठाउँबाट जम्मा गरी एकै ठाउँमा भिसाएर १० ग्राम

मात्रा बाब संकलन गरिनु पर्दछ ।

गोबर चक्कन गर्दा हातले नछोई छेस्काले मात्र शिशीमा संकलन गर्नु पर्दछ ।

एउटा छेक्का एक पटक प्रयोग गरी सकेपछि पुनः अर्को पटक प्रयोग नगर्ने ।

ठूला पशुहरूको गोबर संकलन गर्दा हात सफा गरी साबुन पानीले चिस्को

बसाएर मलद्वाराबाट करिब १० ग्राम जति गोबर निकाली शिशीमा राख्नु पर्छ ।

गोबर: स्याम्पल पठाउदा कुन शिशीमा कसको स्याम्पल र कुन बसाउने
 १। परिधानको लागि निम्न कुराहरू लेखिएको लेबल टाँसीदिनु

संकलन गर्ने तरिका:

गोबर ताजा हुनु पर्दछ

गोबरमा कुनै फोहर पदार्थ हुनु हुदैन, जस्तै: हिला, माटो इत्यादि ।

गोबर भुईँमा भएको गोबर संकलन गर्नु परेमा माथिको गोबर फाली बिचको कोरे भाग मात्र ३-४ ठाउँबाट जम्मा गरी एकै ठाउँमा भिसाएर १० ग्राम

मात्रा बाब संकलन गरिनु पर्दछ ।

गोबर चक्कन गर्दा हातले नछोई छेस्काले मात्र शिशीमा संकलन गर्नु पर्दछ ।

एउटा छेक्का एक पटक प्रयोग गरी सकेपछि पुनः अर्को पटक प्रयोग नगर्ने ।

ठूला पशुहरूको गोबर संकलन गर्दा हात सफा गरी साबुन पानीले चिस्को

बसाएर मलद्वाराबाट करिब १० ग्राम जति गोबर निकाली शिशीमा राख्नु पर्छ ।

२५. महत्वपूर्ण औषधीहरूको प्रयोग

धुनेलो रोगको लागि प्रयोग गर्न सकिने औषधीहरू:

- औरिजन/माइसिन (Aureon/mycin)
- पेनाडिस्टोन एस.एच. (Pendistatin S.H.)
- इण्ट्रामामरी इन्जेक्सन पेनिसिलिन (Intra-mammary Injection, Penicillin)
- नेफुरन (Nefuran)
- ट्रिपेन फोर्ट (Tripen Forte)
- टेरासाइसिन इन्ट्रा मामारी (Tetracycline Intra Mammary)
- मेस्टलोन चारै धुनमा दिन पर्छ ।

साधारणतया विभिन्न रोगहरूको लागि प्रयोगमा आउने औषधीहरू र तिनका मात्रा तल लेखिए बमोजिम दिने:

गर्इ/भैसी	भेडा/बाख्रा
मेनेसियम सल्फेट रमेन्टम एनोरेक्सन हिमालयन बक्तिसा हरिमन्सा क्लोटाकिल नेल्डोन एफ्रन क्याफलन कफगो मिल्कोमिन नोभिमीन लार्मिनको तेल टेरासाइसिन चक्कि स्टिलिन चक्कि ओरियोमाइसिन एस्टिनजेन्ट पाउडर डायडिसको	२००/३०० ग्राम ३ चक्कि दिनको १ पटक ३ चक्कि दिनको १ पटक ६० ग्राम ६० ग्राम १०० एम.एल. ६० एम.एल. ६० एम.एल. ६० एम.एल. ३० ग्राम १५-२० ग्राम २० एम.एल. २ चक्कि दिनको ३ पटक २ चक्कि दिनको ३ पटक २ चक्कि दिनको ३ पटक ४० ग्राम ४० ५० ग्राम
५ एम.एल. २००० मि.ग्रा दुई पटक ८० एम.एल. ८० एम.एल.	५०/८० ग्राम १ चक्कि दिनमा १ चक्कि दिनमा १५/२० ग्राम १५/२० ग्राम २० एम.एल. १६-२० ग्राम १६-२० ग्राम १६-२० ग्राम १० ग्राम ५ ग्राम ५ ग्राम १/२ चक्कि १/२ चक्कि १/२ चक्कि १५ ग्राम १६/२० ग्राम

नाम्लेको लागि:

कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्टोडिन जोनिल निलजान	५ एम.एल. २००० मि.ग्रा दुई पटक ८० एम.एल. ८० एम.एल.	१०० मि.ग्रा. १५ एम.एल. १५ एम.एल.
---	--	--

धुनेलो रोगको लागि: कुखुराहरूलाई जुका परेमा प्रयोग गरिने औषधीहरू र

प्रयोगको मात्रा:

- १ निम्नलिखित साइटेट ४५ प्रतिशत
- २ निम्नलिखित रक्सा साइटेट ४५ प्रतिशत
- ३ निम्नलिखित एडिपेट दानामा ३००-४०० मिलिग्राम १ किलो दानामा मिलाएर १४ घण्टासम्म दिने । पानीमा ४४० मिलिग्राम १ किलो दानामा मिलाएर १४ घण्टा सम्म दिने । निलबर्म १० ग्राम ४ लीटर मनतातो पानीमा मिलाएर दिने ।

एन्टिबियोसिस रोगमा प्रयोग गरिने औषधी र तिनका मात्रा:

- एनोरेक्स १० ग्राम २५ लीटर पानीमा ७ दिनसम्म ज्यादै भएमा २ दिन भित्रै बर्को ५ दिन दिने ।
- एनोरेक्स १० - ५० एम. एल. ५ लीटर पानीमा मिलाएर १, २, ३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७, ३०, ३३, ३६, ३९, ४२, ४५, ४८, ५१, ५४, ५७, ६०, ६३, ६६, ६९, ७२, ७५, ७८, ८१, ८४, ८७, ९०, ९३, ९६, ९९, १०२, १०५, १०८, १११, ११४, ११७, १२०, १२३, १२६, १२९, १३२, १३५, १३८, १४१, १४४, १४७, १५०, १५३, १५६, १५९, १६२, १६५, १६८, १७१, १७४, १७७, १८०, १८३, १८६, १८९, १९२, १९५, १९८, २०१, २०४, २०७, २१०, २१३, २१६, २१९, २२२, २२५, २२८, २३१, २३४, २३७, २४०, २४३, २४६, २४९, २५२, २५५, २५८, २६१, २६४, २६७, २७०, २७३, २७६, २७९, २८२, २८५, २८८, २९१, २९४, २९७, २९९, ३०२, ३०५, ३०८, ३११, ३१४, ३१७, ३२०, ३२३, ३२६, ३२९, ३३२, ३३५, ३३८, ३४१, ३४४, ३४७, ३५०, ३५३, ३५६, ३५९, ३६२, ३६५, ३६८, ३७१, ३७४, ३७७, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९, ३९२, ३९५, ३९८, ४०१, ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१९, ४२२, ४२५, ४२८, ४३१, ४३४, ४३७, ४४०, ४४३, ४४६, ४४९, ४५२, ४५५, ४५८, ४६१, ४६४, ४६७, ४७०, ४७३, ४७६, ४७९, ४८२, ४८५, ४८८, ४९१, ४९४, ४९७, ४९९, ५०२, ५०५, ५०८, ५११, ५१४, ५१७, ५२०, ५२३, ५२६, ५२९, ५३२, ५३५, ५३८, ५४१, ५४४, ५४७, ५५०, ५५३, ५५६, ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५७१, ५७४, ५७७, ५८०, ५८३, ५८६, ५८९, ५९२, ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०७, ६१०, ६१३, ६१६, ६१९, ६२२, ६२५, ६२८, ६३१, ६३४, ६३७, ६४०, ६४३, ६४६, ६४९, ६५२, ६५५, ६५८, ६६१, ६६४, ६६७, ६७०, ६७३, ६७६, ६७९, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ६९४, ६९७, ६९९, ७०२, ७०५, ७०८, ७११, ७१४, ७१७, ७२०, ७२३, ७२६, ७२९, ७३२, ७३५, ७३८, ७४१, ७४४, ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५९, ७६२, ७६५, ७६८, ७७१, ७७४, ७७७, ७८०, ७८३, ७८६, ७८९, ७९२, ७९५, ७९८, ८०१, ८०४, ८०७, ८१०, ८१३, ८१६, ८१९, ८२२, ८२५, ८२८, ८३१, ८३४, ८३७, ८४०, ८४३, ८४६, ८४९, ८५२, ८५५, ८५८, ८६१, ८६४, ८६७, ८७०, ८७३, ८७६, ८७९, ८८२, ८८५, ८८८, ८९१, ८९४, ८९७, ८९९, ९०२, ९०५, ९०८, ९११, ९१४, ९१७, ९२०, ९२३, ९२६, ९२९, ९३२, ९३५, ९३८, ९४१, ९४४, ९४७, ९५०, ९५३, ९५६, ९५९, ९६२, ९६५, ९६८, ९७१, ९७४, ९७७, ९८०, ९८३, ९८६, ९८९, ९९२, ९९५, ९९८, १००१, १००४, १००७, १०१०, १०१३, १०१६, १०१९, १०२२, १०२५, १०२८, १०३१, १०३४, १०३७, १०४०, १०४३, १०४६, १०४९, १०५२, १०५५, १०५८, १०६१, १०६४, १०६७, १०७०, १०७३, १०७६, १०७९, १०८२, १०८५, १०८८, १०९१, १०९४, १०९७, १०९९, ११०२, ११०५, ११०८, ११११, १११४, १११७, ११२०, ११२३, ११२६, ११२९, ११३२, ११३५, ११३८, ११४१, ११४४, ११४७, ११५०, ११५३, ११५६, ११५९, ११६२, ११६५, ११६८, ११७१, ११७४, ११७७, ११८०, ११८३, ११८६, ११८९, ११९२, ११९५, ११९८, १२०१, १२०४, १२०७, १२१०, १२१३, १२१६, १२१९, १२२२, १२२५, १२२८, १२३१, १२३४, १२३७, १२४०, १२४३, १२४६, १२४९, १२५२, १२५५, १२५८, १२६१, १२६४, १२६७, १२७०, १२७३, १२७६, १२७९, १२८२, १२८५, १२८८, १२९१, १२९४, १२९७, १२९९, १३०२, १३०५, १३०८, १३११, १३१४, १३१७, १३२०, १३२३, १३२६, १३२९, १३३२, १३३५, १३३८, १३४१, १३४४, १३४७, १३५०, १३५३, १३५६, १३५९, १३६२, १३६५, १३६८, १३७१, १३७४, १३७७, १३८०, १३८३, १३८६, १३८९, १३९२, १३९५, १३९८, १४०१, १४०४, १४०७, १४१०, १४१३, १४१६, १४१९, १४२२, १४२५, १४२८, १४३१, १४३४, १४३७, १४४०, १४४३, १४४६, १४४९, १४५२, १४५५, १४५८, १४६१, १४६४, १४६७, १४७०, १४७३, १४७६, १४७९, १४८२, १४८५, १४८८, १४९१, १४९४, १४९७, १४९९, १५०२, १५०५, १५०८, १५११, १५१४, १५१७, १५२०, १५२३, १५२६, १५२९, १५३२, १५३५, १५३८, १५४१, १५४४, १५४७, १५५०, १५५३, १५५६, १५५९, १५६२, १५६५, १५६८, १५७१, १५७४, १५७७, १५८०, १५८३, १५८६, १५८९, १५९२, १५९५, १५९८, १६०१, १६०४, १६०७, १६१०, १६१३, १६१६, १६१९, १६२२, १६२५, १६२८, १६३१, १६३४, १६३७, १६४०, १६४३, १६४६, १६४९, १६५२, १६५५, १६५८, १६६१, १६६४, १६६७, १६७०, १६७३, १६७६, १६७९, १६८२, १६८५, १६८८, १६९१, १६९४, १६९७, १६९९, १७०२, १७०५, १७०८, १७११, १७१४, १७१७, १७२०, १७२३, १७२६, १७२९, १७३२, १७३५, १७३८, १७४१, १७४४, १७४७, १७५०, १७५३, १७५६, १७५९, १७६२, १७६५, १७६८, १७७१, १७७४, १७७७, १७८०, १७८३, १७८६, १७८९, १७९२, १७९५, १७९८, १८०१, १८०४, १८०७, १८१०, १८१३, १८१६, १८१९, १८२२, १८२५, १८२८, १८३१, १८३४, १८३७, १८४०, १८४३, १८४६, १८४९, १८५२, १८५५, १८५८, १८६१, १८६४, १८६७, १८७०, १८७३, १८७६, १८७९, १८८२, १८८५, १८८८, १८९१, १८९४, १८९७, १८९९, १९०२, १९०५, १९०८, १९११, १९१४, १९१७, १९२०, १९२३, १९२६, १९२९, १९३२, १९३५, १९३८, १९४१, १९४४, १९४७, १९५०, १९५३, १९५६, १९५९, १९६२, १९६५, १९६८, १९७१, १९७४, १९७७, १९८०, १९८३, १९८६, १९८९, १९९२, १९९५, १९९८, २००१, २००४, २००७, २०१०, २०१३, २०१६, २०१९, २०२२, २०२५, २०२८, २०३१, २०३४, २०३७, २०४०, २०४३, २०४६, २०४९, २०५२, २०५५, २०५८, २०६१, २०६४, २०६७, २०७०, २०७३, २०७६, २०७९, २०८२, २०८५, २०८८, २०९१, २०९४, २०९७, २०९९, २१०२, २१०५, २१०८, २१११, २११४, २११७, २१२०, २१२३, २१२६, २१२९, २१३२, २१३५, २१३८, २१४१, २१४४, २१४७, २१५०, २१५३, २१५६, २१५९, २१६२, २१६५, २१६८, २१७१, २१७४, २१७७, २१८०, २१८३, २१८६, २१८९, २१९२, २१९५, २१९८, २२०१, २२०४, २२०७, २२१०, २२१३, २२१६, २२१९, २२२२, २२२५, २२२८, २२३१, २२३४, २२३७, २२४०, २२४३, २२४६, २२४९, २२५२, २२५५, २२५८, २२६१, २२६४, २२६७, २२७०, २२७३, २२७६, २२७९, २२८२, २२८५, २२८८, २२९१, २२९४, २२९७, २२९९, २३०२, २३०५, २३०८, २३११, २३१४, २३१७, २३२०, २३२३, २३२६, २३२९, २३३२, २३३५, २३३८, २३४१, २३४४, २३४७, २३५०, २३५३, २३५६, २३५९, २३६२, २३६५, २३६८, २३७१, २३७४, २३७७, २३८०, २३८३, २३८६, २३८९, २३९२, २३९५, २३९८, २४०१, २४०४, २४०७, २४१०, २४१३, २४१६, २४१९, २४२२, २४२५, २४२८, २४३१, २४३४, २४३७, २४४०, २४४३, २४४६, २४४९, २४५२, २४५५, २४५८, २४६१, २४६४, २४६७, २४७०, २४७३, २४७६, २४७९, २४८२, २४८५, २४८८, २४९१, २४९४, २४९७, २४९९, २५०२, २५०५, २५०८, २५११, २५१४, २५१७, २५२०, २५२३, २५२६, २५२९, २५३२, २५३५, २५३८, २५४१, २५४४, २५४७, २५५०, २५५३, २५५६, २५५९, २५६२, २५६५, २५६८, २५७१, २५७४, २५७७, २५८०, २५८३, २५८६, २५८९, २५९२, २५९५, २५९८, २६०१, २६०४, २६०७, २६१०, २६१३, २६१६, २६१९, २६२२, २६२५, २६२८, २६३१, २६३४, २६३७, २६४०, २६४३, २६४६, २६४९, २६५२, २६५५, २६५८, २६६१, २६६४, २६६७, २६७०, २६७३, २६७६, २६७९, २६८२, २६८५, २६८८, २६९१, २६९४, २६९७, २६९९, २७०२, २७०५, २७०८, २७११, २७१४, २७१७, २७२०, २७२३, २७२६, २७२९, २७३२, २७३५, २७३८, २७४१, २७४४, २७४७, २७५०, २७५३, २७५६, २७५९, २७६२, २७६५, २७६८, २७७१, २७७४, २७७७, २७८०, २७८३, २७८६, २७८९, २७९२, २७९५, २७९८, २८०१, २८०४, २८०७, २८१०, २८१३, २८१६, २८१९, २८२२, २८२५, २८२८, २८३१, २८३४, २८३७, २८४०, २८४३, २८४६, २८४९, २८५२, २८५५, २८५८, २८६१, २८६४, २८६७, २८७०, २८७३, २८७६, २८७९, २८८२, २८८५, २८८८, २८९१, २८९४, २८९७, २८९९, २९०२, २९०५, २९०८, २९११, २९१४, २९१७, २९२०, २९२३, २९२६, २९२९, २९३२, २९३५, २९३८, २९४१, २९४४, २९४७, २९५०, २९५३, २९५६, २९५९, २९६२, २९६५, २९६८, २९७१, २९७४, २९७७, २९८०, २९८३, २९८६, २९८९, २९९२, २९९५, २९९८, ३००१, ३००४, ३००७, ३०१०, ३०१३, ३०१६, ३०१९, ३०२२, ३०२५, ३०२८, ३०३१, ३०३४, ३०३७, ३०४०, ३०४३, ३०४६, ३०४९, ३०५२, ३०५५, ३०५८, ३०६१, ३०६४, ३०६७, ३०७०, ३०७३, ३०७६, ३०७९, ३०८२, ३०८५, ३०८८, ३०९१, ३०९४, ३०९७, ३०९९, ३१०२, ३१०५, ३१०८, ३१११, ३११४, ३११७, ३१२०, ३१२३, ३१२६, ३१२९, ३१३२, ३१३५, ३१३८, ३१४१, ३१४४, ३१४७, ३१५०, ३१५३, ३१५६, ३१५९, ३१६२, ३१६५, ३१६८, ३१७१, ३१७४, ३१७७, ३१८०, ३१८३, ३१८६, ३१८९, ३१९२, ३१९५, ३१९८, ३२०१, ३२०४, ३२०७, ३२१०, ३२१३, ३२१६, ३२१९, ३२२२, ३२२५, ३२२८, ३२३१, ३२३४, ३२३७, ३२४०, ३२४३, ३२४६, ३२४९, ३२५२, ३२५५, ३२५८, ३२६१, ३२६४, ३२६७, ३२७०, ३२७३, ३२७६, ३२७९, ३२८२, ३२८५, ३२८८, ३२९१, ३२९४, ३२९७, ३२९९, ३३०२, ३३०५, ३३०८, ३३११, ३३१४, ३३१७, ३३२०, ३३२३, ३३२६, ३३२९, ३३३२, ३३३५,

किटाणु नाशक औषधीहरूः

- डिटोल (Dettol)
- साभलन (Savlon)

पोलिसन (Polysan) छेर्ने रोगको लागि (Astringents):

- डाएडिस्को (Diadisco) कुकुर र गार्डहरू ७५-१५०, दिनमा
- डायमिस् (Diamix)
- ग्यास्टीना (Gastina tabs) ठुलो जनावर दैनिक दुई पल्ट ४ देखि ५ चक्कि सानो जनावर दैनिक दुई पल्ट २ देखि ५ चक्कि
- नेव्लोन (Nevlon) मात्रा गार्ड र घोडाहरू ३० देखि ५० ग्राम, दैनिक दुई पल्ट ।
- नेफिटिन चक्कि (Nefitin tab) बाच्छा बाच्छी १ चक्कि दैनिक दुई पल्ट
- स्टीनासिन (एम.र वी) ५ ग्राम चक्कि मात्रा एक चक्कि प्रति ३५ के.जी. तौल हुनेको लागि ।

स्टोमाकिक्स (Stomachics):

- हिमालय बतिसा
- एनोरेक्सन ट्याब (Anorexon tabs)
- हेरमिन्सा (Herminsa)

रुमेन्टन (Rumention) ट्रान्क्युलीजर (Tranquulizer):

- सिक्वल (Siquel) एक एम.एल.मा २० मिलि ग्राम । कुकुर र बिरालो २ देखि ४ मिलि ग्राम । गार्ड गोरे २० मिलि ग्राम र १०० के.जी. तौल बराबरलाई ।
- लारजेक्टल (Largectal) २५ - ५० प्रतिशत मिश्रण १० र २५ मिलि ग्रामको चक्कि । कुकुर प्रति के.जी. तौलको लागि ५ मिलि ग्राम गार्ड र गोरे ५ प्रतिशत मिश्रणको १० एम.एल. प्रति १०० के.जी. तौलको लागि ।

सबै किसिमको जिबाणुहरू (Bacteria) लाई मार्ने औषधी: एन्टीबायोटिक (Antibiotic Injection) इन्जेक्सन:

- अक्सिटेक्लिन (Oxytetrin) मात्रा: ठूला जनावरहरूको लागि १ देखि २ एम.एल. प्रति के.जी. तौलको लागि कुकुर बिरालो १ एम.एल. प्रति १० के.जी. तौलको लागि ।
- टेरासाइसिन (Terramycin) मात्रा: माथि दिइएको जस्तै हो ।

एकोमासिन (Acomycin) । मात्रा: गार्ड र घोडाहरू: २ देखि ४ मिलि ग्राम प्रति । छोटी तौलको लागि कुकुर र बिरालोहरू: ४ देखि ११ मिलि ग्राम प्रति ।

एल्बेसिलिन (Albercillin) (एम्पेसिलिनको इन्जेक्सन) ठूला जनावरलाई ५०० मि.ग्रा. । छोटी जनावरलाई २५० मि.ग्रा. ।

कम्बोसिलिन (Combios) आधा ग्राम । मात्रा: गार्ड, बैसी १ एम.एल. प्रति १० के.जी. तौल । भेडा बाख्रा १ एम.एल. प्रति ४ के.जी. तौल । कुकुर बिरालो एक चौथाई एम.एल. प्रति २ के.जी. तौल ।

प्रयोगमा आउने मुख्य औषधी:

- काल्कोरल (Calchoral)
- मिक्कल (Mikex)
- कल्सियम ग्लुकोटिन (Calcium Boro glucoide)
- बोलामिन (Bolamin)
- लिवोडिन (Livoglin)
- लिवर एक्स्ट्रैक्ट (Liver extract)
- विटामिन बी कम्प्लेक्स (Vitamin B Complex)

नश्वर औषधी:

- प्रजुना (Prjunan) गार्ड र बैसीको लागि दिनमा २-३ चक्कि (३ दिनको लागि)
- बाथुपाना (Bathupana)
- वेस्टोवोल (Vestovol), मात्रा: १ देखि २ एम.एल. मासुमा (LM) ३ दिन भित्र ।
- बाक्का ०.२५ एम.एल. मासुमा ।

पर्यायवाचीको लागि उपचार गरिने औषधीहरू:

- डाल (Dal), (Poison)
- लोरेक्सान डर्न डुलो (Lorexane Dusting Powder)

नयाँ नपर्ने पशुमा प्रजनन गराउनु उत्पादन राम्रो हुन्छ ।
पढनाता प्रजननले सन्तान छिडन्छ र रोगी हुन्छ ।

२६. प्रेस्क्रिप्शन अनुसार औषधि विक्री वितरण गर्ने तरिका र शब्दावलीहरूको प्रयोग

प्रेस्कृषन चिकित्सकले विरामीलाई औषधि सेवन गर्ने विधि र औषधिको बारेमा उल्लेख गरिने निर्देशन हो । वास्तवमा भेटिरनरि डाक्टरले विरामी पशुलाई जाँच गरेको लक्षण (अवस्था), निदान तथा उपचार बारे उल्लेख गरिने निर्देशन हो । जसमा औषधि विक्री वितरण गर्ने व्यक्ति र विरामी पशु हेर विचार गर्ने व्यक्तिलाई दिइने निर्देशन हो । प्रेस्कृषनमा जुन औषधि लेखिएको हुन्छ त्यही औषधि उपलब्ध गरि दिनु पर्छ र प्रेस्कृषनमा उल्लेख शब्दहरूको अर्थ पनि बुझाइ दिनु पर्छ । खुवाउने तरीका, औषधि दिने विधि र अवधि बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यस्तै विरामी पशुलाई हेरचार गर्ने व्यक्तिले प्रेस्कृषनमा निर्देशन भए बमोजिम कुन औषधि कति बेला कति मात्रा खुवाउने, लगाउने, सुइ दिने आदि जानकारी लिई सोही अनुसार उपचार गराउनु पर्छ ।

योरयता प्राप्त डाक्टरले लेखेको प्रेस्कृप्शन हेरी औषधि वितरण गर्ने तरीका औषधि विक्री वितरण कर्ताले औषधि वितरण गर्दा ठिक औषधि ठिक मात्रामा ठिक समयको फरकमा यति दिन सम्म खुवाउने भनेर बताउनु पर्दछ । यसरी राम्ररी व्याक्ति गरी औषधिको गुणस्तर नघट्ने गरी दिनु पर्दछ । यसरी औषधि विक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले धेरै इमान्दार र सावधान साथ काम गर्नु पर्दछ । जस्तै शाल किन्न आएको व्यक्तिलाई कोदालो दिए पछि के साधारण व्यक्तिले स्वीकार्छ ? तर Oripain बोलसको सट्टा भिन्य बोलस दिएमा किसानले धाहा पाउने कुरा आउँदैन र स्वीकार्छ । त्यसैले सावधान हुनु आँ आवश्यक छ । औषधि विक्रीला मात्र विक्रीला नभई समाज सेवी पनि हो । किनभने तपाईं वस्तुभाउलाई सन्जीवनी बुटी दिनु हुन्छ तर बिष होइन । पसल सदा-सर्वदा सफा र स्वच्छ राख्नु पर्छ ।

प्रेस्कृषन हेरेर औषधि वितरण गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ:

- प्रेस्कृषनमा के लेखेको छ, त्यो राम्ररी बुझ्ने तर अन्त्यज नलगाउने, गुण औषधि हो स्पष्ट बुझेर मात्र दिनु पर्दछ । रङ्ग र पाकेट मात्र हेरेर होइन ।
- औषधिको मिति र गुणस्तरको जाँच गर्ने । जस्तै: भन्सार भित्र कुनै टुक्रा भएकण र बादल जस्तो देखिएको हुनु हुँदैन । सिसि नफुट्ने एवं राम्ररी बन्द भएको हुनु पर्दछ । धुलो औषधिमार् डल्ला परेको हुनु हुँदैन । दयाबलोट, बोलस, क्याप्सुल र मलहमको पाकेट फुटेको वा भिजेको हुनु हुँदैन ।
- औषधिको नाप तौल राम्ररी गर्ने ।

दयाबलोट, बोलस, क्याप्सुललाई राम्ररी कागजमा प्याकिङ्ग गर्ने अनि बाहिरबाट पशु औषधि हो लेख्ने । झोल औषधिलाई सिसिमार् राखी बाहिरबाट उक्त औषधिको नाम लेखि दिने । ट्युबलाई प्याकिङ्ग गर्न पर्दैन।

पशु भएको कागजको टुक्रामा औषधि कसरी खान दिने भनी लेख्ने:

- औषधिको कति मात्रा खान दिने ।
- दिनको कति पटक खान दिने ।
- कति दिनसम्म खान दिने ।
- जगा अगाडि वा खाना पछाडि । जस्तै जुकाको औषधि खाली पेटमा दिने ।
- औषधि खाए पछि के दुष्पभाव पर्न सक्छ । त्यो पनि बताइ दिने।

कति उल्लेखित सबै लेखेको कागज औषधिको प्याकमा टासी दिने ।

निर्देशनमा प्रयोग गरिने शब्दावली, तिनीहरूको प्रयोग र अर्थहरू:

लाटिन	अंग्रेजी	नेपाली
Ad libitum (ad. Lib.)	As much as wanted.	आवश्यकता अनुसार
Ad libitum (a.c.)	Before meals.	खाना अगाडि
Bis in die (b.i.d.)	Twice daily.	दिनमा २ पटक
Post (p.)	After	पछि
Post cibum (p.c.)	After meal	खाना खाए पछि
Quantum satis/sufficient	A sufficient amount	प्रशस्त मात्रा
Quotidie (q.s.)	Every day	प्रत्येक दिन
Quaque die (q.q.d.)	Every day	प्रत्येक दिन
Quaque hora (q.q.h.)	Every hour	प्रत्येक घण्टा
Quater in die (q.i.d.)	Four times a day	दिनमा ४ पटक
Statim (stat.)	Immediately	तुरन्तै
Ten in (i.i.d.)	Three times a day	दिनमा ३ पटक

उपचारको लागि शरीरमा औषधि दिने विभिन्न तरिका (बाटो) शब्दावलीका प्रयोग तथा अर्थ:

<i>Symbol</i>	<i>Full form (used)</i>	<i>Nepali (used)</i>
• Oral	Oral	मुखबाट औषधि दिने
• Intram	Intra mammary	धुनबाट औषधि दिने
• IU	Intra uterine	पेटेघरमा दिने
• IM	Intra muscular	सुईबाट मांसमा दिने
• IV	Intra venous	रक्तनलीमा सुई दिएर
• S/C	Subcut Eutaneous	छालामुनी दिएर
• I/D	Intra derm (dermis)	छाला भित्र दिएर
• Drop	Eye, nose, ear	आँखा, नाक, कानमा थोपा दिएर

चर्पी बनाऔं र सधैं चर्पीमा दिसा पिसाव गरौं ।

१७. कुनै जनावरलाई दिन नहुने औषधिहरू तथा जनावरलाई दिनु अगाडि मिसाउन नहुने औषधिहरू

जनावरलाई दिन नहुने औषधिहरू:

- जनावरलाई **ट्रासाक्लीन** गुप तथा फिनोथायोजिन गुपको औषधि दिएमा पेट गुडेर मर्ने सम्भव ।
- जनावरलाई **Asprozone** (एसिप्रोमाजिन) दिएमा श्वास प्रश्वास कम र मुटुको गुनगुनीमा **कोरबल** हुन सक्छ ।
- यदि वैसीलाई **Xylazine** (जाइलेजिन) वा **Morphine** दिएमा एकदमै चाँडो बेहोस हुन्छ वा **पुलाए** जस्तो गर्दछ ।
- गुपलाई **Zodochlorhydroxyamin** दिएमा बहुला जस्तो भई मर्न सक्छ।
- जनावरलाई **Aminoglycosides** दिएमा नशामा गडबडी गर्दछ । **Morphine** दिएमा **पुलाए** जस्तो गर्दछ ।

जनावरलाई दिन अगाडि मिसाउन नहुने औषधिहरू: निम्न औषधिहरू एक जनावरमा पिसाएर दिनु हुदैन; किनकी मिसाउँदा औषधि नहुल्ने, रङ्ग बदलिने, साथै औषध आदि प्रकारका प्रतिक्रिया हुन सक्छन्:

• **वल्फेटमा** Atropine Sulphate मा Bicarbonate वा Diazepam मिसाउनु हुँदैन ।

• Ethionamphenical मा Hydrocortisone Sodium Succinate वा Chlor Promazine Hydrochloride वा Gentamycine Sulphate, Erythromycine, Penicillin Tetracycline मिसाउनु हुँदैन ।

• Gentamycine Sulphate मा Synthetic Penicillin, Cephalosporins मिसाउनु हुँदैन।

• Penicillines मा Salt वा Calcium, Magnesium, Penicillin, Cephalosporin वा Tylosine, Bicarbonate मिसाउनु हुँदैन ।

• Calcium Gluconate मा Carbonate वा Tetracycline वा Phosphate वा Sulphate मिला मिसाउनु हुँदैन ।

जनावरलाई औषधिमा कुनै पनि मिसाउनु हुँदैन । Semisynthetic Penicillin, Sodium Benzyle Penicilline, Barbuturates, Diazepam, Vitamin B Complex:

• Ampicillin Sodium लाई Dextrose वा Glucose Solution मा कहिल्यै पनि घोल्नु हुँदैन ।

• Diazepam कुनैमा नघुल्ने हुँदा घोल्नु हुँदैन ।

- Oxytetracycline लाई Glucose Saline वा Calcium वा Magnesium Solution पोल्नु हुदैन ।
- Sodium Bicarbonate लाई Fingers Solution वा Calcium Borogluconate पोल्नु हुदैन ।

Antimicrobial औषधिहरू बीचको सम्बन्ध: Antimicrobial औषधिहरू एकै साण एउटै जनावरलाई दिइयो भने ती दुवैको साविक काम भन्दा पनि बढी काम हुन्छ । जस्तै: $2+2=5$ (Synergistic). यदि दुई वटै Bacteriostatic औषधिहरू एकै साथ एउटै जनावरलाई दिइयो भने ती दुवैको जोडाको काम भन्दा दोब्बर काम हुन्छ ।

Additive:

- Bactericidal
 - Penicillin, Nitrofurans
 - Cephalosporine, Aminoglycosides
 - Metronidazole
- Trimethoprim, Sulfonamide
- Bacteriostatic
 - Tetracycline
 - Chloramphenicol
 - Sulphonamides
 - Macrolides

**सधैँ सफा दूध पिऔँ ।
फोहर दूधले रोग लाग्न सक्छ ।
होशियार होऔँ ।**

पक्ष जनावरमा औषधि र खोप प्रयोग गर्ने तरिका तथा माध्यमहरू

पक्षीमा औषधि प्रयोग गर्ने तरिका तथा माध्यमहरू

प्रयोग गर्ने औषधिहरू (खुवाएर)- मुखबाट खुवाइने औषधिहरूलाई पनि तयारकाबाट प्रयोग गरिन्छ:

कान वा पानीमा मिसाएर: धेरै पशुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको र सँगै औषधि खुवाउनु पर्ने अवस्थामा दाना वा पानीमा औषधि मिसाएर खुवाइन्छ । यसरी खुवाउँदा गन्ध नआउने, तिला वा नमिठो स्वाद नभएका भए पशुले खाई खान्छन् । यसरी औषधि खुवाउँदा सकभर भोकै र व्यास लागेको अवस्थामा खुवाउनु पर्छ । धूलो, चक्की तथा झोल औषधिहरू यसरी खुवाइन्छन् । चक्की औषधिलाई पिठोको ढल्ला बनाई पातमा बेरेर अथवा पिठेर दाना वा पानीमा मिसाई खुवाइन्छन् ।

झोच गर्ने (पिलाउने): कतिपय पाउडर/झोल औषधिहरूलाई सल्लर तथा साबना पोली बरसको रुखो वा झेचि बोलल वा झेचि गनको मदतबाट पिलाइन्छ । जुकाका औषधिहरू प्रायः झेचि गरिन्छन् ।

बलिङ गन/ट्याबलेट गनको प्रयोग: चक्की औषधिहरू खुवाउँदा बलिङ गन वा ट्याबलेट गनको मदतबाट खुवाइन्छ । यो बन्दुक जस्तै प्रयोग गरिन्छ ।

पक्षी गर- कतिपय औषधिहरूको प्रयोग सुई लगाएर पनि गरिन्छ । सुई नलागे अझ भएर गर्ने, पोल्ने खालका औषधिहरू प्रयोग गरिन्छन् । सुई

प्रयोग गर्ने विभिन्न तरीकाहरू छन्:

माथुमा सुई हिने (I/M): जनावर हेरेर सुई हिने ठाउँ पनि फरक-फरक हुन्छ । गाई, भैसी, घोडा, तथा बंगुरका घाटीको माथुमा र भेडा, बाख्रा, बंगुर आदिमा पछाडिको फिला माथि मासपोशीमा सुई दिइन्छ ।

छातापानी सुई हिने (S/C): गाई, भैसी, भेडा, बाख्राका घाटीको छाता तानेर सुई दिइन्छ भने कुकुर, बंगुरको पेटको छाता तानेर सुई दिइन्छ ।

नसागा सुई हिने (I/V): चाडै भएर गर्ने र धेरै मात्रामा दिइने औषधिहरू र इन्फेक्सीका बेला दिइने औषधिहरू नसागाट सुई दिएर प्रयोग गरिन्छ । नसागा सुई हिने ठाउँ जनावर अनुसार फरक-फरक हुन्छ । गाई, भैसी, भेडा, बाख्रालाई घाटीको नसा (Jugular Vein)बाट सुई दिइन्छ ।

पुष्पाट दिइने औषधिहरू: जुनेलो भएको बेला पुनबाट औषधि दिइन्छ ।

भिने टाढिने औषधिहरू: पाठेघर सम्बन्धि रोग लागेमा एन्टीबायोटिक्स जस्त औषधि पाठेघर भित्रै राखिन्छ ।

बाह्य प्रयोग: छाला सम्बन्धि रोगहरूमा कतिपय औषधिहरू (मलहम, पाउडर) छालामा लगाइन्छ ।

जनावरमा खोप प्रयोग गर्ने तरिका तथा माध्यमहरू

सुईबाट: प्रायः जसो जनावरका खोपहरू सुईबाट प्रयोग गरिन्छन् । सुईबाट प्रयोग गरिने धेरै जसो खोप छालामुनी S/C दिइन्छ, जसको बारेमा माथि वर्णन भैसकेको छ ।

पानीमा भिसाएर (मुबबाट): प्रायः जसो कुबुराका खोपहरू पानीमा घोलेर खुवाइन्छ । गम्बरो, रानीखेत रोगका खोपहरू पानीमा घोलेर खुवाइन्छन् ।

से गरेर वा आखा/नाकमा खोप (औषधि) दिएर: प्रायः जसो कुबुराका साथै १ दिने चल्तालाई दिइने मरेक्सको खोप र रानीखेत एक वान (F1) खोप कुबुराका चलाको आखा वा नाकद्वारा तथा से गरेर दिइन्छन् अथवा १/१ थोपा आखा वा नाकमा सिरिन्ज वा ड्रपरबाट खोप दिइन्छन् ।

उन्नत जातका पशुपंक्षी पाल्ने गरौं ।

२९. आलु घाउबाट रगत बगेको रोक्ने तथा छालामा टाँका लगाउने विधि

आलुमा भिन्न किसिमले घाउ हुन सक्छ । जस्तै लडेर, ठोकिएर, आगोले कोलेर, सिङ्ग फुक्नेर धारिलो हतियारले काटेर, गोली लागेर, किलाले काटेर आदि । साधारणतया घाउ ३ किसिमका हुन्छन्:

१. घाउ: छाला मासु कटिएको २४ घण्टासम्मको घाउलाई आलु घाउ भनिन्छ । जसमा पिप र किरा परेको हुँदैन अथवा नपाकेको स्वच्छ घाउ । पाकेको घाउ: घाउ भएको केहि दिन पछि जिवाणुको कारण घाउमा पिप भएर बग्छ । यसलाई पाकेको घाउ भनिन्छ ।

किरा परेको घाउ: घाउमा झिन्जले फुल पार्छन् । फुलबाट किरा (औसा) निस्किएर र यस्तो घाउलाई किरा परेको घाउ भनिन्छ । यस्ता किराले घाउलाई गहिरो पार्दछन् र घाउबाट रगत बग्छ ।

घाउको उपचार: आलु घाउबाट रगत बगेको रोक्ने:

पहिलसम्म आवश्यक परेमा तै काट्ने ।

घाउमा कुनै चिज भए निकाल्ने, सफा पानी वा एन्टीसेप्टिक पानीले धुइ सफा गर्ने ।

घाउलाई ओभानो पार्ने ।

रक्तमात्र बढी भएमा नियन्त्रण गर्ने ।

६. रगत बगिरहेको छ भने रगत रोक्ने औषधि जस्तै Cadichrome वा Streptobion मध्ये कुनै एकलाई ठूलो जनावरलाई 10ml, सानो जनावरलाई 2-5ml I/M वा I/V बाट दिने ।

७. धेरै मात्र रगत बगेको अवस्थामा टिन्चर बेन्जीन लगाउने वा एलम लगाउने वा आर्टिफोरसेपले रगत बगेको नशा च्यापी केही बेर राख्ने ।

८. शिरैक्स मलहम लगाउने, बन्धन मिल्ने भए पछि बाँध्ने ।

९. घाउ गरिरो भएमा एन्टिबायोटिक सुई दिने । जस्तै: पेनिसिलिन, एनोमसीसिलिन आदि ।

१०. घाउ सफा गर्ने र औषधि लगाउने काम घाउ सन्धो नभएसम्म गर्ने ।

टाँका लगाउने विधि:

१. रक्तमात्र बढी भएमा नियन्त्रण गर्ने ।

२. घाउको स्थिति र सुच्चर छनौट गर्ने ।

- | | |
|---|---|
| <p>सामान्य ननुदाहरण</p>  | <p>सामान्य नुडण्डर</p>  |
| <p>माट्रेस स्ट्रप (Mattress Straps)</p>  | <p>घातको टाँका</p>  |
- टाँका लगाएको (छाता बिलएको)

- सियोलाई घाउको एक छेउबाट तन्तुको पत्र छेड्दै लैजाने, अर्को छेउको पत्र पनि छेडी त्यहीबाट निकाल्ने ।
- त्यसै साइडतिरको घाउको छेउमा तन्तुको पत्रलाई छेडी सियो धकेल्ने
- त्यो सियोलाई पहिले शुरु गरेको साइडतिर नै घाउको अर्को तन्तुको पत्रलाई पनि छेडेर निकाल्ने ।
- धागोलाई तन्काउन पहिले शुरु गरेको धागोलाई अलिकति तानेर तल घाउलाई दबै छेउ सँगै ल्याउने र अनि पछिको धागो पनि लिई धेरै नकसेर बाहिर दिने ।
- गाढो बलियोसँग बनाउने, नाइलन भए कभ्रिमा ३ गाढो पार्ने ।
- यसै गरी अर्को कुनासम्म पुर्‍याउन सिलाउने प्रकृया दोहोर्‍याउँदै जानु पर्छ ।

पोष्ट अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट (Post Operative Treatment):

ताजा घाउलाई सूचारु गरिसकेपछि घाउको वरिपरि लागेका रगतहरू तथा अन्य पदार्थहरूलाई राम्रो तरिकाले सफा गर्नु पर्दछ । घाउलाई एन्टिबायोटिक मलहम वा पाउडरले सफा गर्ने । घाउमा इन्फेक्सन हुन नदिन तथा घाउ छिटो निको हुनलाई ५ देखि ७ दिनसम्म एन्टिबायोटिक सुईहरू माथि लगाउनु पर्दछ तथा घाउलाई दैनिक हेर विचार गर्नु पर्दछ । दुखाई कम गर्न औषधिहरू जस्तै बोलिन, डेक्लोफेनेक सुईहरू ठुलो जनावरमा १० देखि १५ एम.एल. र साना जनावरमा २ देखि ५ एम.एल. मासुमा दिने ।

जथाभावी वनजंगल नकाटो

१०. आँखा पाक्ने तथा फुलो पर्ने रोगको कारणहरू, उपचार तथा रोकथामका उपायहरू

जस्तै आँखामा पनि विभिन्न समस्या हुने गर्दछन् । जस्तै: आँखा पर्ने तथा घाउ हुने आदि ।

आँखाको सेतो भागमा ज्वलन (Inflammation) भयो भने कन्जुक्टिभाइटिस (Conjunctivitis) भनिन्छ । आँखा पाक्ने रोग बिचापुबाट हुन्छ । आँखा पाक्नेको अवस्थामा आँखाबाट धेरै पानीसहित आँखाको सेतो भाग र कोष रातो देखिन्छ । आँखा पानीसहित हुन्छ । परेला सुनिएको देखिन्छ । घाममा हेर्दा दुख्ने भएता पनि आँखाको हुन्छ । आँखा जाँच गर्न पशुलाई राम्ररी बाँधेर पुर्यानु पर्छ । हात राम्ररी सफा गर्नु पर्छ । आँखामा पर्ने परेको छ कि हेर्ने र सम्भव भएसम्म निकाली दिने गर्नु

आँखाको पानीमा १ भाग बोरीक एसिड र १०० एम.एल. पानीको साथमा १ कपास भिजाएर आँखा सफा गरि दिनु पर्दछ ।

आँखाको दृष्यबिम्ब (Ophthalmic) भनी लेखिएको औषधि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ ।

आँखाको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक मलहमहरू बजारमा पाइन्छन् । यी मलहमहरू आँखालाई सफा पानीले धोए पछि यी औषधि दिनको २ पटक लगाउनु पर्छ । आवश्यकता अनुसारको मात्रामा ७-१० दिनसम्म प्रयोग गर्नु पर्दछ । मलहममा क्लोरोफेनिकल, टेट्रासाइसिन, साँध प्रयोग गरिन्छ । झोल औषधिमा सोफामाइसिन, जेन्टामाइसिन आदि प्रयोग गरिन्छ । झोल औषधि दिनमा ५-१० पटक प्रयोग गर्नु पर्दछ । सेतोपट्ट रपमा सोफाकर्ट, जेन्टामाइसिन र प्रेडनीसोलन कम्बाइन्ड संयुक्त रूपमा आँखाको लागि झोल औषधि बनेको हुन्छ । तर घोडाभा काहिल्यै पनि सेतोपट्ट झोल, मलहम प्रयोग गर्नु हुन्न ।

आँखाको आँखाको रोगीलाई भिन्दै राखी उपचार गर्नु पर्दछ ।

जस्तै पनी, आँखाको नानीमा ढाकिने सेतो बादल जस्तोलाई फुलो परेको भनिन्छ । फुलो सानो देखि पुरै नानी ढाक्ने पनि हुन्छ । उपचार गर्न हिलो लगाएमा फुलो हट्दैन । फुलो पर्ने धेरै कारणहरू छन् । जस्तै: चोट पटक, जस्तै भएपछि, फुलो रासायनिक कण आँखामा पर्नु ।

उपचार:

- बोरिक एसिड घोल (१ भाग बोरिक एसिड र १०० भाग पानी) वा मनतातो पानीले विस्तारै आँखा सफा गर्ने ।
- मरिच चपाएर आँखामा फुकेर हलने चलन पनि छ । गाउँघरमा महि बेसार आँखामा राख्ने चलन पनि छ ।
- फुलो हटाउन क्यालोमेल पाउडर प्रयोग गरिन्छ । यो औषधि १ ग्राममा १-५ भाग सम्म बदल लागेको ठाउँमा सफा हाल्ने राखी दिनु पर्दछ वा मुखले फुकेर आँखामा राखी दिनु पर्दछ । ७-१० दिनसम्म दिनको २ पटक प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

आँखामा लाग्ने घाउ: घासले घोचेर, चोट लागेर घाउ हुन सक्छ । घाउ लाग्दा वस्तु भाउले आँसु बगाइरहन्छ । ठूलो घाउ पाक्न पनि सक्छ र यस्तो भएमा सदाकोलागि आँखाले काम नगर्ने पनि सक्छ ।

उपचार: बोरिक एसिड घोल (१ भाग बोरिक एसिड र १०० भाग पानी) वा मनतातो पानीले विस्तारै आँखा सफा गर्ने । आँखाको मलहम टेरामाइसिन, सोफ्रामाइसिन, क्लोरोफेनिकल ७-१० दिनसम्म दिनको २ पटक लगाउने । आँखामा जुका पसेर आँखाको समस्या हुन जान्छ । खास गरी पानी तथा हिलोमा बस्ने वस्तु (रागा, भैसी आदि) लाई यो समस्या देखा पर्दछ; आँखाबाट आँसु आइरहने हुन्छ ।

आँखाबाट जुकाहरू निकाल्ने विधि: कुनै किटाणु रहित लोकल एनेस्थेटिक (Xylocain) डिस्टील वाटरमा ०.२% को घोल बनाई डाइलुट गरेर आँखामा केही एम.एल. (५-१०) सिर्का छयापी दिनु पर्छ । त्यसपछि केही मिनेट पखी अनि डिस्टील वाटरले सफा गर्नु पर्छ । जुकालाई डिस्टील वाटरले पखाली बाहिर निकाल्नु पर्छ ।

३१. कान पाक्ने रोग

कानहरूमा कान पाक्ने रोग लागेमा हेलचेक्याई गर्नु हुदैन । यदि समयमा उपचार गरेमा निको हुन्छ ।

रोगका कारण: जीवाणु, पराजिवी, फन्गस, वातावरणको प्रभाव, चोटपटक ।

लक्षणहरू: टाउको हल्लाउने लक्षण देखिएमा कान भित्र केही चिलाएको हुन सक्छ । पराजिवी पनि हुन सक्छ । भेक्स, ओटाइटिस भएको हुन्छ । कानको बाहिरी भागको इनफ्लामेसनलाई ओटाइटिस एक्सटेर्ना भनिन्छ भने भित्री भागको इन्फ्लामेसनलाई ओटाइटिस इन्टेर्ना भनिन्छ । कानबाट पिप बग्ने (गल्लाई ओटोरिया भनिन्छ) । कान चिलाउने, कान भित्तामा दल्ने, खोसिने, कान रातो र तातो भई दुख्ने तथा कानबाट गन्हाउने सेतो वा पहेँलो पिप बग्ने गर्दछ ।

उपचार:

- सबै भन्दा पहिले कारण पत्ता लगाउने र सोही अनुसार उपचार गर्ने ।
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड र प्रतिशत सोलुसनले कान सफा गर्ने र क्लोरमफेनिकल वा जेन्टामाइसिन इयर ड्रप र थोपा दिनको ३ पटक राख्नुको साथै सुईको माध्यमबाट एन्टीबायोटिक्स दिने । लैङ्गकिटइ अक्सिटेद्रासाइक्लीन १ एम.एल. प्रति १० के.जी. शाश्वतिक तौलका आधारमा दिने ।
- कुकुरलाई क्लोरमफेनिकल सुई ४ मि.ग्रा. प्रति के.जी. तौल अनुसार दिने । साथै इयर ड्रप दिने ।
- घोडाको कानमा झोल औषधि नराख्ने तथा एम्पीसिलिन ७ मि.ग्रा. प्रति के.जी. तौलको आधारमा सुई दिने ।

नाता नपर्ने पशुमा प्रजनन गराउँदा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

३२. भाँचिएको, मर्किएको हड तथा जोर्नीमा काम्रो बाँध्ने तरिका

अस्थि भंग (Fractures): हाड भञ्चिएको अवस्थालाई अस्थि भंग भनिन्छ । यस्तो हाड भञ्चिदा प्रायः गरी वरिपरिका तन्तुहरू र रक्त संचार समेतमा चोट लागेको हुन्छ । नेपालको पहाडी भागमा हाड भञ्चिएको समस्या सामान्य रूपमा देखिन्छ । यसरी पुशुहरू अक्सर भिरालो पहाडबाट खसेर अस्थि भंग वा अन्य समस्या पर्दछ । अस्थि भंग भैरै प्रकारका हुन्छन् तर मुख्य ३ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:

- सरल अस्थि भंग (Simple Fracture): हाड केवल एक ठाउँमा भाँचिएको हुन्छ र छालामा कुनै घाउ हुँदैन ।
- मिश्रित अस्थि भंग (Compound Fracture): हाड एक ठाउँ भन्दा ज्यादा ठाउँमा भाँचिएको हुन्छ, तर छालामा कुनै पनि घाउ हुँदैन ।
- खुला अस्थि भंग (Open Fracture): सरल वा मिश्रित अस्थि भंग हुन्छ, जसमा छालामा घाउ पनि भएको हुन्छ । भाँचिएको हाड सोही ठाउँबाट बाहिर निस्किएको हुन्छ । तन्तु र नशामा पनि असर परेको हुन्छ ।

अस्थि भंगको परिक्षण (Examination या Fracture): हाड भाँचिएको शंका हुना साथ पशुलाई निकै होसियारीका साथ चलाउनु पर्छ र परीक्षण गर्नु पर्छ । वाड चोट लागेको र रक्तश्राव भएको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । केहि अस्थि भंग भएको ठाउँमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिदैन र पशुको एक्स-रे लिने सुविधा उपलब्ध नभएको हुँदा कहिले काहीँ भाँचिएको एकिन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अस्थिभंगाका लक्षणहरू (Signs of Fracture):

- दुखने र भाँचिएको ठाउँमा नराम हुन्छ, आकृति विग्रान्छ ।
- भाँचिएको ठाउँमा सुनिएको हुन्छ ।
- लक्कडो भई हिडने ।
- भाँचिएको हाडले काम नार्ने ।
- भाँचिएका हाडका टुक्राहरू एक अर्कोसँग राधाइस्य करकर आवाज आउने ।

अस्थिभङ्गको उपचार (Treatment of Fracture): साधारणतया हाड भिँचिएको बिरामी पशुलाई विचारपूर्वक चलाउनु पर्छ । उनीहरूको अस्थिभङ्ग बाहेक चोटपटक पनि अक्सर भएको हुन्छ । त्यसको लागि प्राथमिक उपचार (First Aid) दिनु पर्छ । खुला अस्थिभङ्ग (Open Fracture) लाई विशेष हेरविचारको आवश्यकता पर्छ । राम्रोसँग घाउको उपचार गरे पछि मात्र कामो बढिने वा प्लाष्टर लगाउनु पर्छ । कुनै पनि हाड भिँचिदा भिँचिएका टुक्राहरूलाई एक अर्का सँग टाँसिने गरेर जोड्नु पर्छ । यसलाई अस्थिभङ्ग मिलाउने (Setting)

भ्रमनिच्छ । भ्रात्रिणको ठाडलाई जबसम्म अचल गराइदैन तबसम्म भ्रमनिच्छ । यसलाई अस्तिभङ्ग स्थिरिकरण (Fixation) भनिन्छ । अस्थिभङ्ग गराउने धेरै तरीकारू छन्, जसबाट हाडहरू अचल हुन्छन् । सबभन्दा राम्रो तरीका बाँसको काम्रो बाँध्नु हो । यस्तो काम्रो प्लाष्टर भन्दा सस्तो, राम्रो बनाउन सक्ने, प्लाष्टर भन्दा हलुको, पानीले भिजे पनि प्लाष्टर नहँसिने । साथै जाँचन र घाउको उपचार गर्नु परेमा सजिलै हटाउन सकिने ।

बोधो वादिने:

- कामो बधिदा भाँचिएको ठाउँलाई सिधा बनाएर तानी भिलाउनु पर्छ ।
- कामो बधिदा दुवै तिरको जोनीलाई राखरी बाधेर अचल बनाउनु पर्छ ।
- छालामा घाउ हुन नदिन त्यहाँ बाक्लो कपडा वा कपास राख्ने ।
- कामो भित्र औसा नपरोस् भनेर किटनाशक औषधि राख्ने ।
- बास वा काठको कट्टेराको हुनु पर्छ । यी कट्टेरालाई पातलो र बलिन
- डारिलो बनेको हुनु पर्छ ।
- बनेको कामो खुट्टाको बरिपरि एक फन्का घेरा पुग्ने हुनु पर्छ ।
- कामो १ - २ महिनासम्म राख्ने (साना र ठूला पशु) ।
- हाड भाँचेको पशुको शरीर धेरै पल्ट फर्काउनु पर्छ ।
- घाउलाई औसा पुर्ने र अरु संक्रमणबाट बचाउन होसियारका साथ हेर्ने ।
- घाउ पाकेको खण्डमा कामो हटाएर परीक्षण गर्नु पर्छ र बिरुवा टेकाउन दिने ।



काष्ठा वांछने तरीका

मार्कको कारणले हुने लङ्काडोपनः जब मांशपोशी ज्यादा बटाटानिने तानिने मांशलो भारी बाबदा मांशपोशीमा ज्यादा कार्यबोझ हुन जान्छ । जसले बाट र क्षति पुग्ने हुन्छ र त्यो केही सुनिएको पनि हुन सक्छ । मांशस्थलाई हामी मर्कको (Strain or Sprain) भन्छौ । यस्ता अवस्थामा ३ दिन उपचार गर्ने पर्दछ ।

३३. जोत्ने गोह तथा रांगोलाई कांघ लागनु, फाली लागनु, मर्किनु, सुनिनु आदिको उपचार

कांघ लागनु (Yoke Gail): जोत्ने रागा तथा गोहको कांघमा जुवाको घर्षणको कारण कांघ सुनिन सक्छ, जसलाई कांघ लागनु भनिन्छ । घोडामा भने ढाडको काठी राख्ने ठाउँमा सुनिन्छ । खस्रो जुवाको कारण, कलिला बहरलाई भिलाएर नडाउनु, बढी गह्रौ सामान बोकाउनु, हल नभिलनु आदि कारणले कांघ लाग्न सक्छ । कांघ लाग्दा गरिने उपचार यस प्रकार छन्:

- बोरिक एसिड वा म्याग्सल्फ राखेको मन्तातो पानीले सेक्ने ।
- म्याग्सल्फ र ग्लिसिरिन राखी बनाएको पेष्ट सुनिएको ठाउँमा वरिपरि लगाइ दिने ।
- Inj. Diclofenac 15ml IM x ४ दिनसम्म दिने ।
- अथवा Inj. Hoshacortin 10 ml IM दिने ।
- यदि भिन्न पानी भरिएको छ भने सियेले निकाली 5ml Hoshacortin राखी दिने
- यदि पानी धेरै नै भरिएको छ वा पिय भरिएको छ भने पिलो जस्तै चिरेर घाउ सफा गरी उपचार गर्ने ।

फाली लागनु: जरागा खनजोत गर्ने हलोको प्रयोगमा फलामको ५/६ इन्च बराबरको फाली लगाएको हुन्छ । यसले जोत्ने काममा मद्दत गर्दछ । यसरी गोह वा रांगोको खनजोत गर्ने समयमा हलोको फालीले शरीरको कुनै भागमा लागेर घाउ लाग्न सक्छ । खासगरी खुट्टाको भागमा फाली लाग्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । फाली लागेमा उपचार विधि निम्न रहेको छ ।

- सबभन्दा पहिले रगत बग्ने (Bleeding) रोक्ने ।
- Antibiotic पाउडर राखेर Bandage गर्ने ।
- यदि ठूलो घाउ भएमा Suture (टाका) लगाउने ।
- Inj. Tetanus 1 - 3 Lakh मासुमा दिने ।
- कुनै Antibiotic Injection ४ दिनसम्म दिने ।
- नदुल्ने र घाउ नबढ्ने सुई दिने ।
- यदि घाउ पुरानो छ र उपचार गरेको छैन भने सोही अनुसार गर्नु पर्दछ ।

मर्किनु: जब मांसपेशी ज्यादा बढारिने र तानिने हुन्छ वा ठूलो भारी बोक्दा मांसपेशीमा ज्यादा कार्यबोझ हुन जान्छ, त्यसले मांसपेशीमा चोट अति पुग्दा उठ्छ । त्यो केही सुनिएको पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामी मर्केको (Sprain) भन्ने गर्छौ । यस्तो अवस्थामा जनावर हिडडुल गर्न सक्दैन र लड्छो हुन्छ । यस्तो अवस्था खासगरी जोत्ने गोह र रांगोमा देखिन्छ । मर्किनुको उपचार विधि तल उल्लेख गरिएको छ:

एउटा नमूना देखिन्छ:

- जनावरलाई पूर्ण आराम (Rest) दिने ।
- यदि आवश्यकता परेमा Pressure Bandage दिने ।
- पिलो Iodex, Turpentine, Relaxyl ointment ले मालिस गर्ने ।
- बोरिक एसिडले सेक्ने ।
- Inj. Diclofenac 15ml IM.
- Inj. Neurobion or optineuron 10ml IM.
- (Swelling): कहिले काही पशुको शरीर सुनिएको हुन्छ । धेरै कारणहरू छन् । यदि शरीर सुनिएको छ भने निम्न अनुसार उपचार दिनुपर्ने देखिन्छ:
- पिलो (Abscess): कुनै शरीरको भाग सुनिएको छ र त्यहाँ पिय जमेकै कारणले भनिन्छ । यो धेरै जसो सानो घाउमा संक्रमण भएको परिस्वरूप हुन्छ ।
- प्ररनिया (Haema): शरीरको एक भागमा भएको मांसपेशीलाई पास शरीरको अर्को भागमा निस्कन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई हरनिया भनिन्छ जस्तै: पेट भित्रको आन्त्रा त्यही चूडको प्वालबाट बाहिर निस्कन्छ र मुनि ठूलो थैलो बनाउँदछ ।
- सिस्ट (Cyst): यो पनि पिलो जस्तो हुन्छ तर त्यसमा पिय नआएर जस्तो तरल पदार्थ हुन्छ ।
- हेमेटोमा (Haematoma): यो पनि सुनिएको हुन्छ: तर भिन्न रगत जस्तो पदार्थ हुन्छ ।

छोरा होस् वा छोरी, दुवै बराबरी

३४. अरुचि तथा सुल रोग र यसको उपचार

अरुचि: अरुचि कुनै रोग नभई विभिन्न रोगहरूमा देखिने लक्षण हो, यो खास गरी पाचन प्रणालीको रोगहरूको लक्षण हो ।

कारण:

- विभिन्न रोगहरू जस्तै पेट फुल्ने, छैरौटी, अपच, अजिर्ण, सुल कब्जियत् ।
- कुनै कडा रोगको कारण पनि अरुचि हुन सक्छ ।
- सधै एकै किसिमको आहारा खाएमा ।
- बथुवा पशुहरूलाई यो समस्या बढी हुन्छ ।
- बुढा पशुहरू, गर्भावस्थामा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
- जुकाको प्रकोपले प्रायः ९० प्रतिशत यहि नै समस्या हुन सक्छ ।

लक्षण:

- आहारा पटककै खान मन नलाग्उने ।
- खान कोशिस गर्ने तर अलिअलि मात्र खाने ।
- आहारा छनौट गरी खाने ।
- गोबर असामान्य हुने ।
- पशु निदाउरो हुन्छ ।

उपचार:

- हिमालय बरिसा २० ग्राम देखि ५० ग्राम तथा एच.बी. स्ट्र १० ग्राम ३ - ५ दिनसम्म खुवाउने ।
- रमेन बोलस तथा रमेनटोन बोलस २ वटा दिनको २ पटक ३ दिनसम्म खुवाउने ।
- जुकाको औषधि नियमित रूपले खुवाउने ।
- आहारा परिवर्तन गर्ने तथा स्वच्छ पानी र आहारा दिने ।
- इन्जेक्सन लुट्रीलिव १० मि.लि. मासुमा सुई दिने ।
- सम्बन्धित रोगको उपचार गर्ने ।
- गोबर जचाउने र सो अनुसार उपचार गर्ने ।

सुल (Colic): यो पशुहरू खास गरी घोडालाई लाग्ने बिरामी हो । यो रोग लागेमा पशु एकैछिनमा छटपटाई मर्न सक्छ । सुल अत्यन्तै छोटो समयमा असर गर्ने घातक रोग हो । यो विभिन्न कारणबाट हुने गर्छ ।

कारण:

- अत्यन्त थकावट, कमजोरी अवस्था ।
- आन्दा बढारिनु ।
- पाठेघर बढारिनु (गर्भावस्थामा) ।
- विषालु घास, किरा, दाना आदि खाएर ।
- विभिन्न कडा रोगहरू ।

लक्षण:

- पशु छटपटाउने ।
- कराउने, भान्ने, उठबस गर्ने ।
- खुट्टाले कोर्ने ।
- खुट्टा चौडा गरेर उभिने ।
- पटक पटक घुमी आफ्नो भुइतर्फ हेर्ने ।
- पटक पटक अलिअलि पिसाब गर्ने ।
- पेट फुल्ने, कब्जियत हुने आदि लक्षणहरू ।

उपचार:

- इन्जेक्सन बोलिन ठूला पशुलाई ३० एम.एल. मासुमा, साना पशुलाई १० देखि २० एम.एल. मासुमा ।
- सम्बन्धित रोगको उपचार गर्ने ।
- एथिल, डेक्सोना सुई (गर्भणी नभए) ५ देखि १० एम.एल. मासुमा दिने ।
- सजिलो ठाउँमा पशु राख्ने ।
- पशु छटपटाउँदा चोट पटक लाग्नबाट जोगाउने ।
- इन्जेक्सन लिभोजेन १० मि.लि. मासुमा सुई दिने ।

रोग लागेर औषधी गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु राम्रो हो ।

३५. अजिर्ण/अपचको समस्या तथा निराकरणका उपायहरू

अजिर्ण (Impaction)/अपच (Indigestion) पाचन प्रणालीका समस्याहरू हुन् । यी कुनै न कुनै रोगका समस्या हुन सक्छन् वा आहारको गडबडीले देखिने गर्छन् ।

अजिर्ण (Impaction): ठुला जनावरको रुमेन (प्रथम भुँडी) प्रभावित हुन्छ । साना पशुहरूको ठुलो आन्त्रा प्रभावित हुन्छ ।

Constipation: कुकुर, बिरालो, पाड र पाडी आदि । गार्ड/बैसी: रुमेन ठोस खाद्य पदार्थले भरिने ।

कारण:

- सुख्खा खाद्य पदार्थ बढी भएको आहार ।
- प्रशस्त पानीको आहारसँग कमी ।
- असामान्य आहारको उपभोग ।
- कडा रोगहरूको असर ।
- जुकाको प्रकोप ।
- आन्त्रा बटारिनु ।

बढी नल/परालको प्रयोग, हरियो घाँसको अभाव, असामान्य आहार: मकैका घोगाहरू, अपको कोया आदि उपभोग लगायत उपरोक्त विभिन्न कारणले भुँडीमा भोजन जम्मा रहिरहने तर गोबर कम आउने गर्छ ।

लक्षण:

- अरुचि (आहारा खान नरचाउने) ।
- नउग्राउने ।
- दुखाई (छटपटाहट) ।
- गोबर गोद्वर गर्छ ।
- पेट फुल्ने, पेटको गति कम वा बन्द हुने ।
- उत्पादन घट्ने ।
- देब्रे पेट च्याप्पा कडा पाइने ।

उपचार:

कारण के हो ? सो को निराकरण गर्ने ।

आमारी: आहारा परिवर्तन गर्ने । हरियो घाँस र सुख्खा घाँस मिलाएर दिने ।

गोठो आहारा प्रयोग नगर्ने ।

प्रत्येक ३ - ६ महिनाको अन्तरालमा Drenching गर्ने ।

ज्वरहरूको प्रयोग गर्ने ।

मासु: ५० ग्राम ठूलो पशु, २५ ग्राम सानो पशु ।

M. Strong: १० ग्राम ठूलो पशु, ५ ग्राम सानो पशु ।

१०४ दिनसम्म दिने । Pachopius, Rumicare, Rumet, Rumentone etc. प्रति दिन २ बोलस ३ दिनसम्म दिने ।

Polmy/Livogen/Liverjet/Hivir etc Injections 5-10ml I.M. 1 day बिराएर पुई दिने ।

कडा अजिर्ण छ भने:

- Magsulf खुवाउने: ठुला पशुलाई ३००-५०० ग्राम । साना पशुलाई ५० - ३०० ग्राम ।
- खाने तेलको प्रयोग: १/४ - २ मानासम्म: पशुको अजिर्ण अवस्था हेरिकन खुवाउने ।
- प्रशस्त ताजा पानी दिने ।
- दल प्राविधिकको मद्दत लिने ।

अपच (Indigestion): यो पनि पाचन प्रणाली खासगरी भुँडीकै गडबडीले जम्मा हुने रोग, समस्या हो । अपच विभिन्न किसिमको हुन्छ । कुकुर, गोराली, पाडापाडी आदि पशुलाई ठूलो आन्त्रमा भोजन जम्मा भएर अपच बढी पुग्छ ।

लक्षण:

- जुकाको प्रकोप ।
- खाद्य गडबडी ।
- आन्त्रको रोगहरू ।
- T.R.P. (तार, कटी खाहुनु) ।
- शाल-जाल, असामान्य बस्तु खाहुनु ।

३६. प्रभुहरूमा लाने खोकी, धम्की, न्युमोनियाका कारण, उपचार तथा रोकथामका उपायहरू

पिनीहरू श्वास प्रणालीमा असर पार्ने रोगहरू हुन् । पिनीहरूले श्वास प्रश्वास सम्बन्धि असामान्य अवस्थाहरू देखाउँछन् । सामान्यतया गाई, भैसी, भेडा, बाख्राहरूले क्रमशः १६-२२, २२-२८, २८-३० पटक प्रति मिनेट श्वास फेर्दछन् । यी श्वास प्रश्वास दरमा तलमाथि पर्नु यी रोगहरूको प्रमुख लक्षण हो । यी रोगमा निम्न लक्षणहरू देखा पर्दछन्:

- श्वास प्रश्वास दरमा घटबढ हुनु ।
- सामान्य श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा फरक पर्नु । थोच्चासिक रिसाइरेशन, एन्डोमिनल रिसाइरेशन, कोस्टल रिसाइरेशन आदि ।
- श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुनु ।
- श्वास प्रश्वास लिंदा विभिन्न प्रकारका असामान्य आवाजहरू आउनु । फोक्सोमा आवाज वा श्वास फेर्दा छार छार सिटी लगाए जस्तो, हुक्का गुडगुडाए जस्तो वा विभिन्न बाजा बजे जस्तो आदि ।
- उकालोमा हिड्न वा भारि बोक्न, कसरत गर्न कठिनाई हुने, दम बढ्ने ।
- संक्रमणको अवस्था अनुसार ज्वरो बढ्ने ।
- श्वास प्रश्वासका अङ्गहरूमा अवरोध उत्पन्न हुने ।
- खोकी बढ्ने ।
- खकारको रङ परिवर्तन हुने ।

माथि उल्लेखित खोकी, धम्की र न्युमोनियाका सामान्य लक्षणहरू हुन् । यी लक्षणहरू प्रायः सबै रोगमा पाइन्छन् । त्यस्तै प्रकारले यी रोगका कारणहरू पनि सामान्यतया मिल्दा जुल्दा छन् । यी रोग निम्न कारणले हुन्छन्:

- वातावरणीय प्रभावः प्रकृतिको वातावरण चिसो वा गर्मी बढ्दै जाँदा श्वास प्रश्वासका अङ्गहरूमा असर पर्दछ । जसले गर्दा सामान्यतया खोकी, सर्दिबाट शुरु भई बिग्रै गएमा धम्की, न्युमोनियाको रूप लिन्छ ।
- प्रतिक्रिया (Reaction): शरीरमा औषधि नखपेमा रियाक्शन हुन्छ । त्यस्तै प्रकारले धुलो, ग्यास, बालीनलीको हुटो, धुवाँ तथा अन्य प्रकारका रियाक्शनहरूले यी रोगको शुरुवात हुन्छ ।
- पराजिवी: शरीरमा हुने विभिन्न प्रकारका जुकाहरूको वयस्क तथा लार्वा अवस्थाहरू श्वास प्रश्वासका विभिन्न अङ्गहरूमा बस्दछन् । तिनीहरूले श्वास प्रश्वासका अङ्गमा अवरोध तथा वरिपरिको अङ्ग बिगार्दछन् । जसको कारणबाट यी रोग देखा पर्दछन् ।

- दुसीको कारणः श्वास प्रश्वासका अङ्गहरूमा एसरिजलेसिस, राइनोम्योसिटिडको जगतका दुसीहरू श्वास प्रश्वास अङ्गमा प्रवेश गर्दछन् । जसको कारण रोग देखा पर्दछन् ।
- जिवाणुः विभिन्न कोकस, सेरोफोरस, ग्लैण्डर टि.वि., भ्याणुले, साल्मोनेल एमिटिनो माइकोसीसहरू शरीर भित्र प्रवेश गरेमा फोक्सोको संक्रमण भन्नुमोनिया, ब्रोङ्काइटिस, धम्की, खोकी जस्ता रोग देखा पर्दछन् ।
- विषाणुः यी जिवाणु भन्दा अझ सानो रूप हो । पाटा ईन्फ्लुएन्जा, गौगोटी म्युकोसल रोग, राइनो टेकाईटिसका जिवाणुहरूले यी रोग लगाउँछन् ।

उपरोक्त कारणहरू उल्लेखित रोगहरू मात्र नभै कुनै पनि रोगका कारणहरू हुन सक्छन् । यी रोगहरू विभिन्न कारणले देखा पर्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

शरीरमा भएका अङ्गहरूमा सबैभन्दा बढी वातावरणमा भएका जिवाणु, विषाणु, धुलो, धुवाँसँग सम्पर्कमा आउने अङ्ग फोक्सो तथा फोक्सोसँग सम्बन्धित अङ्गहरू हुन् ।

- यी रोगहरू एक आपसमा मिल्दा जुल्दा छन् तर केही भिन्नताहरू पाइन्छन्:
- सर्दिः यसले नाक, मुख, आँखा, घाटीमा असर पर्दछ । त्यसैले सर्दि लागेमा नाकबाट ओशु आउने, टाउको दुख्ने, हाँधिउँ आउने, नाक, मुख रातो हुने, खोकी, यो माथि उल्लेखित विभिन्न कारणहरूले हुन्छ । फोक्सोमा अड्केको पदार्थ फोक्सोले बाहिर फ्याक्न खोज्दा खोकी लाग्छ । यो खकार, म्युकोस जुका जस्ता जे सुकै पदार्थले पनि हुन सक्छ ।
- धम्कीः यो रोगलाई दम वा ब्रोङ्काइटिसको रूपले पनि चिनिन्छ । यस रोगमा उकालोमा हिड्न नसक्ने, गर्मी सहन नसक्ने लक्षणहरू देखा पर्दछन् ।
- न्युमोनियाः यो खास फोक्सोको संक्रमण हो । माथि उल्लेखित कारणहरूले तातो, सुन्निनु, फुल्लु, दुख्नु भन्ने बुझाउँछ । न्युमोनिया माथि उल्लेखित रोग बिग्रै जाँदा विभिन्न जिवाणु तथा विषाणुको संक्रमण बढ्दा रातो, तातो, सुनिनु, फुल्लु, दुख्ने लक्षण देखा पर्दछन् । जसको कारणबाट सास फेर्न अप्ठ्यारो पर्ने, ज्वरो बढ्ने, श्वास प्रश्वास दर बढ्ने, सास फेर्दा छती वा कोखाहरू चल्ने, खोकि बढ्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन् ।

उपचार: यी रोगहरूको उपचार गर्दा यी रोगहरू के कारणले भएका हुन् भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ । त्यसैले कारणहरू पत्ता लगाई सके पछि मात्र उपचार गर्नु आवश्यक छ:

- चिसो वा गमीबाट बचाउनु पर्दछ ।
- खोकै देखा परेको भए खोकिका औषधिहरू Colion, Coughmint, Colfax, Coughdon Cofugo आदि प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- सामान्य रोग, सर्दि, ज्वरो भएमा ढुवाई कम गर्ने औषधि, ज्वरो कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्ने ।
- जुकाको कारणले भएमा जुकाको औषधिहरू Albendazole, Febendazole, Mebendazole, Panaur आदि औषधि प्रयोग गर्ने ।
- दम कम गर्न Adrenaline, Deniphylin, Aril जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्ने
- Bacteria तथा Virus को संक्रमणको कारणले भएमा तलका Antibiotics प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- Penicillin-२०-४० लाख युनिट, ५-७ दिनसम्म, I/M.
- स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन २.५ ग्राम, ३-५ दिनसम्म, I/M.
- एम्पीसिलिन, क्लोक्सासिलिन २.५ ग्राम, ३-५ दिनसम्म ।
- इनराक्लोक्सासिलिन 1 ml, प्रति 10 केजी शरीरको तौल ।
- सल्फाडिभिडिन वा सल्फा मेथेजिन १० - १५ मि.लि. प्रति ५ (केजी शारीरक तौल ।

हाडजाता प्रजननले सन्तान छिडन्छ र रोगी हुन्छ ।

नाता नपर्ने पशुमा प्रजनन गराउदा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

३७. प्रजननका लागि पालिने पशुको छनौट प्रक्रिया र प्रजनन तरीका

पशुको छनौट गर्दा केही सैद्धान्तिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले छनौटको विषयमा छनौट, छनौटको महत्त्व र छनौटको किसिम बारेमा चिन्नु ।

छनौट (Selection)

'Keep the best and cull the poorest' यस वाक्यले राम्रा राख्ने र हटाउने भन्ने अर्थ दिन्छ । यसरी पशुको समुहबाट राम्रा र उपयुक्त टाढा गर्ने र सन्तान उत्पादनको मौका दिने वा वंश वृद्धिको मौका नराप्ता गुण भएकालाई हटाउँदै जाने भन्ने बुझिन्छ ।


छनौट एउटा निरन्तर चलि रहने प्रक्रिया हो । यसमा चाहिने गुणका लागि छनौट र नराप्ता गुण भएकालाई हटाइन्छ । त्यसैले पशु विकासमा परिवर्तन देखा परिरहन्छ । यसले गर्दा कुन प्रकारको सन्तान उत्पादन गर्ने, पुर्व अड्कल गर्न सकिन्छ ।

छनौटका किसिम

प्राकृतिक छनौट: यो प्रकृतिबाटै आफ्नै आफ्नै छनौट हुने प्रक्रिया हो । भाला (माछा) नियम पनि भनिन्छ । बलियोले निर्धोलाई, मोटोले दुबलोलाई होचोलाई दबाइरहेको हुन्छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई र भालाडि बढ्छ । यसरी जुन प्रकृतिसंग संघर्ष गर्न सक्ने त्यो प्र छनौट नभइकन जान्छ र हराउँछ ।

कृत्रिम छनौट: आवश्यकतानुसारका गुणहरू राख्ने र आवश्यकता गुणहरू हटाउँदै जाने अथवा राम्रा गुण भएकालाई राख्ने र नराप्ता भएकालाई हटाउँदै जाने प्रकृया कृत्रिम छनौट हो । राम्रो उत्पादन पशुलाई मात्र हामी छनौट गर्छौं । हृषको लागि पालिने पशुमा दूध गुण राम्रो भएको, मासु उत्पादनको लागि पशु छनौट गर्दा हलक्क भन्ने मासु उत्पादन हुने जात छनौट गर्छौं । पाठापाठी बिक्री गर्नु पर्ने भन्ने पाठापाठी जन्म दिने जात राख्छौं । कृत्रिम छनौट र छनौट प्रक्रियाका आधारमा Culling & Selection दुबै शब्दले नेपाली अर्थ एउटै

तर Culling & Selection अलग-अलग प्रक्रिया हुन् । Culling ले वर्तमान विकृतिलाई बढी ध्यान दिन्छ । यसले छोटो समयमा देखिने विकृतिको आधारमा छनौट गर्छ । कुछुराको खोरमा आफ्नो अण्डा आफै खाने, फुल नपर्ने, अर्कोलाई टोक्ने, बंगुर फार्ममा थोरै बच्चा दिने, राम्ररी नबढ्ने आदिको आधारमा छनौट गरिन्छ । Selection निरन्तर चलि रहन्छ । कुनै एक आवश्यक गुणको लागि छनौट गर्दा वर्षौ लानन सक्छ । एउटै पुस्तामा खोजेको कुरा नपाउन सकिन्छ । दाना पानी कम खाने, दुध धेरै दिने गुणको विकास वा छनौट गर्दा धेरै वर्ष लाग्छ । त्यसमा सानो शरीर र धेरै दुध दिने गुण विकास गर्नु पर्छ । एउटा गुण विकास गरिसकेपछि मात्र त्यो सम्भव छ । तसर्थ त्यो वर्षौ लानन सक्छ ।



त्यस बहर लगाउदा एकै पटकमा गर्भधारण हुन्छ

छनौटका तरीकाहरू

आनुवंशिकी आधारमा: सन्तानहरूमा देखा परेका गुणको आधारमा आमा र सन्तानबीच छनौट गर्न सकिन्छ ।

उत्पादन क्षमताको आधारमा: छनौट गर्न थालेको पशुको दूध उत्पादन, उत्पादन, मासु उत्पादन, उन उत्पादन के कस्तो छ, त्यसको आधारमा छनौट गरिन्छ ।

पारिवारिक गुणको आधारमा: कुनै पनि पशु वातावरण, हावापानी, खानपाखा राम्रो देखिन सक्छ तर पनि नराम्रो हुन सक्छ । तसर्थ अन्य परिवाराबाट एक गुणलाई आधार मानी छनौट गरिन्छ ।

भौतिक गुणको आधारमा: मासुको लागि पालिने पशु, उन उत्पादनको लागि उत्पादनको लागि छनौट गर्नु पर्दा शरीरमा मासु नभएको, दुब्लो पातलो भएर ब्याउटे शरीर भएको भेडा, कर्बौडो नभएको, नशा नपुग्ने पशु मासु, उन र दुधको लागि छनौट गर्नु हुँदैन । हेर्दा राम्रो लाग्ने बढ्ने, ठूलो शरीर, ठूलो कर्बौडो आदि गुणहरू भएकालाई छनौट गरिन्छ ।

पुर्खाको गुणको आधारमा: जस्ता आमा बाबु त्यस्तै सन्तान भने सन्तानहरूमा आमा बाबुको गुण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परेको हुन्छ । कुम्रो भएको मानिसको सन्तान कुम्रो हुने सम्भावना बढि रहन्छ । तसर्थ पुर्खा देखिएका राम्रा नराम्रा गुणको आधारमा सन्तानको छनौट गरिन्छ ।

जातको छनौट: उपरोक्त छनौटका आधार सहित कुन उद्देश्यले पशु पालन छनौट गर्ने हो त्यही गुणको जातलाई छनौट गर्नु अनिवार्य हुन्छ । दूध गाईको छनौट गर्दा जोर्स, होलिस्टीन ब्राउन्सीस, दुध दिने बाखा छनौट गर्नुपर्छ, धेरै पाठापठिको छनौट गर्दा खसी बाखा, गोठ उत्पादन गर्न हरियर जातको गाईको जात गुण विशेषका हुन्छन् । आफ्नो आवश्यकता अनुसार छनौट गर्नु छनौटको एक प्रमुख उपाय हो ।

पशु प्रजनन


पशुको क्रमिक विकास गर्नको लागि आफूले चाहे अनुसारको जातसँग समानगम गराउनु नै पशु प्रजनन हो । पशु प्रजनन पनि प्राकृतिक र कृत्रिम प्रकारका हुन्छन् । प्राकृतिक तरीका प्राकृतिक रूपले भैराखेको तरीका हो जसले गर्दा प्राकृतिक जातका गुणहरूलाई आफ्नो गाई भैसीमा राख्ने तरिको हो ।

हो । प्रजनन गराउदा अन्तरजातिय र विजातिय हुन्छन् । यिनीहरू निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको छ ।

Inbreeding: यो प्रजनन तरीका उपयुक्त हुदैन । यसमा नराम्रा गुणहरू बढी देखिन्छन् । रोगी, रोगसँग लडन नसक्ने, दुब्लो, पातलो, छ्याउटे, बढ्दैन नसक्ने, उत्पादन दिन नसक्ने, कुरूप, राम्रा गुणका सट्टा नराम्रा गुण बढी देखा पर्दछन् । भेडा, बाख्रा, बंगुरले छिटो छिटो सन्तान उत्पादन गर्ने भएकोले यिनका सन्तानमा ती नराम्रा गुण देख्न सकिन्छ ।

Out Breeding: उपरोक्त प्रजनन नेपाली समाजमा स्वीकार्य छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त मानिएको छ । यसबाट राम्रा गुणहरूको विकास हुन्छ । यो तरीकाबाट चाहिँ अनुसारको जात विकास गर्न सकिन्छ । आवश्यकता अनुसारको गुणको प्रतिशत मिलाउन सकिन्छ । लोकल गाईलाई ६२.५% जसिमा विकास गर्नु परेमा निम्नानुसार क्रस गराउनु पर्दछ ।

पहिलो पटक जनिमने बच्चा	J=50%	शुद्ध स्थानिय गाई (L)(100%)	शुद्ध जसि (L)(100%)
दोश्रो क्रसमा	J=62.5%	L=50%	L=125%+J12.5%
अथवा	J=62.5%	L=37.5%	



बाउ घोडा र आमा गधाको बच्चा खच्चर हुन्छ

३द. प्रजननका लागि भाले जनावरको छनौटको महत्त्व, छनौट गर्ने तरीका तथा कृत्रिम गर्भाधान

- पशु जन्म पदार्थको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन पशुको नस्ल सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक हुन आउँछ । पशुको भौतिक विकास तथा उत्पादन क्षमतामा वंशाणुगत गुणहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ । आफूलाई चाहिँ अनुसारको गुण भएको पशु उत्पादन गर्न पशुमा वंशाणुगत अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सन्तानका आमा तथा बापा गुणगत गुणहरू बराबर मात्रामा रहने हुँदा नियन्त्रित प्रजनन व्यवस्था आवश्यक छ । पशुको नस्ल सुधार गर्न निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
- पशुको प्रजनन गराउदा भाले र पोथी बीच नाता रहेको छ वा छैन, नाता पर्छ भने आपसमा प्रजनन गराउनु हुँदैन ।
- प्रजनन गराउने पशु निरोगी छ वा छैन, यदि पशुमा सरल रोग (प्रसम्बन्धित बुलेल्जोसिस, भाइबोसिस) जस्ता रोग लागेको भएमा अन्य पशुसँग सम्भावना हुन्छ ।
- पशुको जातीय उत्पादन सम्बन्धित गुण कस्तो छ ? पशुको हालसम्म उत्पादन रेकर्ड राम्रो छ वा छैन ।
- वंशाणुगत रेकर्ड कस्तो छ ? भाले पशुको आमाको उत्पादन क्षमता थियो ? प्रजनन क्षमता कस्तो थियो ? रोग प्रतिरोधक क्षमता कस्तो थि आदि बारे जानकारी हुनु पर्दछ ।
- प्रजननको लागि छनौट गरिएको पशुको उमेर कस्तो छ ?
- हाल सम्मको प्रजनन दर कस्तो छ ?
- शारीरिक अवस्था कस्तो छ ?
- पशुको व्यावहारिक कस्तो छ र आदि कुराहरूको जानकारी हुनु पर्दछ ।

छनौटको महत्त्व: सन्तानमा बाबु तथा आमाबाट बराबर गुणहरू स्थानान्तरित हुने हुँदा राम्रो उत्पादन गुण भएको भाले पशु छनौट गर्नु आवश्यक हुने हुन्छ । जन्म जन्म पोथी पशु बाहिरबाट आयात गर्दा खर्चिलो बढी हुने र राम्रो, धेरै उत्पादन क्षमता भएको भाले पशु आयात गर्नु सरल पर्दछ । भाले पशुबाट धेरै पोथीहरूमा प्रजनन गराई नस्ल सुधार गर्न सकिन्छ । पशु थोरै भए पनि धेरै पोथी पशुमा प्रजनन गराउन सकिने हुँदा पशुको वंशाणुगत गुण थपेर पाउन सरल पर्दछ । छनौट गरेको पशुबाट प्रजनन गराउदा नाता पर्ने सम्भावना रहदैन भने रोग सँग सम्पर्क पनि कम हुन्छ । बयानमा रहेका अनुपादक भाले पशुहरूलाई बन्धन

गरी छनौट गरिएको पशुबाट मात्र प्रजनन गराएमा पशुजन्य पदार्थमा गर्नु गर्न सकिन्छ ।

छनौट गर्ने तरीका: प्रजननका लागि भालेपशु छनौट गर्दा निम्न गुण हुनु जरुरी हुन्छ ।

- प्रजनन गराउने पोथी पशुसित रगतको गाता नभएको ।
- प्रजनन सन्धस्थि कुनै किसिमको रोग नलागेको ।
- देखनमा चम्कीलो र फुत्तिलो ।
- प्रजनन क्षमता राम्रो भएको ।
- बिर्यमा शुक्रकिटको मात्रा पर्याप्त भएको र शुक्रकिटको गुणस्तर राम्रो भएको ।
- प्रजनन गराउने पशुको आमाको उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन क्षमता रहेको ।
- हालसम्म उत्पादन गरेको सन्तानहरूको उत्पादन गुण राम्रो भएको ।
- प्रजनन अङ्कहरू (अण्डकोष) को राम्रो विकास भएको ।
- अण्डकोष दुई वटै बराबर भएको ।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च भएको ।
- पशुको उमेर, जात अनुसार प्रजनन शुरु गर्ने हुनु पर्दछ । धेरै बुढो प्रजनन गराउदा राम्रो सन्तान उत्पादन हुन सक्दैन ।
- पशुको व्यवहार राम्रो, सोझो र आनापालन गर्ने हुनु पर्दछ ।
- उपरोक्त अनुसारको गुण भएको भाले पशु छनौट गरी प्रजनन पशुको नस्ल सुधार हुन गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

हाडनाता प्रजननले सन्तान छिदन्छ र रोगी हुन्छ ।
नाता नपर्ने पशुमा प्रजनन गराउदा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

गर्भाधान भनेको के हो ?

गरीएको भाले पशुबाट कृत्रिम तरीकाले विभिन्न उपकरणको प्रयोगबाट विर्य संकलन गरी, विशेष किसिमले संरक्षण गरी, पोथी पशुले गर्नुपर्ने अवस्थामा सो विर्यलाई पाठेघरमा पुर्‍याई गर्भाधारण गराउने प्रक्रियालाई कृत्रिम गर्भाधान भनिन्छ । हाल नेपालमा गाई तथा बैसीमा कृत्रिम गर्भाधानको विस्तार भएको पाइए तापनि बाख्रा तथा बंगुरमा पनि कृत्रिम गर्भाधान गरिन्छ ।

गर्भाधानका फाइदाहरू:

- भाले पशु पालिरहनु नपर्ने ।
- आह अनुसारको नस्लको पशु उत्पादन गर्न सकिने ।
- भाले पशु मरेर गए पनि उक्त पशुको जातीय गुण संरक्षण गर्न सकिने ।
- बर्ष कम हुने ।
- नाता प्रजननबाट जोगाउन सकिने ।
- प्रजनन रेकर्ड र जातीय रेकर्ड राख्न सजिलो हुने ।
- रोग गर्भाट बचाउन सकिने ।
- एक, पटकमा संकलन गरेको विर्यबाट धेरै पशुहरूमा गर्भाधान गर्न सकिने ।

गर्भाधानको उपयुक्त समय: साधारणतया गाई बैसीले भाले खोजेको १० देखि २४ घण्टा भित्र कृत्रिम गर्भाधान गर्न सकिन्छ तर १२ देखि १५ दिनको अवधिलाई उपयुक्त समय मानिन्छ । यदि विद्वान पशुले साढे खोजेकै पशुले भाले आफ्नै कृत्रिम गर्भाधान गर्ने । साँझ भाले खोजेको छ भने दोश्रो दि दिन कृत्रिम गर्भाधान गर्ने ।

गर्भाधानको लक्ष्य श्रुतकालमा पोथी वस्तुको लक्षणहरू:

- नस्यणहरू:
- एक वर्ष पशुमाथि चढ्ने ।
- गर्भगुहो सुत्तिने तथा तरल पदार्थ फाल्ने ।
- गोभीको भित्री भाग रातो तथा गुलाबी रङ्गको हुने ।
- गुह उत्पादनमा कमी आउने ।
- विनिधियमा पिसाव गर्ने ।

- आफूमाथि आर्को पशु उत्कर्षा तथा पिठमा हात राख्दा पुच्छर माथि गर्ने र उभिने ।
- पशु उत्तेजित हुने र जलाततै बगुर्ने ।

मलद्वार भित्रबाट छान्दा:

- गर्भासयको सिङ्ग फुलेको हुन्छ र हावा भरिए जस्तो लाग्दछ । तलतिर नरम हुन्छ ।
- गर्भासय छान्दा तरल पदार्थ फाल्दछ ।
- भ्रिवाको मुख खुलेको हुन्छ ।
- ग्राफियन फोलिकलको विकास भएको तथा फुटेको पाइन्छ ।

कृत्रिम गर्भाधान विधि

- साबुन पानीले हात सफा गरी सफा ग्लोब लगाई मलद्वारमा हात पसाई मलासयमा भएको गोबर फाल्ने ।
- मलद्वारबाट हात पसाएपछि सावधानी पूर्वक भ्रिवा समात्ने ।
- योनीद्वारमा भएको सेप तथा अन्य फोहोर पदार्थ सफा गर्ने ।
- विर्य नलीलाई लिक्वीड नाइट्रोजनबाट श्लिकी 35°C - 37°C को मनतातो पानीमा चोपी जमेको विर्यलाई पगाल्ने ।
- कृत्रिम गर्भाधान गनमा राखी बाहिर पोलीथिन सिपले ढाक्ने र मुखमा च्यापी सूर्यको किरणबाट बचाई कृत्रिम गर्भाधानका लागि तयार पार्ने
- कृत्रिम गर्भाधानलाई बाह्य फोहोर पदार्थसित लसपस नगरी योनीद्वारबाट विस्तारै सावधानी पूर्वक भ्रिवाको मुख खोली (भ्रिवाको रिङ्गहरू बाँझा टिझा भएकाले जबरजस्ती घुसाउनु हुदैन) पाठेघरको मुखमा पुर्‍याई विर्य खसाल्ने र विस्तारै गन बाहिर निकाल्ने ।
- कृत्रिम गर्भाधान गरेको पशुधनीको नाम, पशुको विवरण सम्बन्धि रेकर्ड र विर्य नलीमा अङ्कित भालेको संकेत नम्बर समेत जानकारीका लागि रेकर्ड राख्ने ।

यदि पशुले गर्भाधारण नगरेमा १८ - २१ दिनमा फेरि भाले खोज्न सक्दछ । उक्त अवधिमा नदोहोरिएमा ३ महिनामा गर्भ परिक्षण गरी गर्भ रहे नरहेको थाहा पाउन सकिन्छ ।

पशु वस्तुमा गर्भाधान गरे पछि नून तथा दानापानीमा कमी ल्याउने चलन छ तर यो राम्रो चलन होइन । गर्भावस्थामा यस्ता पौष्टिक आहाराको आवश्यकता पर्ने हुँदा दानापानी अझ बढी खुवाउनु राम्रो हुन्छ ।

कृत्रिम गर्भाधान गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- गर्भासय भ्रिवा घुमाउरो मांशपेशाहरू मिलेर बनेको हुन्छ । त्यसैले गर्भासय गर्ने नलीलाई त्यस भित्र जबरजस्ती छिप्याउनु हुदैन, त्यसो गर्दा भ्रिवामा हुन सक्छ ।
- विर्यलाई गर्भासयको सिङ्गसम्म जम्मा गर्नु हुदैन । यसो गर्दा गर्भासयमा घाउ लाग्न सक्छ र शुक्रकिटहरू दुबै डिम्बवाहिनी नलीतर्फ पाउँदैन ।
- कृत्रिम गर्भाधान गर्न अगावै यसको लागि प्रयोग हुने उपकरणहरू निर्मलीकरण गर्ने तथा हात सफा गर्ने कार्य गरिहाल्नु पर्दछ ।
- प्रजनन सम्बन्धि रोग लागेको पशुमा प्रयोग भएको उपकरणहरू निर्मलीकरण नगरी प्रयोग गर्नु हुदैन ।
- पशुमा प्रजनन सम्बन्धि रोग लागेको भए उक्त रोगको उपचार पछि कृत्रिम गर्भाधान गर्नु पर्दछ ।

कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रव
प्रकाशित हुने कृषि सामाग्री
पढ्ने गरौं ।

४०. पशु ऋतु चक्र (बाला)मा आएको थाहा पाउने, गर्भाधारण समय

पशुहरू समयमा ऋतुचक्र (Heat) मा आउनु पर्छ । समयमा ऋतु चक्र वा बातामा आएन भने कृषकलाई आर्थिक रूपमा नोक्सान हुदै जान्छ । त्यसैले पशु Heat मा (गाई, भैसी) ब्याएको ६० - ९० दिन भित्र आउनु पर्छ । एकचोटि Heat मा आएपछि १८-२१ दिनमा पुनः Heat मा आउनु पर्छ । रागो, साँढे नलागेमा पहिलो बँतका गाई, भैसी भए जर्सी, ब्राउन स्वीस, होष्टियन फ्रिजियन जातका गाईहरू १४-२२ महिनामा साँढे खोज्छन् । राम्रो स्याहार पाएको छ भने भैसीले ३६-४२ महिनामा रागो खोज्छ । त्यस्तै अन्य पशुहरूमा: घोडा २४-३६ महिना, भेडा बाखा १२-१८ महिना, बंगुर ८-९ महिना, कुकुर बिरालो १२-१८ महिना ।

रागो/साँढे (भाले पशु) को वयस्कताको उमेर:

- रागोको उमेर: २४ - ३० महिना
- साँढेको (उन्नत): १२ महिना
- साँढेको लोकल: २४ - ३० महिना
- शुभा/बोका: ७ - ८ महिना
- बंगुर: ५ - ७ महिना
- कुकुर: ७ - १० महिना

गाई भैसी Heat मा आएमा निम्न अवस्था देखिन्छन्:

- छटपटाउनु
- कराउनु,
- खाना राम्रो सँग नखाउनु,
- पटक पटक पिसाब गर्नु,
- पातलो सेप फाल्नु,
- Vulva मा सुनिनु र रातो देखिनु,
- उत्तेजित हुनु,
- अर्को पशुमाथि चढ्नु र
- अरु पशु आफूमाथि चढ्दा पनि उभिरहनु ।

ऋतु चक्रमा पुनः आउने अवधि:

- गाई भैसी १८ - २१ दिन
- भेडीमा १४ - २० दिन
- बाखामा १५ - २० दिन
- बंगुर १८ - २४ दिन
- घोडा १९ - २३ दिन

- कुकुर वर्षमा २ पटक (८ - ९ दिन Heat मा रहने)

यसरी माथि भनिए है लक्षणहरू समयमा नदेखाएमा पशु ऋतु चक्रमा आएको भनिन्छ । पशु ऋतु चक्रमा नआउनाको विभिन्न कारणहरू छन् । राम्ररी जाँच गरी पशुलाई के कारणबाट ऋतु चक्रमा नआएको पत्ता लगाई औषधि उपचार पढि लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

पशुहरू ऋतु चक्रमा नआउनाका कारणहरू:

- पीष्टिक आहाराको कमी भएमा वा कुपोषणको कारण ।
- पाठेघर सम्बन्धि विभिन्न रोगहरू भएमा ।
- सिष्टिक ओभरी भएमा ।
- समय नपुगी भरेको बच्चा जन्माएमा ।
- फोलेकल बढेमा ।
- पायोमेट्रा रोग लागेमा ।
- उमेर पुगी बुढी भएमा ।
- मौसमको असर परेमा । र
- हर्मोनको गडबडी भएमा ।

उपचार: पौष्टिक तत्वहरूको कमीको कारण भए भिटामिन, मिक्सचरहरू र सन्तुलित आहारा दिने गर्नु पर्छ । जस्तै:

- Tab. Nutrisac 30 tab, १ र १ tab दिनमा २ पटक १५ दिनसम्म खुब
- Medimix Forte- 1 Kg, 50g दिनमा १ पटक २० दिनसम्म ।
- Milkmin, Kalviaminofort, Aynamin 50g दिनमा १ पटक २० दिनसम्म
- ई. प्रिपलिन फोर्ट 6 ml एक दिन बिराएर ५ - ७ दिन सम्म ।
- ई. Jonophos 10 ml एक दिन बिराएर ५ - ७ दिन सम्म ।
- गाई १ - २ माना गहुँलाई २ दिन पानीमा भिजाएर टुसा आएको, सम्म लगातार खुवाउने ।
- Gasbaforte 40 tab, 2 tab दिनमा २ पटक १० दिनसम्म दिने ।
- Cap. Parjana 12 cap-3/3 Cap, 2 days र ११ र १२ दिनमा 3/3 Cap.
- Cap. Janova 12 cap
- Tab Cofficu 40 tab, 2 tab प्रति दिन ।
- Povidon wash

कृत्रिम गर्भाधान: पशु Heat मा आएको १२ देखि १८ घण्टाको बीचमा गर्भाधानको लागि उपयुक्त हुन्छ । सो भन्दा अगाडि वा पछाडि गर्भाधान गर्दा गर्भाधान हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । कृत्रिम गराए पछि ३ महिना (९० दिन) पछि गर्भाधान भए नभएको जाँच गर्नु पर्छ ।

वात आएको लक्षण तथा बाली लगाउने समय

गाई र भैसी पालन व्यवसाय नेपाली किसानहरूको आयआर्जनको प्रमुख श्रोत मध्ये एक हो । पशुहरू समयमा बाली नगाएमा ठूलो नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ किसानहरूलाई गाई / भैसीले बहर / रांगो खोजेको थाहा हुनु जरुरी छ ।

बहर खोज्दा गाईले देखाउने लक्षणहरू:

- बार बार कराउने र केही चिजको खोजी गरे जस्तो अनुभव हुने
- नखाने, हान्न खोज्ने र अरु जनावर माथि चढ्ने, अरु जनावरले चढ्ने र चढेको सहने साथै दुध नदिने हुन्छ ।
- सुतबाट सिंगान जस्तो पदार्थ (कसर) निकाल्ने ।
- कुनै कुनै पशुहरूले लक्षणहरू नदेखाउने हुन्छन् । यो अवस्थालाई लुकेको वात र अंग्रेजीमा Silent Heat (साइलेण्ट हीट) भनिन्छ ।

रांगो खोज्दा भैसीले देखाउने लक्षणहरू— भैसीले रांगो खोज्दा देखाउने लक्षणहरू केही भिन्न हुन्छन्:

- रांगो खोज्दा भैसी कराउँछ र ढाडमा धाप मार्दा शरीर बांगो बनाइ नचलिकन बस्छ ।
- नखाने, हान्न खोज्ने अरु जनावरमाथि चढ्ने साथै दुध नदिने भिन्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिन्छन् ।
- कसर कम फ्याक्ने र कुनै कुनैले त नफ्याक्ने पनि हुन्छ ।
- साइलेण्ट हीट गाईमा भन्दा भैसीमा ज्यादा देखिन्छ ।

४१. बाली लगाउने उपयुक्त समय

साधारणतः कुनै पनि पशुलाई भाले खोज्ने बित्तिकै लगाउनु हुदैन भैसीलाई खोजेको १० घण्टा देखि १८ घण्टासम्म बहर वा रांगो लगाउनु । यसरी लगाउंदा जहिले पनि भैसीलाई हिंडाएर रांगो नजिक लैजानु रांगोलाई थकाउनु हुदैन ।

जनावरहरूमा प्रजनन गराउने उमेर, मासिक धर्मचक्र र समय:

विवरण	गाई	भैसी	भेडा	बाख्रा	घोडा	बगुर
पहिलो पटक प्रजनन योग्य उमेर (महिना)	१० - २०	३६ - ४२	८ - १२	१०	२४	५ - ९
मासिक धर्मचक्र दिन	१८	२१ - २०	२४	१६	१७ - १९	२५
बाली गराउने समय घण्टा	१० - २४	१० - २४	१ - २	२	११	३ - ४
गर्भाधारण (दिन)	२७८ - २९०	३०५ - ३३२	१४८	१४८ - ३२९	३४६	१११ - ११६

उल्लेखित उमेर तथा समय माथि जनावरको जात, पौष्टिक तत्व, स्थिति र स्थानीय हावापानीको पनि केही प्रभाव पर्न सक्छ ।

४२. पशुमा बांभोपनको कारण तथा उपचार

बांभोपन भन्नाले पशुहरूले सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था अथवा सन्तान उत्पादन गर्ने शक्ति पूर्ण रूपले नास हुनुलाई बांभोपन भनिन्छ । यो भाले पोथी दुबै पशुमा हुन्छ । पोथीमा बांभोपन भएमा गर्भ रहन सक्तैन भने भालेको विर्यमा पनि गर्भाधान शक्ति रहदैन । स्थायी र अस्थायी दुवै बांभोपनले गर्दा कृषकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भै रहेको छ । धेरै कारणहरू मिलेर बांभोपन हुन्छ । जसलाई मोटामोटी दुई भागमा बाँडिएको छ ।

बांभोपनका कारणहरू:

- शरीर रचनामा खराबी
- प्रजनन अंगमा रोग: कुहिने, पाठेघरको टि.वि., योनी सुनिने, डिम्बनली सुनिने ।
- प्रजनन नलीमा चोटपटक ।
- गर्भनमा गडबडी: डिम्बासयको काममा बाधा, लगातार साँढे खोज्नु, स्थायी कर्पस ल्युटियम हुनु, साँढे खोजेका लक्षण प्रकट नगर्नु ।
- वंशानुगत कारण ।
- कुपोषण: प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिप्लो पदार्थ, ब्यालिसयम (खनिजहरू) भिटामिन ए, डि. र ई, फस्फोरस, म्याग्नेशियम आदि ।
- दुषित वातावरण ।
- लालन पालनमा कमजोरी ।
- थाहा नभएका अरु कारणहरू ।

जन्मेजात हुन सक्ने बांभोपनका कारण:

- अविकसित डिम्बासय
- अविकसित योनी
- अविकसित गर्भासय
- पाठेघरको मुख बन्द हुनु ।
- भाले पोथी जुम्याहा जन्मेमा अक्सर पोथी चाहि बांभो हुन्छ ।

जन्मेपछि हुन सक्ने बांभोपनका कारण:

- भाले पोथीको प्रजनन अंग काम नलाग्ने गरी चोट लाग्नु ।
- भाले लाग्न नसक्ने अवस्थामा हुनु ।
- पोथीको योनी मार्गमा ठूलो खटिरा हुनु ।

भाले (साँढे वा रांगो) मा हुने बांभोपनका कारणहरू

शरीर सम्बन्धी कारण र समाधान:

- अविकसित (सानो) प्रजनन अंग हुनु: विकसित अपड भएको साँढे प्रयोग
- लिंगको खराब बर्गीकरण: लिंग खराब भएको साँढे प्रयोग नगर्ने ।
- भाले पोथी छुट्याउन नसक्ने अवस्थाको हुनु: प्रजननको लागि प्रयोग न

विर्यको गुण सम्बन्धी बांभोपन:

- पातलो र निम्न स्तरको गर्भाधान गर्न नसक्ने विर्य हुनु ।
- टेस्टेटोरोन नाम गरेको भाले रसको कमी हुनु ।

रोगको कारणले हुने बांभोपन:

- बुसेलोसिस ।
- भिब्रियोसिस ।
- ट्राइकोमोनयसिस आदि रोग भएमा गर्भ त्रुहिन्छ ।

अपडकोषमा गडबडी भएर बांभोपन हुनु:

- अपडकोष सुनिनु ।
- अपडकोष कै इन्फेडिमस सुनिनु आदि ।

बांभोपनका लक्षणहरू

पाण्डको व्यवहारको इतिहास सोधेर र पशुलाई जाँचेर थाहा पाउन सकिन्छ

- पहिलो बेत व्याउटा भण्डार फर्किने वा अरु समस्या भएको ।
- साल भर्ने समस्या भएको वा
- साल ढिलो भरेको
- त्रुहिएको ।
- बेला कुवेला साँढे खोज्ने ।

सुतबाट चिप्लो र सिंगान जस्तो पदार्थ निस्किरहने ।

पाण्डको शरीर जाँच गर्दा देख्न सकिने बांभोपनका लक्षणहरू:

- सुत सुनिएको र रातो देखिने ।
- योनिमार्गमा भिन्न ठूलो खटिरा वा फोका देखिने ।
- योनिमा एसिडिफि बढेर शुक्राण्डि मर्ने ।
- कुपोषणले डिम्बासय सानै रहेको, विकास नभएको ।
- पाठेघर तनिकने, खुबिचने क्षमताको नभएर मासु छुट्टी भएको ।
- पाठेघरको मुख सुनिएर ठूलो भएको ।
- पाठेघर पुरै पिप्ले भरिएर सुनिएको ।

- डिम्बासयले काम गर्न नसकेर चिल्लो रहेको ।
- डिम्बासयको वरिपरि फोकैफोका भै रहेको ।
- डिम्बासयको फोका फुटेर सधैं छाल्टो भैरहेको स्थिति भेटिएमा, आदि ।

बाँभोपनको उपचार

- बाँभोपन एक वा धेरै कारणहरूको संयुक्त आक्रमणबाट हुन्छ । त्यसैले लक्षण र कारण अनुसारको उपचार गर्नु पर्दछ । जस्तै:
- पोषणको कमीले बाँभोपन भए पोषणयुक्त सन्तुलित खाना खान दिने ।
- बाँभोपन रोगका कारणले रहेछ भने रोगको उपचार गर्ने ।
- साढेको कमजोरीले बाँभोपन भएको भए स्वस्थ साढे लगाउने ।
- पाठेघरमा पिप भरिएको रहेछ भने पाठेघर सफा गरी एण्टीबायोटिक सुई वा वोल्स पाठेघरमा राख्ने ।
- पशु चिकित्सकको सल्लाह लिने ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, पशु सेवा केन्द्र, पशु सेवा उपकेन्द्रमा गर्दै आफ्ना पशुपालन सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस् ।

८ सुत्केरी माउ तथा बच्चाको स्याहार सम्भार तथा विगौती दूधको महत्व

सुत्केरी बच्चाको स्याहार सम्भार

जनावरलाई गर्भिणी अवस्थादेखि नै राम्रो ख्याल राख्नु पर्छ । साधा-
गार्दको गर्भिणी रहने समय २८० दिन हुन्छ । भैसीको ३१० दिन र
१५० दिन हुन्छ । यसरी गर्भिणी माउको स्याहार सम्भार गर्दा
कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्छ:

- जनावर सुत्केरी हुनु भन्दा २ महिना अगाडि देखि नै गार्द भैसीका अ-
निकै ध्यान दिनु पर्छ । राम्रो पौष्टिक आहारा र सम्भव भएमा कय-
युक्त आहारा दिनु पर्छ । क्याल्सीयमको कमी भयो भने सुत्केरी अ-
निक फिचर हुन सक्छ ।
- सुत्केरी हुनु भन्दा १/२ हप्ता अगाडिदेखि हल्का, सजिलै पच्ने
आहारा दिने ।
- गर्भिणी जनावरलाई हिडडुल गराएर हल्का व्यायाममा राख्ने ।
- यस अवस्थामा कल्चौडा बढेको हुन्छ, रातो देखिन्छ, हल्का माक्सि-
गुनु भन्नु पर्छ, यसबाट सुत्केरी व्यायाम गुरु भएको जानकारी हुन्छ ।
- जब जनावरको सुत्केरी हुने समय आउदछ तब जनावरलाई राम्रो,
स्वच्छ हाउमा राख्नु पर्छ ।
- व्याउने समयमा जनावर निकै बस्ने उठ्ने गर्छ, साथै पेटमा हेर्ने गर्छ,
झुनुभन्नु पर्छ, यसबाट सुत्केरी व्यायाम गुरु भएको जानकारी हुन्छ ।
- पानी पोको आएको देखिन्छ । यदि बच्चा ठीक अवस्थामा छ र माउ-
राम्रो स्वास्थ्य छ भने ३-४ घण्टाभित्र बच्चा दिन्छ । यदि सो सम्-
बच्चा द्धरेन भने दक्ष प्राविधिकलाई बोलाएर बच्चा निकाल्नु पर्छ ।
- बच्चा जन्मेको ४-६ घण्टाभित्र अम्लो दानु पर्छ । बच्चा जन्मेपछि
शुन राम्रोसँग चलाउने र दुध दुहुने ।
- हरियो घास र १-२ कि.ग्राम दिने यस अवस्थामा तातो पानी दि-
के.बी. गुड तातो पानीमा राखेर दिने ।
- १ हप्ता पछि मात्र पोषिलो आहार दिने ।
- कुनै जनावरमा शुनेलो रोग पनि देखिन्छ र बोरीक एन्ड पाउड-
पानीमा राखेर सेक्ने ।



सुत्केरी भैसीको स्थाहार सुत्तार



भरखर ब्याएको भैसी दुहनु भन्दा पहिले सुत्त र कर्चाढो राखरी सफा गर्ने

पाडा-बाच्छाको हेरचाह:

- भरखर जन्मेको बच्चालाई माउले राम्रोसँग चाट्छ र सफा गर्छ तर कुनै माउले यसो नगर्न पनि सक्छ । यस अवस्थामा राम्रोसँग पुख्रपाछ गरी सफा राख्नु पर्छ ।
- बच्चाले माउको गर्भमा सास फेर्दैन । आमाको रगतबाट अक्सिजन प्राप्त गर्छ । बच्चा संसारमा खसेको पहिलो पटक सास फेर्न नपाई मिसासिएर मर्न सक्छ ।
- बच्चाको नाभी एक इन्च छोटी धागोले बाधेर पानीमा उमालेको चक्कु वा पतिले काट्नु पर्छ । काटेको ठाउँमा T. Iodine वा Dettol लगाइ दिनु पर्छ ।
- बच्चा जन्मेको १० - १५ मिनेटमा उठ्ने, हिड्ने कोसिस गर्छ र आधा घण्टा पछि दूध चुस्न थाल्छ ।
- पहिलो दिनको बिगौती दूधको निकै ठूलो महत्त्व भएको हुँदा बाच्छा बाच्छी जन्मने बित्तिकै यसलाई उपयोग गर्नु पर्छ । बच्चालाई जति सक्थो चाडो यो दूध दिनु पर्छ । जन्मेको ६ घण्टा पछि यसमा भएको शक्ति कम हुन्छ ।
- बिगौती दूध खान नपाएका बच्चा प्रायः बिरामी हुन्छन् ।

पाठा-पाठीको हेरचाह: भेडा बाखाका पाठा पाठीको हेरचाह पनि न बाच्छीको जस्तै हो । तर पिगीहरूले दुईवटा वा बढी पाठा पाठी एकै जन्माउने भएकोले दुबै वा सबैले दूध खायो, खाएन हेर्नु पर्छ । कुनै क भन्ने त्यसलाई सहयोग गर्नु पर्छ । भरखर जन्मेका पाठा पाठीलाई ३-४ घण्टा अर बाखाले किचन, भिचन सक्ने हुँदा केही दिन अन्यत्र राख्नु पर्छ ।

भारको बच्चाको हेरचाह: अर हेरचाह बाच्छा बाच्छी जस्तै हो तर साह्रै मोटो भएको हुँदा आफ्नै बच्चालाई किचेको पनि थाहा पर्दैन भन्ने भन्ने भएको हुँदा आफ्नै बच्चा जन्मने भएको हुँदा सबैले दूध पाए नपाएको बिचार पुर्‍याउनु पर्छ । बंगुरको दूधमा फलामको मागा हुने हुँदा रात कम हुन्छ । फलामको सुई Inj. Infector दिनु पर्छ ।

बिगौती दूध: पहिलो दिनको (बच्चा जन्मेको) दुधलाई बिगौती दूध भनि यसको निकै ठूलो महत्त्व छ । यसमा प्रतिरोधात्मक तत्व (Imunoglobulin) भिहित हुन्छ र बाच्छा बाच्छी जन्मने बित्तिकै यसलाई उपयोग गर्न सक्छ यो बिगौती दूधमा प्रोटिन, भिटामिन ए, डि, कोर्वाहाइड्रेट आइरन र Lb पनि हुन्छ । यसैले यो ज्यादै पोषिलो र शक्तिवर्द्धक हुन्छ ।

- बच्चालाई संसारमा अप्पछि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता (प्रतिरोध शक्ति) बिगौती दूधले दिन्छ ।
- भरखर जन्मेका बच्चाको पेटमा भएको "कई" सफा गर्ने पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।
- बिगौती दूध राम्रोसँग खान नपाएका बच्चा प्रायः रोगी हुन्छन् ।
- पशुपालक कृषकले के बिर्सन हुँदैन भने पहिलो दिनको बिगौती, बाच्छाको लागि प्रकृतिले दिएको सुरक्षा हो र यसमा सबैभन्दा बढी अ ठगीहरूकै हुन्छ ।

४४. शुनेलो रोगको कारण, उपचार तथा रोकथामका उपायहरू

कर्लौडा सुनिनु वा यसबाट निस्कने दूधको गुणमा फरक पर्ने रोगलाई शुनेलो भनिन्छ । यो रोग गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, घोडा आदि सबै जसो जनावरलाई हुन सक्छ । तर दुधालु गाई वा भैसीलाई यो रोग बढी लाग्छ । शुनेलो भए पछि दूध बिधिने (थेपा) र दूधमा रात वा पिप भिसिएर आउँछ । शुनेलो रोग धेरै किसिमका जिवाणुले हुन्छ । यदि राम्रो सरसफा भएको छैन भने जनावर ब्याएको समयमा विभिन्न किसिमका जिवाणुहरू कर्लौडाबाट भित्र प्रवेश गर्दछन् । यो रोग लागिने पछि शुनमा रासायनिक, शारीरिक र जैविक परिवर्तन आउँदछन् । रोग लागिने पछि आर्थिक दृष्टिकोणले निकै घाटा हुन्छ र करीब २५% जति उत्पादन घट्छ । शुनेली लागेको जनावरमा एक चौथाई, आधा भाग वा पुरै भाग बिधिने हुन जान्छ । साथै मानिसकोलागि यस्तो रोग लागेको जनावरको दूध हानिकारक हुन्छ । यस्तो दूधको सेवनबाट विभिन्न किसिमका जिवाणुहरू शरीरमा प्रवेश गरेर अनेक रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

लक्षण:

- कर्लौडा सुनिनु, दुह्न तातो हुनु ।
- दूध नदिनु र साह्रो हुनु ।
- दूधको गुणमा फरक पर्नु ।
- दूधमा रात भिसिएको रातो वा जमेको टुक्राहरू (लेया) देखिन्छन् ।
- भित्र पाकेको भए पिप आउँछ । शुन माथै सुनिएको भए शुनमा दुध राप्न हुन्छ । शुन सुनिएकोले दूध हुनु गाह्रो हुन्छ ।
- अति तीब्र रूपमा भएमा ज्वरो आउँछ । बोकिने, खाना नखाने हुन्छ ।
- समयमा उपचार नभए त्यो शुन बन्द भै शुनबाट दूध नआउनेसम्म हुन सक्छ ।

रोग निदान: रोगको लक्षण र दूधको जीव गरेर २ तरीकाले यस रोगको निदान गर्न सकिन्छ ।


लक्षणको आधारमा:

- अलिकति दूध हातमा सिधै शुनबाट दुहेर हेर्दा पातलो पानी जस्तो थिपा (Clot) जमेको पिप वा रात भिसिएको देखिन्छ ।
- प्रयोगशालामा परिक्षण (C.M.T. Test) गर्न सकिन्छ । यस टेस्टमा मस्टाइटिस (शुनेलो) सोलुशन (जिलो रङ्ग) केही थोपा र दूधका केही थोपा मिलाएर हेर्नु पर्दछ । यदि त्यसको भौतिक अवस्थामा परिवर्तन आयो भने शुनेलो रोग हुन सक्छ । त्यो मिश्रण पिप जस्तो बाक्लो भएर जान्छ ।

परिक्षणको आधारमा:

- शुनेलो भएको तर दूध राम्रो भएको अवस्था ।
- शुनेलो भएको र दूध बिथेको अवस्था ।

उपचार: शुनेलोको उपचार "शुनेलो भएको तर दूध राम्रो भएको अवस्था" तथा शुनेलो भएको र दूध बिथेको अवस्था" गरी यी दुई आधारमा गरिन्छ ।



- शुनेलो भएको तर दूध राम्रो भएको अवस्था:
- दूध बेलबेलामा हुनु पर्दछ ताकि कर्लौडामा पर्ने दवाब कम होस् ।
- यदि शुनबाट दूध आउँदैन भने शुनभित्र किटाणु रहित पारेको शुनभित्र नली (Teat Canula) शुनमा घुसाउनाले दूध बाहिर आउँछ ।
- सबै दूध निस्केपछि (Teat Canula) बाहिर निकाल्नु पर्छ ।
- कर्लौडा र शुनलाई राम्रोसँग सेक्ने ।
- यदि घाउ पाकेको छ भने Masiilip मलहम लगाउने वा प्यासलिन वा लगाउने गर्नु पर्दछ ।

शुनेलो भएको र दूध बिथेको अवस्था:

- कहिले कहिले दूध पानी जस्तो वा पिप अथवा रात भिसिएको जरुर सक्छ । यस प्रकारको शुनेलो जिवाणुको कारणबाट हुन्छ ।
- कर्लौडाबाट धेरैपटक सबै दूध निकाल्ने ।
- दूध नआएमा टिट क्यानुला प्रयोग गर्ने ।
- पशुलाई एन्टीबायोटिक्स सुई दिने (भासु र शुनमा) । सबै दूध निखारे औषधि शुनमा राख्ने ।
- नसुनिने, नदुह्ने सुई दिने र मलहम लगाउने ।
- माउलाई प्रयास दाना पानी दिने ।

शुन पने कुराहरू:

- दुहुनु भन्दा पहिले कर्लौडा सफा गर्ने ।
- हात सफा गर्ने ।
- औषधि प्रयोग गर्दा राम्रोसँग प्रयोग गर्ने ।
- शुनेलो रोग लागेको जनावरलाई वन्तमा दुहुनु पर्दछ ।

४५. दुधालु पशुहरूमा लाग्ने मिल्क फिवर तथा किटोसिस रोग

मिल्क फिवर (Milk Fever)/शिताङ्कः यो ब्याउनु भन्दा केहि दिन अगाडि वा भर्खर ब्याएपछि दूध दिने गाई, भैसी, भेडा, बाखामा हुने क्याल्सीयमको कमीले आउने समस्या हो । यो दूध उत्पादन हुन शुरु भएको अवस्थामा सम्बन्धित हुन्छ । जब दूध बन्नका लागि प्रशस्त मात्रामा क्याल्सीयमको आवश्यकता पर्दछ, यसले गर्दा रगतमा साधारण भन्दा कम क्याल्सीयमको मात्रा हुन जान्छ र मांशपेशीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न क्याल्सीयमको आवश्यकता पर्दछ ।

लक्षणहरू:

- पशु शुरुमा उत्तेजित हुने र छटपटाउने हुन्छ ।
- एक दिनपछि सिधिल हुन्छ र तापक्रम 99°F हुन्छ ।
- मांशपेशी कमजोर हुनाले पशु ढल्छ र उठ्न सक्दैन ।
- खुट्टाहरू र शरीरको अन्य भाग चिसो हुन्छ ।
- सास फेर्ने गानो हुन्छ, नाक सुख्खा हुन्छ, सास फेर्दा धार-धारको आवाज निस्कन्छ र घाटी पछाडि फर्केको हुन्छ ।
- पशुलाई प्रायः कब्जियत हुन्छ ।
- पेट फुलेको हुन्छ ।

उपचार:

- नशाबाट Miltex र Calbora नामक क्याल्सीयम सुई दिने ।
- सिकिस्त नभएको अवस्थामा मुखबाट Calupugl १ ट्युब क्याल्सीयम दिने ।
- सावधानी: क्याल्सीयम दिदा एकदमै विस्तारै घोषा घोषा गरेर करिन्मा १ घण्टा लगाएर १ बोटल क्याल्सीयम दिने ।



शिताङ्क भएकी पशु

(क्याभमः गर्भावस्थाको अन्तिम समयतिर क्याल्सीयमको मात्रा प्रशस्त भएमात्रा दिने, ब्याउनु भन्दा ठीक अगाडि र पछाडि Calupugl औषधि दिने

किटोसिस (Ketosis): यसलाई ब्याएपछि हुने रोग (एसिटानेमिया) भनिन्छ । यो प्रायः गरी ब्याएको केही दिन पछि केही हप्ता भित्रको अवधिमा भनिन्छ । जब पशुले धेरै अरु कारण (शुनिता, मेन्स्ट्रुइटिस, साल अड्ड, तापले गर्दा खान छोड्छ त्यस पछि रगतमा हुने चिनी (Glucose) को मर्यादा छ । धेरै दूध दिने गाईहरूमा यतिबेला शरीरमा बोसो (Fat) भण्डार भएपछि र जब रगतमा सक्करको मात्रा घट्न जान्छ तब त्यो भण्डार गरिएर भालो गल्न थाल्छ । कलेजोले यो बोसोबाट किटोन पदार्थ (Keton Bodies) बनाउन थाल्छ । यसको उत्पादन नियन्त्रण गर्न सिकिने भन्दा बढी भान्छ । यी किटोनहरू अम्लीय गुणका हुन्छन् र शरीरमा विभिन्न किसिमका गन्ध देखा पर्छन् ।

लक्षणहरू:

- खान छोड्ने र कब्जियत हुने ।
- दूध उत्पादन घट्ने र तौल घट्ने हुन्छ ।
- अनौखो व्यवहार गर्ने, उत्तेजित हुने (रेबिब भए जस्तो गरी झन्टिने र टो खोल्ने) वा धेरै नै झन्टिने हुन्छ ।
- लरखराउने, उठ्न नसक्ने हुन्छ ।
- कानो र डराए जस्तो हुन्छ ।
- जनावरले खानामा अभियोगिता देखाउँछ, जस्तैः पुराल खाने तर दाना, कुँ नखाने आदि ।
- दूध, पिसाब र श्वासमा एक किसिमको गन्ध आउँछ ।

निदानः दूध वा पिसाब जाँच गरेर ।

उपचारः

- २५% वा ५०% Dextrose Saline दिने (जस्तैः Rimose) १ लिटर नशामा दिने
- इन्जेक्सन डेक्सोना ४ एम.एल. दिने ।
- सख्खर/गुह भत्ती र पिनेको मकैको डल्लो खुवाउने ।
- नवीसिनिन २०० एम.एल. पानीमा राखेर २ दिनसम्म दिने ।

४६. पशुहरूमा असामान्य ब्याउने (डिस्टोकिया) अवस्था फारण तथा उपचार

सामान्य जनावर ब्याउने व्याधा लागेको २-४ घण्टा भित्र सक्नु पर्छ । चित्रम देखाएरै गर्भावस्थामा ठिकसंग बसेको बच्चा कुनै समस्याबिना जन्मन्छ ।



गर्भावस्थामा ठिकसंगले बसेको

यदि कुनै कारणले समय भित्रै ब्याउने सकेन भने बच्चा अडकिन सक्छ । त्यसरी बच्चा अडकिएको अवस्थालाई डिस्टोकिया भनिन्छ ।


ब्याउने नसक्नु अथवा डिस्टोकियाका कारणहरू निम्न हुन सक्छन्:

- बच्चाको स्वाभाविक अवस्था नहुनु: पेट भित्र रहेको बच्चाको टाउको र अगाडिको खुट्टा पहिले निस्कनु पर्छ । सो संगसँगै श्रुतनो निस्कनु पर्छ । यस्तो अवस्था नभई निम्न अवस्था पनि हुन सक्छन् ।
 - बच्चा उल्टो फर्किएको ।
 - टाउको माथि वा तलतिर बटारिएको ।
 - एउटा वा दुवै खुट्टा पछाडितिर बटारिएको ।
- माउको कारण: माउ बूढो, कलिलो भएमा, योनी मार्ग सानो भएमा आदि कारणले पनि पशु राम्ररी ब्याउने सक्दैन ।
- दुर्घटनाको कारण: माउ भीडबाट लडेमा, प्रजनन अङ्गका हड्डीहरू भर्त्तिआमा, पल्टिदा पाठेघर बाहिरिएमा, बच्चा पेटमा मर्न गएमा पनि ब्याउने सक्दैन ।
- व्यवस्थापन: राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा बच्चा मर्न सक्ने, लामो समयसम्म पशुलाई बंधुवा गरी राखेमा, आवश्यकता भन्दा बढी दाना पानी दिएमा, अर्ध्यारो गोठ भएमा, निश्चित समयमा भाले नदिएमा यी समस्याहरू देखा पर्छन् ।

डिस्टोकियाको उपचार प्रक्रिया:

- पशु ब्याउने थालेको हो वा होइन निश्चित गर्ने ।
- ब्याउने थालेको हो भने योनी वरिपरि लागेको फोहर सफा गर्ने ।
- आफ्नो हात डिटोल पानी वा साबुन पानीले राम्ररी सफा गर्ने ।
- हातमा खाने तेल दल्ने वा नलोब लगाउने ।
- विस्तारै योनाङ्गबाट हात भित्र पसाई सर्भिसको मुख कतौ रहेको छ विचार गर्ने ।
- यदि बच्चाको टाउको वा खुट्टा पुच्छर आदि देखिएको भए त्यहीबाट हात पसाउने ।
- बच्चाको सामान्य स्थिति छ वा छैन विचार गर्ने ।
- बच्चाको स्थिति के छ पत्ता लगाई सोहि अनुरूप गर्ने अथवा अगाडिको खुट्टा अगाडि छन वा छैनन, टाउको अगाडि छ वा छैन हेर्ने ।
- टाउको पछाडि वा तल माथि बटारिएको भएमा बच्चाको मुख भित्र छिराएर सिधा गर्ने ।
- एउटा वा दुवै खुट्टा पछाडि फर्किएका भए बच्चाको खुट्टालाई हातले अगाडि ल्याउने ।
- बच्चा उल्टो फर्किएको भए पछाडिको शरिरलाई अगाडि धकेलेर सुल्टो पारी सामान्य अवस्थामा ल्याउने ।
- बच्चादानीको मुख नै नखुलेको भए Epidolcin हर्मोन सुई दिई ७२ घण्टा बच्चा निकाल्ने प्रयास गर्ने ।
- आफूले नसक्ने अवस्थामा धेरै अगाडि नबढेर सेवा केन्द्र अथवा हस्पिटल चिकित्सक बोलाउने व्यवस्था गर्ने ।
- यसरी बच्चाको अवस्था सुधारी सकेपछि टाउको नकसिने डोरीले अगाडिका खुट्टामा पनि डोरीले बाँध्ने, अब बिस्तारै तान्न शुरु गर्ने ।
- बच्चा राम्ररी निस्किएमा बच्चाको नाकबाट जाली हटाई दूध खान सघामा माऊलाई अरु जीवाणुबाट हुने असर कम गर्न एन्टी बायोटीक औषध पेनिसिलिन, डाइक्रिस्टासिलिन तथा टेरासाइसिन औषधिहरू प्रयोग गर्ने ।

- दुखाई कम गर्ने Inj. Diclofenac Sodium 10 ml-20 ml सम्म प्रयोग गर्ने।
- भिल्क फिबर हुन नदिन तथा दूध बढाउन क्याल्सीयम भएका औषधिहरू एग्रिमीन, अस्टोक्याल्सीयम, मीफेक्स Calup-Gel जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्ने ।
- समयमा साल झरेन भने Exsapor, Replantha प्रयोग गर्ने ।



गर्भावस्थाको अन्त्यतिर गर्भाशय भित्र बच्चाको स्थिति

४७. पशुहरूमा असामान्य अवस्थामा विहाउन नसक्नु र भण्डार फर्केको अवस्थाको रोकथाम तथा उपचार

विहाउन नसक्नु (Distocia)

बच्चा जन्माउदा राम्रोसँग जन्माउनु आवश्यक हुन्छ । बच्चा जन्माउदा बस्ने ठाउँ सफा, सुख्खा, न्यानो तर गर्मी नभएको, सम्म परेको र माउलाई भारामर्श पल्टन भिल्ने हुनु पर्छ । बच्चा जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै माउले प्रायः अर्कै किसिमको व्यवहार गर्न थाल्छ । माउ केहि आसिएको हुन सक्छ । प्रायः अर्कै किसिमको व्यवहार गर्न थाल्छ । आफ्नो कोखतिर पेट दुखेको जस्तै लाग्ने धेरै पटक बस्ने र उठ्ने गर्छ । आफ्नो कोखतिर पेट दुखेको जस्तै गरेर हेर्छ । त्यसको कल्चौडो भरिपूर्ण हुनु पर्छ र देखा सुनिएको जस्तो देखिन्छ । साधारणतया माउले बल गर्न थालेदेखि बच्चा जन्मन थाल्दा (करिब २.३ घण्टासम्म) लाग्छ । यदि त्यसलाई ८ घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा बच्चा मर्ने सम्भावना हुन्छ भने २४ घण्टाभन्दा बढी लागेमा माउ पनि मर्ने सम्भावना हुन्छ । ४८ घण्टा पछि पनि माउ मरेन भने मरेको बच्चा सुनिननसक्ने भए सजिलैसँग जन्मन्छ । दुई वटा अगाडिको खुट्टा र टाउको एकै चोटि बाहिर बाहिर निस्केमा वा दुई वटा पछाडिको खुट्टा र पुच्छर एकैचोटी बाहिर निस्केमा । यदि बच्चा यी दुवै अवस्थामा छैन भने यी मध्ये एक अवस्थामा मात्रै बच्चा ताकी सजिलै बच्चा जन्मन सकेस । प्रायः जसो पाठेघरबाट आउने तरल पदार्थले चिप्लो पार्छ तथापि कहिले काहीँ माउले आफ्नो बच्चा आर्प गर्नमाउन सक्दैन । यसलाई "व्याउन नसक्ने अवस्था (Dystocia)" भनिन्छ ।

बच्चा साधारण किसिमले जन्मन नसक्ने कारण: माउ कमजोर हुनु, अस्वस्थ हुनु, बच्चा निकाल्न बल गर्न नसक्नु, पाठेघर राम्रोसँग नखुल्नु, बच्चा ठीग्न नसक्नु, बच्चा मरेर सुकिसकेको, बच्चाको आकृति विशेषको, बच्चा पानामा नहुनु, बच्चा मरेर सुकिसकेको, बच्चाको आकृति विशेषको, बच्चा आउने बाटो सानो हुनु । यस्तो अवस्थालाई ठीक पार्न आवश्यक उपकरणहरू ठीक पार्नु पर्छ, सफा पानी र साबुन (बिबाणु नाशक साबुन), साना डोरी गार्डलन), प्लाष्टिक पंजा, तान्ने अंकुश (Delivery Hook) ।

परिक्षण: परिक्षण गर्नु भन्दा अगाडि आवश्यक प्रश्नहरू कृषकसँग सोध्ने पशुलाई सफा ठाउँमा राखेर पशुको जाँच गर्ने । माउको सुत बरिपरि पुच्छरमा साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने । यदि कुनै दुर्गन्ध आएको भए बच्चा मरिसकेको हुनु पर्छ । अब हात कुहिला माथिसम्म साबुन पानी राम्रोसँग धुनु पर्छ र चिप्लो बनाउनु पर्छ । अनि हात शुतबाट भित्र योनीभित्र

आउने कारणहरूः

- ३५५।८:

ОБЪЯТН:

- मध्यम फार्म

सहयोगी

विभिन्न उदाहरण: टाउको र एउटा आगाडिको खुट्टा ठीक भएको अवस्था, आगाडिको खुट्टा मात्र भएको अवस्था, पुच्छर मात्र ठीक भएको अवस्था, बायाँ पछिल्लो मरिसकेको, कुहिएको र सुनिएको अवस्था । कहिलेकाहीँ बायाँ मरिसकेको भए त्यसलाई टुक्रा नपाओँ त्यसै खिन्न सकिदैन, यस्तो अवस्थामा उपकरण (Embryotome Fetalome) प्रयोग गर्नु पर्छ ।


भण्डार फर्केको अवस्था (Prolapsed Uterus)

जब पाठेघर भित्रबाट बाहिर फर्कन्छ, श्रोतबाट बाहिर निस्कन्छ, त्यसलाई भण्डार फर्कने भनिन्छ । यस्तो अवस्था ब्याण्को केही घण्टापछि वा अघि हुन्छ । धेरै दुध दिने गार्डहरूमा क्यालसियमको कमीले गर्दा पनि यस्तो हुन्छ ।

उपचारः

- जति सक्दा चाडो पाठेघरलाई भित्र राख्नु पर्छ, नत्र माउ मर्न सक्छ । गन्ध पाठेघर ८ घण्टाभन्दा बढी बाहिर रहेको भए पशु मर्छ । समयमा उपचार भएमा ८०% जनावर बच्न सक्छ ।
- पाठेघरलाई राम्रोसँग सफा गरिसकेपछि भित्र पठाउनु पर्छ ।
- सम्भव भएमा माउको टाउको केही तलतिर पार्ने र खुट्टा अलि माथि पार्ने ।
- यदि पाठेघर सुनिएको छ भने त्यसलाई घटाउन चिसो पानी वा बरफ राखी चिप्लो पार्नु पर्छ ।
- पाठेघर भित्र Antibiotic Medicine राख्ने र Injection लगाउने ।
- पाठेघरलाई फेरि बाहिर धकेल्न नदिन टीका लगाउनु पर्छ ।
- बाच्छालाई दूध चुस्न लगाउनु पर्छ र यसले गर्दा Oxytocin उत्पादन हुन्छ, यसले पाठेघरलाई खिचन मद्दत गर्दछ ।

क्यालिसियमको कमी) संग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । पहाडी भागहरूमा यो समस्या भैसीहरूमा बढी देखिन्छ ।



लक्षणहरू:

- ब्याएको १ - २ दिन भित्रमा देखिन्छ ।
- ब्याउने व्यथा लागे जस्तै उठ्ने, बस्ने र कच्चे गर्दछ ।
- पाठेघरको भित्री भाग उल्टिएर आउँछ ।
- हेर्दा मासुको थुप्रो जस्तो देखिन्छ ।
- तुरन्त उपचार नपाए पशु सिधिल भएर मर्दछ ।

कारणहरू:

- चिउला वा पालुवा घासपात खाएमा ।
- कालो पोके वा ठुसी उमेरको दाना खाएमा ।
- बढी नुन एकै पटक खाएमा ।
- पहाडी भिरालो भकारोमा बाधेमा ।
- एकै पटक धेरै अन्न वा घासपात खुवाएमा ।
- ब्याएपछि समयमै साल नछारेमा ।
- पाठेघरमा चोटपटक लागेमा ।
- पाठेघर धेरै दखेमा ।
- ब्याउने बित्तिकै दूध नचुसाएमा ।
- ब्याएको पशुलाई रातमासी परेमा ।

उपचार:

- भण्डार चलाउनु अघि नड काट्ने र हात सफा गर्ने ।
- पशु सिधिल छैन भने उब्याउने ।
- यदि पशु सिधिल भए पशुलाई अगाडि होचो र पछाडि अग्लो पारेर राख्ने ।
- अगाडिका खुट्टा दोब्याउने र पछाडिका दुवै खुट्टा सिधा गरेर पछाडि तल्लो भाग बसाउने ।

- भण्डारलाई प्लाष्टिक वा भुवा नआउने सफा कपडाको माथि राख्ने ।
- सेब्लोन पानी वा मनतातो पानीले सफा गर्ने ।
- सुनिएको भए चुक अभिलो दल्ने वा मसिनो चिनी वा म्याग्नेसियम छुर्ने ।

- भण्डार आफ्नो घुडामाथि लिएर योनीको मुखदेखि दुवै हातले ठेल्दै यसरी क्रमशः पुरै भाग भित्र राख्ने ।
- पशुले कनेको बेलागमा नठेलिकन धामेर बस्ने, नकनेको बेलागमा मात्र ठेल्ने
- पाठेघरको बसाई प्राकृतिक रूपमै रहनु पर्छ । यसका लागि हातले वियरको बोतल जस्ता चीजको सहायताले धर्कल्ने ।
- अन्त्यमा सल्फाडिमिडिन चक्की पाठेघरमा राख्ने ।
- ज्वरो कम गर्ने इन्जेक्सन दिने ।
- यस्तो पशुलाई अगाडि होचो र पछाडि अग्लो भकारोमा बाधेने ।
- माथिको उपचारसँगै गाडले तरीकाबाट विंडो पनि राख्न सकिन्छ ।
- केही फाइदा हुन सक्छ । तर बिडो नरम कपडाबाट बनाउनु पर्दछ ।
- सुती कपडा वा प्लाष्टिक डोरीले सिलाउने । यस्तो बेलागमा सिलाउँदा हुनु

तोकथाम:

- पशु स्वस्थ बनाएर पाल्ने । यसका लागि जुका र नास्तेको औषधि खुवाउने । पोषिलो घासपात खुवाएर पशु पाल्ने ।
- दैनिक ४० - ५० ग्राम भन्दा बढी नुन खान नदिने ।
- एकै पटक धेरै पानी र घासपात नदिने तर थोरै थोरै पटक पटक गरेर खुवाउने ।
- ठुसी लागेको, कुहिएको खानेकुरा नखुवाउने ।
- ब्याउने पशु बाधेने ठाउँको अगाडि केही होचो र पछाडि केही बनाउने ।
- यदि लगातार पहिलो, दोश्रो, तेस्रो बेतमा पनि देखिएमा यस्तो पशु मासुको लागि बेच्ने । यस्तो माउको पाडीहरू नपाल्ने ।

प्राप्त नक्षर्ने

जागरणतया ब्याएको ३ - ४ घण्टा भित्रमा साल झर्छ । साल छिटो भागि ब्याउने बित्तिकै दूध चुसाउनु पर्छ । कहिले काहीँ साल आफैँ झर्छ

प्राप्त नक्षर्ने कारणहरू:

- साधारण अवस्थामा ब्याउन नसक्नु ।
- कमजोर हुनु ।
- ब्याउने समय अघि नै ब्याउनु ।

- जुस्त्याहा बच्चा जनिमनु ।
- मरेको बच्चा जनिमनु ।

साल नझरे कसरी उपचार गर्ने ?

साल नझर्दा उपचार नगरेमा आउने बेतको लागि नराश्रो असर पर्न सक्छ । जस्तै: पाठेघर पाक्ने, गर्भ नथडिने आदि । त्यसकारण समयमा उपचार गर्नु पर्दछ ।

साधारणतया ब्याक्को ३/४ घण्टा भित्रमा साल झर्छ । साल छिटो झर्नको लागि ब्याउने बित्तिकै दूध चुसाउनु पर्छ । कहिले काहीँ साल आफैँ झर्दैन ।

साल नझर्ने कारणहरू:

- १) साधारण अवस्थामा ब्याउने नसक्नु ।
- २) कसबोर हुनु ।
- ३) जुस्त्याहा बच्चा जनिनु ।
- ४) मरेको बच्चा जनिनु आदि ।

साल नझरे कसरी उपचार गर्ने ?

साल नझर्दा उपचार नगरेमा, आउने बेतको लागि नराश्रो असर पर्न सक्छ । जस्तै: पाठेघर पाक्ने, गर्भ नथडिने आदि । त्यसकारण समयमा उपचार गर्नुपर्छ ।



उपचार गर्दा:

- Extrap (एकसपार) झोल खुवाउने ।
- रिपलेण्टा पाउडर खुवाउने ।
- साल नझरेको समयमा ज्वरो आएमा पाठेघर पाकेको हुन सक्छ, त्यसैसँग ज्वरो कम हुने सुई दिने ।
- सेब्योन पानीले पाठेघर सफा गर्ने ।
- सल्फाडिमाइडिन, अक्सी टेद्रा बोलस, सेफ्लोक्सिन आदि पाठेघरमा राख्नु पर्छ ।

रोकथाम:

- ब्याउने बित्तिकै बच्चालाई दूध चुसाउने ।
- एम्सापार वा रिपलेण्टा आदि खुवाउने ।

४९. पशुहरूमा गर्भ तुहिन रोगको कारण तथा उपचार विधि

कहिले काहीँ पशु गर्भिणी भए पछि गर्भाशय (पाठेघर) मा भएको बच्चा जन्मन नपाउँदै मर्दछ । अनि माउले भूतक बच्चा जन्माउँछ । यो अवस्थालाई गर्भपतन वा गर्भ तुहिन (Abortion) भनिन्छ । गर्भपतनका कारण अनुसार गर्भपतन गर्भावस्थाका विभिन्न समयमा हुने गर्दछ । गर्भपतन निम्न लिखित कारणबाट हुने गर्दछ:

- गर्भिणी अवस्थामा राम्रो आहारको कमी हुनु ।
- कुनै उच्च (कडा) ज्वरोले पनि गर्भ तुहिन सक्छ । जस्तै: भ्याण्टे वा खो जस्तो संक्रामक रोगलागोमा आउने उच्च ज्वरोको कारण ।
- कुनै औषधि (जस्तै: सि.टी.सि.) र भ्याक्सीनहरूले पनि गर्भपतन हुन सक्छ ।
- केही चोट पटकले पनि गर्भ तुहिन सक्छ ।
- प्रजनन प्रणालीका संक्रामक रोगहरूले त झन् खास तवरले गर्भपतन गराउन सक्छ । ब्रुसेल्लोसिस र लेप्टोस्पाइरोसिस यस्ता रोग हुन् जसले प्रजनन प्रणालीमा संक्रमण गरी गर्भ तुहिन सक्छ ।

ब्रुसेल्लोसिस (Brucellosis)

यसलाई छुनबाट सार्ने गर्भपतन (Contagious Abortion) भनिन्छ । Brucella नामक Bacteria को कारणले हुने एउटा संक्रामक छुवाछुतबाट रोग लाग्न हो । यो Bacteria ले विभिन्न पशुका प्रजनन प्रणालीमा असर गर्दछ । Brucella प्रजातिका विभिन्न Bacteria ले भेडा तथा सुँगुरमा गर्भपतन गराउँदछ । यस रोगले मानिसमा अन्डुलेन्ट ज्वरो (Undulant Fever) भनिने ज्वरो (Malta Fever) भन्ने रोग लागी असर गर्दछ । गर्भपतन भएमा झोएमा वा Brucella जिवाणुसँग संक्रमण भएको दूध पििएमा यो रोग लाग्दछ । मानिसमा यो रोग लागेमा कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने, ज्वरो हुने र टाउको दुख्ने गर्दछ ।

मानिसमा हुने ब्रुसेल्लोसिस: यो एक जिर्ण प्रकारको रोग हो र पशुहरूमा 'ब्याक्टिरिया (Bacteria abortus) सँग लसपस (छुत) भएका खाना खाएमा संक्रमण हुन जान्छ । यसका ब्याक्टिरिया पाठेघरमा प्रवेश गर्दछन् र त्यसबाट गरी गर्भपतन गराउँदछन् । ब्याक्टिरिया दूधबाट पनि निस्कन्छ ।

संरक्षण: धेरै जसो गर्भपतन गर्भावस्थाको ५ - ८ महिनामा हुने गरेको देखिन्छ। यसबाट अक्सर साल अड्कने हुन्छ र गाई बाँझो (Infertile) हुन सक्छ ।

उपचार: यसको कुनै उपचार छैन ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण: धेरै जसो देशमा रगत परिक्षण पश्चात् संक्रमण भएका पशुहरूको वध गर्नु अनिवार्य गरिएको हुन्छ । यसको एउटा बुसेल्ला भ्याक्सीन पनि पाइन्छ तर खतरनाक हुन्छ । पशुको गर्भपतन भएको बच्चा र सालमा कैयौं संख्यामा Bacteria Bacteria हुन्छन्, त्यस्तो किसिमको साल वा बच्चा जथाभावी फ्याक्टिएमा वातावरण नै दुषित हुन जान्छ । तसर्थ साल र बच्चालाई जमिन मुनि गाड्ने र अन्य पशुलाई त्यस क्षेत्रमा आउन नदिने गर्नु पर्दछ ।

सावधानी: यस रोगबाट गर्भपतन भएको अवस्थामा साल अड्केको बेला हातमा पंजा (Gloves) लगाएर मात्र उपचार गर्नु पर्दछ र पछि किटाणुनाशक औषधिले हात सफा गर्नु पर्दछ ।

लेप्टोस्पाइरोसिस (Leptospirosis): पशु तथा मानिसमा रोग लगाउने Leptospiroa व्याक्टेरिया धेरै प्रकारका छन् । कुकुर, बगुर तथा गाई र त्यस्तै गरी मुसाले पनि यो रोगको संक्रमण गर्ने श्रोतको रूपमा काम गर्ने गर्दछन् ।

गाईमा हुने लेप्टोस्पाइरोसिस: यो रोग तीक्ष्ण प्रकारको भएको हुँदा वास्तवमा वयस्क गाई भन्दा ज्यादा बाच्छा बाच्छी बिरामी पर्ने गर्दछन् । ती पशुमा हेमोग्लोबिन्युरिया (Hemoglobinuria) (रातो पिसाब) का लक्षणहरू देखा पर्दछन् । रातो पिसाब रक्त अल्पता र उच्च ज्वरोको साथमा देखा पर्दछ । यस्तो तीक्ष्ण प्रकारको रोगबाट बाच्छा बाच्छी सहजै मर्ने गर्दछन् तर गाई गोरमा भने भिन्नै प्रकारको असर हुन्छ ।

वयस्क गाईमा देखिने लक्षणहरू: अक्सर धेरै पशुमा एकै पटक गर्भपतन हुन जान्छ ।

उपचार: ज्वरो आउने र पिसाब जोच गर्दा हेमोग्लोबिन्युरिया भएको हुने तीक्ष्ण अवस्थामा Tetracycline वा Doxycycline औषधि दिन सकिन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण: केही देशहरूमा यो रोगको एउटा भ्याक्सीन उपलब्ध छ । यो रोगमा पशुले प्रतिरक्षण क्षमता (Immunity) प्राप्त गर्ने हुँदा यो रोग आफैँ निको हुन जान्छ । यो रोगको कारणबाट पशुको वध गर्नु पर्दैन । मुसा नियन्त्रण गरी तिनले खानामा दिसा गर्नबाट रोक्नाले यो रोगको नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्दछ ।

५०. पशुहरूमा सिङ्ग आउन नदिने अथवा हटाउने (IDELIBORNING). खुर काट्ने

कस्टीक सोडाको प्रयोगबाट: सिङ्ग नभएका जनावर शान्त स्वभावका हुन्छन् अन्य जनावरहरूलाई नोकसान नपुर्‍याउने वा नलड्ने खालका हुन्छन् त्यसकारण खासगरी गाईमा बाच्छाबाच्छी जन्मनासाथ ५ देखि ८ डि उमेरमा सिङ्ग नआउने बनाउन सकिन्छ । यसरी सिङ्ग आउन नदिने ब समयमा सिङ्गको फेद कडा भएको हुनु हुँदैन । कस्टीक सोडाको प्रयोग पशु वस्तुमा सिङ्ग नआउने बनाउने तरीका तलका बुँदामा दिइएका छन्:

- बाच्छाबाच्छी जन्मेको ५ देखि ८ दिन भित्रको हुनु पर्छ ।
- सिङ्गको बटन (फेद) बरिपरीको तौ सबै काट्नु पर्छ ताकि राम्रोसँग देखि
- सिङ्गको बटन भित्र भ्यासलिन (Vaseline) लगाई दिने, जसले गर्दा प्रयोग
- कस्टीक सोडा (Cautic Soda) बगेर अखामा जाँदैन ।
- सिङ्ग राम्रो गरी देखिने गराउनको लागि कस्टीक सोडाको पेन्सिलको
- केही दवाब दिएर गोली गरी घुमाउँदै लगाइ दिने गर्नु पर्छ ।
- यो कस्टीक सोडालाई तबसम्म रगड्दै लगाउनु पर्छ जबसम्म अलि
- खाल्डो हुँदैन र सबै रक्तश्राव बन्द हुँदैन ।
- यो कस्टीक सोडालाई धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नु हुँदैन । कस्टीक सोडाको
- लगाएमा बढी भएको जति बगेर मुखतिरको तनुलाई नष्ट गर्न सक्छ ।
- यो प्रक्रिया धेरै जोडसँग गरेमा छाला फुट्न गई तनुहरूमा आघात
- पनि सक्छ । यो Deliboring बैलुकाको समयमा गर्नु पर्छ ।

तातो फलामको छडको प्रयोगबाट: तातो फलामको सहायताले पनि नआउने बनाउन सकिन्छ । यो फलामको छडको छेउमा गोली आकार शीचमा प्वाल भएको हुन्छ । जसले सिङ्गको फेदको पुरा भाग ढाक्न स यो छडलाई राम्रोसँग तातो हुने गरी तताउने र बाछाको उम्रन ल सिङ्गको कोपिला (बटन) मा केही सेकेण्डसम्म मात्र राखी अलिकति दिने । बिजुलीबाट तातिने विशेष प्रकारका छड पनि पाइन्छ । यो माथि भने झै प्रयोग गरिन्छ ।

खुर काट्ने तरीका (Foot Trimming): जनावर ९ महिनाको पुगेपछि राम्रसँग निरीक्षण गरी राख्नु पर्छ । यदि खुर नराम्रो किसिमले बढ्ने गरेर भने समय समयमा खुर काट्ने गर्नु पर्छ । यदि समयमा खुर काटिएन भने जनावरलाई हिड्नुल गर्न साथै चर्न पनि गाह्रो पर्छ । त्यसकारण जनावरको उभिएको अवस्थामा Trimming Knife वा Trimming Nippers को सहायता काट्न सकिन्छ । खुर काट्दा धेरै काटियो भने धेरै डुल्ने, रगत बग्ने संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । यसैले धेरै होसियार भएर काट्नु पर्छ ।

५१. जनावरलाई खसी पार्ने

साधारणतया बोका या बहरको बीर्य नली च्यापेर खसी पारिन्छ ।

खसी किन पार्ने ?

खसी पार्ने:

- पालन र काबुमा ल्याउन सजिलो हुने ।
- खसी पारेको जनावर बयानमा बस्छ ।
- मासुको गुण सुधार हुन्छ, बोकाको गन्ध कम हुन्छ ।
- प्रजननका लागि नचाहिने भाले जनावर खसी पार्दा नशल सुधारमा टेवा पुग्छ ।
- पोथीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिनबाट बचाउन सकिन्छ ।
- बोकाको भन्दा खसीको मासुको मूल्य बढी पाइने गरेकोले खसी पार्दा फाइदा छ ।
- बोका खसी पार्दा बढ्छ र छिटो बिक्रिन्छ । पहाडी कुना काप्चामा दुब्लो भन्दा मोटो र बढी बोसो भएको मासु मन पराउने भएकोले बोसो बढाउन पनि खसी पारेको पाइयो ।

खसी पार्दा बेफाइदा:

- प्रजननको लागि भाले (बोका, विर वा बंगुरको भाले र बहर) समयमा उपलब्ध नहुन सक्छ । गाउका सबै प्रजनन योग्य भाले खसी पारी सकेपछि ब्याडे बोका वा बहर पाइदैन र नशल सुधारमा बाधा पर्छ ।
- खसी पार्दा हिलो बढ्छ ।
- बोसो धेरै हुन्छ ।
- बोका खसी पारेर ३ वर्षको अवधिसम्म पाल्दा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुन्छ ।

किन र कसरी ?

तीन वर्षमा १०९५ दिन हुन्छ (३६५ x ३ दिन) । एक वर्ष उमेर पुगि सकेपछि खसीलाई दिनको ४०० ग्राम जति दाना दिनुपर्ने हुन्छ । तर गाउमा बिहान १०० ग्राम जति र बेलुका १०० ग्राम जति गरेर दिनमा २०० ग्राम जति मकै दिने चलन छ । त्यसैले २०० ग्राम प्रति दिनलाई १०९५ दिनले गुणन गर्दा २,१९,००० ग्राम हुन आउँछ । २,१९,००० ग्राम ३ वर्षमा एउटा खसीले मात्र खाएछ । २,१९,००० लाई १००० ग्रामले भाग गर्दा २१९ किलो ग्राम भयो ।

आम्दान संकटको बेला मध्य पहाडी जिल्लामा मकै एक के.जी.को र मात्रैले गुणन गर्दा ५,४७५ रुैया हुन आउँछ ।

एउटा खसीले ३ वर्ष खाएको मकैको मात्र रु ५,४७५ मूल्य आउँछ । यदि त्यो खसी रु ४,००० मा बेच्न सिकियो भने रु. १,४७५ मात्र घाटा पर्ने देखिन्छ । हिसाब:

- खसीले खाएको मकैको मूल्य रु. ५,४७५।
- खसी बेच्दा पाएको मूल्य रु. ४,०००।
- ३ वर्ष खसी पाल्दा घाटा रु. १,४७५।

माथिको हिसाबमा खसीले खाएको घांसको, गोठालाको, गोठको आचारको खर्च जोडिएको छैन । यी सबै जोड्दा मासु उत्पादन बढ्न जान्छ । त्यसैले मासु उत्पादनको लागि पालिने बोका, शुभा बंगुरको सुगुरको भाले) को उमेर एक वर्ष भित्र खसी नपारी त पहाडजनक हुन्छ । बोका किन्नेले खसी किन्दैन, लामो समय पाल्दा बर्ष बढ्छ । आम्दानी भन्दा लगानी धेरै हुन्छ ।

खसी पार्ने सिलसिलाका समस्याहरू: सावधानी पूर्वक खसी नपारे सक्छ । जनावरलाई घाउ हुन्छ, दुब्ल्छ, हिड्डुल गर्न मुस्किल हुन सक्छ । रगत बग्ने भिनाले औसा किरा पार्ने, अण्डकोष सुनिने समस्या बढ्छ ।

खसी पार्नु अघि निम्नानुसारको सामाग्रीहरू चाहिन्छ:

- काबुमा ल्याउने मानिस (जनबल)
- असली बर्डिजो क्यास्टेटर
- २५/३० हात लामो डोरी
- दहो गरी गाढेको पशु बाधने किला
- टिन्चर आयोडिन, फर्सेप, कटन ब्लेड, इयान्डल
- पशु लडाउने नरम ठाउँ
- अनुभवशी व्यक्ति नभए खसी नपर्ने भै दुःख हुन्छ (खेस्के वा जरवा
- उन्नत बोका खसी पार्दा नशल सुधारमा अवरोध आउँछ ।
- खसी पारेपछि दिने पौष्टिक आहारको समस्या हुन्छ ।

खसी पार्ने गाउँमा चलेका विभिन्न चलनहरू:

- काठको चेपुवाको सहायता घनले ठोकेर ।
- छाला ब्लेडले चिरेर अण्डकोष भित्रने ।
- जन्मिएको केही घण्टा भित्र टोपी या कपडाको सहायताले दाँत कर्छ टोकेर शेन्चो पारेर ।

- अण्डकोष भिन्नेर, नङले विमोटेर र धुलो पोरेर (अति दुख्ने हुन्छ)
- रबरले अण्डकोषको माथि कईमा बाधेर २० देखि २५ दिन सम्म छाड्ने ।
- डोरीले अण्डकोषको फेदमा बाधेर तानेर ।
- बर्डिजो क्यास्टेटरको सहायताले ।

साबधानी पूर्वक खसी पार्ने तरिका: गाईको बहर (साढे) रांगा, बोका र भेडाका शुमा बर्डिजो क्यास्टेटरको सहायताले खसी पार्न सकिन्छ ।

खसी पार्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु:

- चर्को घाममा टाढाबाट खेदर ल्याएका जनावरलाई आधा घण्टा आराम गराए पछि मात्र खसी पार्ने ।
- जाडोको समयमा अण्डकोष भित्र पस्ने र स्पर्शमूक कई खुनिचएर छोटो हुने हुन्छ । पशु लडाएपछि अण्डकोष बाहिर तानेर एक छिन मालिस गरेर तन्काएपछि (चित्र जस्तै) मात्र बर्डिजो क्यास्टेटरले च्याप्नु पर्छ ।

खसि पार्ने उपयुक्त उमेर:

पशुको किसिम	खसि पार्ने उमेर
साढे, रांगो	१.५ देखि २.५ वर्ष
बोका, शुमा	१.५ देखि २.५ महिना
बंगुर, सुंगुर	१.५ देखि २.५ वर्ष
घोडा	२ देखि ३ वर्ष

खसि पार्ने तरिका: खसि पार्ने २ प्रकारले गरिन्छ:

खुला तरीका (Open Method): अण्डकोषको छालालाई BP Blade ले चिरी अण्डकोष बाहिर निकाली टाँका लगाइदिने । यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरु निम्न रहेका छन् । Cotton, Bandage, Spirit, Jnj. Xyllocane, BP Blade, BP Handle, Artery Forceps, Dressing Forceps, Scissors, Suturing Needle, Catgut, Antibiotic Medicine etc.

बन्द तरीका (Close Method): बर्डिजोकास्टेटरको सहायोगबाट अण्डकोस भन्दा माथि रहेको स्पर्शमूक कईलाई च्यापी दिदा Spermatic Cord टुकिन गद् Sperm आउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ । यसरी पशुहरुलाई खसि पार्दा २ प्रकारले खसि पार्न सकिन्छ । तर बंगुर, कुकुर र घोडालाई Open Method बाट मात्र खसि पार्नु पर्छ ।




बर्डिजो क्यास्टेटर



विर्य नली च्यापेर खसी पार्दै गरेको

खसी पार्ने



५२. विरामी पशुहरूमा रोग पहिचान गर्ने तरीका र लक्षण अनुसार उपचार पद्धति

पशुहरूको रोग परिक्षण गर्दा रोगी पशुको अवस्था, बथानमा भएका पशु संख्या, पशु राखेको ठाउँको अवस्था, चरन क्षेत्र, गोठको अवस्था, अस्वस्थ पशुको संख्या, पशुको मृत्यु संख्या, दानापानी, उपचारको विवरण आदि बारे जानकारी लिनु पर्दछ । पशुको रोग पहिचान गर्दा उक्त विवरण थाहा पाउनु अत्यन्त जरुरी हुन आउँछ । रोगी पशुको पहिचान गर्न स्वस्थ पशुको अवस्था बारे जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

स्वस्थ पशुको बाह्य आकृतिमा देखिने लक्षणहरू:

- स्वस्थ पशुको आँखा चम्किलो तथा कान चनाखो हुन्छ ।
- शरीरको रौ चिल्लो तथा मुसार्दा सजिलै बस्ने हुन्छ ।
- छाला खस्रो नभई प्राकृतिक अवस्थाको हुन्छ ।
- शुतुनो भिजेको हुन्छ ।
- पुच्छर तथा कानले खिझा भगाउने गरेको पाइन्छ ।
- मुखबाट कुनै अप्राकृतिक दुर्गन्ध आउँदैन ।
- खाना रची भएर खान्छ र हिसा सफा तथा सामान्य हुन्छ ।
- समय समयमा उग्राउने गरेको पाइन्छ ।
- Runten (पेट) को चाल स्पष्ट र नियमित हुन्छ ।
- दाँडिएको देखिँदैन ।
- पिसाब नियमित तथा सफा हुन्छ ।
- पिसाब गर्दा अप्ठ्यारो महसुस गर्दैन पिसाबमा रगत, पिप तथा दुर्गन्ध हुँदैन ।
- श्वास प्रश्वास नियमित र सामान्य हुन्छ ।
- पशुले नाकबाट सजिलै सास फेर्दछ ।
- नाकबाट सास फेर्दा दुर्गन्ध तथा सिंगान निस्कदैन ।
- नाडीको गति सामान्य र नियमित हुन्छ । (सामान्यतया गाई, बैसीको नाडीको गति पुच्छरको फेद, कानको फेद र मुखको धमनीबाट लिइन्छ । घोडाको नाडी मुखको धमनीबाट लिइन्छ ।

तापक्रम: पशुको सामान्य तापक्रम पशुको जात, नस्ल, उमेर, कामको अवस्था तथा आहारमा भर पर्दछ । तापक्रम लिंदा धर्मीमिटरलाई राम्ररी 0°C तापक्रममा झारी विस्तारै होसीयारी सित मलद्वारको म्युकस मेम्ब्रेन (Mucous Membrane) छुने गरी २ मिनेट राख्ने र तापक्रम पत्ता लगाउने । विभिन्न पशुहरूको सामान्य तापक्रम, नाडीको गति तथा श्वास प्रश्वास क्रिया निम्न अनुसार हुने गर्दछ:

पशुको किसिम	तापक्रम/डि.फ. (OE)	नाडीको गति/मिनेट	श्वास क्रिया
गाई/बैसी	१०१ - १०२	४० - ६० पटक	१२-१६ पटक
बाच्छा/पाडा	१०२ - १०३	६० - ९० पटक	२०-२७ पटक
घोडा/खच्चर	१०० - १०१	३०-४० पटक	८-१२ पटक
भेडा/बाख्रा	१०२ - १०३	४५-७५ पटक	२०-३० पटक
बंगुर/सुगुर	१०२ - १०३	८०-१०० पटक	१५-२५ पटक
कुखुरा	१०६ - १०७	१२०-१६० पटक	१५-४० पटक

अस्वस्थ अवस्थाका पशुहरूमा देखिने लक्षणहरू:

- अस्वस्थ पशु राम्रोसँग उभिएको हुँदैन, एकालत खोप्छ ।
- शरीरको रौ खस्रो, छाला सुकेको, चिसो पसिना आएको तथा छाला रोग देखिन्छ ।
- नाकबाट सिंगान चुहेको श्वास गन्हाउने हुन्छ ।
- मुखमा खटिरा हुने, मुखबाट प्याल चुहिने हुन्छ ।
- अपच, अघिर्ण भई पेट फुलेको, मुख गन्हाउने, दानापानी राम्ररी नख खिर्वाउने तथा पानी नखाने, हिसा गोटा तथा पातलो हुने, हिसामा आठ) मासी तथा दुर्गन्ध आउने हुन्छ ।
- जति खाए पनि नसोटाउने, दूध घट्ने, तौल घट्दै जाने हुन्छ ।
- बढी पिसाबको असाधारण रङ्ग तथा पिप, रगत बगिरहने, पिसाब न कुश्रो पर्ने, दुबेको महसुस गर्ने हुन्छ ।
- श्वास प्रश्वास क्रियामा कठिनाई हुने, पशुले मुख खोलेर सास लिने हुन्छ ।
- तापक्रम, नाडीको गति असामान्य हुन्छ ।
- शरीरको कुनै भाग सुनिने अथवा आकारमा परिवर्तन हुने हुन्छ ।

पशुहरूको सामान्य अवस्थामा शाश्वतिक तथा भौतिक परिवर्तन हुंदा रोगी छ भन्ने बुझिन्छ । यसरी परिवर्तन हुने धेरै कारणहरू हुन् । यस्तो कारणहरूको बारेमा थाहा हुँदैन तबसम्म पशुको उपचार गर्न सकिँदैन ।

५३. पशुहरूमा रोग लाग्ने कारणहरू

१) जिवाणु (Bacteria): जिवाणुबाट पशुहरूमा विभिन्न किसिमका रोगहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् । यस्ता रोगहरू दुषित हावापानी, चारा तथा रोगी पशुको सम्पर्कबाट स्वस्थ पशुमा सर्ने गर्दछन् । जिवाणुहरूबाट पशुहरूमा सर्ने रोगका उदाहरणहरू भ्यागुते, चरचरे, पटके, शुनेलो, क्षयरोग, बुसेल्लोसिस, भाइब्रोसिस, साल्मो नेल्सोसिस आदि हुन् ।

२) विषाणु (Viruses): पशुहरूलाई रोगी बनाउने विषाणुहरू जिवाणु भन्दा पनि अति शुक्ष्म किसिमका हुन्छन् । विषाणुले रोगहरू हावा, पानी, रोगी पशुको सम्पर्क आदिबाट सार्ने गर्दछन् । गौगोटी, खोरेत, रेविज, विफर, पि.पि.आर. आदि विषाणुबाट सर्ने रोगका उदाहरणहरू हुन् ।

३) दुसी (Fungus): यो पनि एक प्रकारको सुक्ष्म जिवाणु हो । यसले पशुमा दाद (Ring Worm), लुतो (Mange) तथा शुनेलो पनि हुन सक्छ ।

४) Protozoa: यो एक प्रकारको सुक्ष्म परजिवी हो । यो रोग कुनै खास माध्यमबाट एक अर्कामा सर्दछ । जस्तै: लहुमुते (Abesiosis), Trypanosomiasis, Coaridiosis, Alabazmanasis आदि ।

५) आन्तरिक परजिवी: जुका, नाम्से जुका आदि ।

६) पाचन क्रियामा गडबडी (Metabolic Imbalance): शरीरमा अवशोषण हुने प्रक्रियामा असर पर्न गए अथवा आहारमा यस्ता तत्वहरूको गडबडी भएमा यस्ता प्रकारका रोग लाग्दछन् । जस्तै: Milk Fever, Ketosis आदि ।

७) रासायनिक पदार्थहरू (Chemical Agents): शरीरले ग्रहण गर्न नसक्ने रासायनिक पदार्थहरूको कारणबाट पनि रोग लाग्दछ । जस्तै: विषाक्तता, अस्तीय तथा क्षारीय असर आदि ।


८) भौतिक पदार्थहरू (Physical Agents): पशुले आहाराको साथमा कुनै किला काँटी खान पुग्छ अथवा कारणवश ठोस वस्तुमा ठोक्किन पुग्छ अथवा धारिलो वस्तुले काटिन गए पनि पशु बिरामी हुन सक्दछ ।

१) Allergy: पशुले ग्रहण गर्न नहुने तत्वहरूको सम्पर्कमा रहन पाएमा खान गएमा पशुमा Allergy हुन जान्छ ।

पशुहरूको औषधि उपचार गराउँदा उपरोक्त कारक तत्वहरूको अध्ययन गरी उपचार गरेमा राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ । उक्त कारक तत्वहरूमा पाउन निम्न कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ:

- बथानको पशु संख्या/जात ।
- बिरामी पशु संख्या ।
- मरेको संख्या ।
- रोग फैलिएको अवधि ।
- रोगको मुख्य लक्षण ।
- हालसम्मको उपचारको स्थिति ।
- रोकथाम/खोपको विवरण ।
- चरन/घासका जातिका स्थिति ।
- पिउने पानीको अवस्था आदि ।

पशुमा रोग सर्ने बाटाहरू



५४. बाच्छाको छेरैटी/रगतमासी (आउपनै) रोगको जानकारी तथा उपचार पद्धति

कलिला पाडापाडी/बाच्छावाच्छीहरूलाई आउं पर्ने र छेरैटी रोगले धेरै सताउने गर्छ । जसका कारण शरीरमा पानीको मात्रा कम भई मृत्यु समेत हुन सक्छ।

कारण:

- विभिन्न आन्तरिक परजिवीहरू: गोली फिते, नाम्ले जुका आदि ।
- कक्सीडियोसिस रोग ।
- विभिन्न कडा रोगहरू तथा विभिन्न जिवानु, विषानु रोगको संक्रमण।
- आहाराको कमी ।
- संक्रमणयुक्त पानी ।
- सरसफाई व्यवस्थापनमा कमी ।


लक्षण:

- आउं परेमा हिसासै चिप्लो म्याक्स आउने ।
- आउंसँग कहिले काही रगत पनि देखा पर्छ ।
- छेरैटी भए पातलो गोबर आउने ।
- गोबर गान्हाउने हुन्छ ।
- पशुले मन लगाएर नखाने ।
- पशु अत्यन्तै दुब्लो हुने ।
- पशुको आँखा, भित्र छिरेको हुने ।
- कमजोर, उदर नसम्ने हुन सक्छ ।
- कसैलाई ज्वरो आउने ।

उपचार

आयुर्वेदिक औषधिहरू:

- नेवलोत: ठूला जनावरलाई ५० ग्राम र साना जनावरलाई १० देखि २० ग्राम दिनमा २ पटक माड वा पानीमा घोलेर ढुङ्ग्रोबाट पिलाउने ।
- डायरोक: ठूला जनावरलाई १० ग्राम र साना जनावरलाई ५ ग्राम दिनमा २ पटक पानीमा घोलेर ढुङ्ग्रोबाट पिलाउने ।
- पुनर्जलीय उपचार: नमल सलाइन आधा दा एक बोतल आवश्यकतानुसार दिने ।



छेरैटी निको पार्न नेवलोत पाउडर ५० ग्राम १२ घण्टाको फरकमा निको नभए सम्म खुवाउने

शिक्षण:

- सरसफाई एवं व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने ।
- नियमित इन्चिड गरी राख्ने र म्याक्सिनेशन कार्य नियमित गर्ने ।
- रोगी पशु छुट्ट्याएर राख्ने । सम्भव भएसम्म गोबर जीच गराउनु सूचना प्रवाह गर्ने ।
- रोगी पशुको आवत जावतमा रोक लगाउने, अभिलेख प्रणाली विकको पशु सेवा केन्द्र/पशु सेवा प्राविधिकसँग सल्लाह निराकरण गर्ने र उपचार गर्दै जाने ।

५५. पखाला तथा रगतमासी (आउ) नियन्त्रण एवं उपचार विधि

पखाला लाग्ने (छैरैटी रोग) (Diarthoea)

पशुहरूले पटक पटक पातलो दिसा गरेमा छैरैटी लागेको भनिन्छ ।

कारण: जिवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोवा, आन्तरिक परजिवि, नन्सेसिफिकमा दानापानीको गडबडी, कलेजोको खराबी, पोल्ने औषधिको प्रयोग, स्ट्रेस, भिटाभिन बी कम्प्लेक्सको कमी, विषपान आदि।

लक्षण: पेट फुल्ने, दानापानी मन लगाएर नखाने, बढी तिर्खाउने, शरीरमा पानीको कमी, पेट दुख्ने दाँत कट्कटाउने, आँखा तल गाडिने, श्नुनो सुख्खा हुने, गगौटीमा पिचकारी (सुटिङ्ग डाइरिया), नाम्ले जुकामा बेसरी गन्नाउने, काफ स्काउरले बाच्छावाच्छी मर्ने, एस्कारिस भएमा सेतो लेवो छेर्ने जस्ता लक्षण पनि देखिन्छन् ।

उपचार:

- ननसेसिफिक डाइरियामा नेबलोन, डायडिस्को, डायरोक: ठूला पशुलाई ५० ग्राम, साना पशुलाई १०-१५ ग्राम दिनको २ पटक ।
- श्री केयर बोलस, दिनको २ पटक ।
- शरीरमा पानीको कमी भएमा नर्भल सलाइन, डेक्स्टोज, इलेक्ट्रोलाइट
- पेटको दुखाई कम गर्न एट्रोपिन सल्फेट, एनाल्जेसिक ।
- सेल्फोन्गोमाइड ड्रास वा एन्टीबायोटीक्स, जस्तै एम्पीसिलिन ४ - १० mg, क्लोराम फेनिकल ४ - १०mg, टेट्रासाइक्लीन ५ - १० mg, फ्युराजोलीडिन १० (२० mg/kg ३ - ५ दिनसम्म) ।
- प्रोटोजोआबाट भएमा मेट्रोनिडाजोल, टिनीडाजोल २०० - ४०० mg x १ पटक x ५ दिनसम्म ।
- आन्तरिक परजिवीबाट विषराजीन, फेन्वेन्डाजोल, एलवेन्डाजोल, अक्सीक्लोजेनाइड आदि ।
- अपच, अजिर्ण, भिटाभिन बी कम्प्लेक्सको कमीले भएमा बी कम्प्लेक्स, लिभर एक्स्ट्रेट १०ml ठूला पशुलाई र ३ - ५ ml साना पशुलाई ।

रगतमासी (आउ) (Dysentery)

लक्षण: यस रोगमा ठूलो आन्त्राको इन्फेक्सनको फलस्वरूप दिसामा रगत म्युकस (मासी) मिसिएर आउने, दिसा गर्दा बल लगाउने, ज्वरो आउने, पटक थोरै दिसा गर्ने गर्दछ ।

कारण: कक्सीडिया, एमीबीक जीवाणुको संक्रमण ।

उपचार:

- कक्सीडियाको कारणले रगतमासी परेमा सल्फाडिमाइडिन २ गोली दिन पटक गरी ३ दिन सम्म ।
- मेट्रोनिडाजोल ४०० mg २ पटक ।
- बाच्छा पाडालाई टेट्रासाइक्लीन, क्लोरामफेनिकल, एम्पीसिलिन ।
- शरीरमा पानीको कमी भएमा डेक्स्टोज सलाइन, इलेक्ट्रोलाइट ।
- ननसेसिफिक प्रकारको Dysentery भएमा नेबलोन, डायरोक, डायडिस्को ।

पखाला तथा रगतमासीको नियन्त्रण प्रक्रिया:

- सन्तुलित रासनले पशुलाई सधैं स्वस्थ राख्छ र यसको पुर्ति कन्सन्ट्रेट्स हरियो घाँसबाट हुने गर्दछ ।
- पशुलाई सफा पानी खुवाउने व्यवस्था गर्ने ।
- छाडा पशु भन्दा बधुवा पशुपालन गर्नमा जोड दिने । पशुको खो गोठको सरसफाईमा विशेष ध्यान पुर्‍याउने । बिरामी पशुलाई अलग राख्न र पशुहरूलाई आन्तरिक परजिवी र अन्य रोग विरुद्ध समय समयमा लगाउने ।
- पशुहरूको भेटाबोलिक प्रोफाइल र प्रयोगशाला जाँचबाट निदान अनुसारको औषधि उपचार गर्ने ।

**रासायनिक औषधीहरूको प्रयोग
सकेसम्म कम गरौं ।**

५६. छमासे रोग र पी.पी.आर. रोग तथा यसको उपचार विधि

छमासे रोग (Enterotoxaemia)

यो रोग जिवाणुबाट भेडा बाख्राका स-साना पाठापाठीमा बढी देखिन्छ । वयस्क भेडा बाख्रामा पनि यो रोग देखिन्छ तर बढी मात्रामा स-साना पाठापाठीलाई नै सताउने गर्दछ । तीन हप्ताका पाठापाठीलाई लागेमा कुनै लक्षण नदेखाइकन नै मर्न सक्छन् ।

प्रायः गरी यो रोग १ वर्ष भन्दा मुनिका भेडा बाख्रामा देखिन्छ । जिवाणुको विष नै मृत्युको कारण हुन्छ । हरियो घासपात बदलेमा वा धेरै खान दिएमा रोग लाग्न सक्छ ।

रोग सर्ने कारणः जिवाणु युक्त घासपात खाएमा ।

लक्षणहरूः

- स-साना पाठापाठी अचानक लक्षण नदेखाई मर्ने ।
- बथानको पछि पछि हिंड्ने ।
- टाउको पिठ्यतिर फर्काइ रहने ।
- धरमराएर हिंड्ने, शरीरको मासु कान्मे ।
- खैरो, रातो वा रात भिसिएको दिसा गर्ने ।
- दात किटि रहने, चाल काढ्ने ।
- लक्षण देखाएको २४ घण्टा भित्रै मर्ने ।

उपचारः

- Antibiotics औषधि प्रयोग गर्ने ।
- Inj. Tetracyclin: 3-5 ml, I/M
- Nebion: १०० ग्राम, १५ ग्राम साना जनावरलाई दिनको ५० ग्राम २ पटक, ठूला जनावरलाई ।
- Three Care Bolus- ६ दिनसम्म, स-साना जनावरलाई दिनको २ पटक, ठूला जनावरलाई ।

रोकथामः

- Vaccine को प्रयोग गर्ने ।
- रोगीलाई अलसरी राखी उपचार गर्ने ।
- १ महिनाको फरक पारेर खोप दिने र पछि १/१ वर्षको फरकमा खोप दिने।

पी.पी.आर. (Peste Peptitis Ruminant)

यो विषाणुबाट हुने भेडा बाख्राको अति नै खतरनाक रोग हो । यसलाई रोग बाखाको हैजाको रूपमा नै लिइन्छ । 3D (Diarrhoea, Discharge and Death) यो रोगका प्रमुख लक्षणहरू हुन् ।

लक्षणहरूः

- शुरुको अवस्थामा ज्वरो 106°F - 108°F सम्म रहने ।
- निग्रिङ्ग पर्ने, नाक, मुख सुख्खा हुने ।
- आखा रातो हुने ।
- खाना नखाने ।
- पछि गएर नाकबाट पानी, पिय बगाउने ।
- नाकभित्र घाउ हुने ।
- मुखभित्र जताततै खटिराहरू देखिने ।
- दिसा कालो पातलो गर्ने (खेर्ने) ।
- जल विनियोजन वा शरीरमा पानीको मात्रा घट्ने ।
- शरीरको तापक्रम घट्दै जाने ।
- खोकि लाग्ने, न्युमोनियाको लक्षण देखाउने ।
- ब्याउने पशु तहिने ।
- मृत्युदर बढी देखिने गर्दछ ।

उपचारः लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने । Antibiotics, Nebion, 3 Care Bolus, Electrocare/Normal Saline etc.

रोकथामः भेडा बाख्रालाई २/२ वर्षमा खोप लगाउन जरुरी हुन्छ । P.P. Vaccine-1 ml, S/C.

राष्ट्रिय पी.पी.आर. नियन्त्रण आयोगनाः नेपाल सरकारले पी.पी.आर. रोग हुँदा समस्यालाई महत्त्व दिई राष्ट्रिय पी.पी.आर. नियन्त्रण आयोगना गर्नेछुः

- प्रथम चरणः तराईको २१ जिल्ला
- द्वितीय चरणः मध्यपहाडका २६ जिल्ला
- तेश्रो चरणः उच्चपहाडी ८ जिल्ला
- चौथो चरणः पी.पी.आर. नदेखिएका १६ जिल्ला

Ring Vaccination 3 kilometer area मा ५ हप्ता पछि सितो मोनेटरिङ्ग र Vaccination को प्रभाव परिक्षण गरिन्छ ।

५७. पशुमा लागने लुतो, किर्ना, जुम्मा, उपियां आदिको उपचार तथा नियन्त्रण

परिजिवी: अर्कोको शरीरमा बसी आफूले केही नगरी जसको शरीरमा बस्छन् त्यसैलाई नोक्सान पुर्‍याएर बाच्ने जीवलाई परिजिवी भन्छन् । परिजिवी २ प्रकारका छन् ।

- आन्तरिक परिजिवी: शरीर भित्र बसी पशुहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउने परिजिवीलाई आन्तरिक परिजिवी भनिन्छ । जस्तै: नाम्मे, फित्ते जुका, गोली जुका, अंकुसे जुका, प्यारमफिस्टोमम् आदि ।
- बाह्य परिजिवी: यी परिजिवीहरू शरीरको बाहिर अर्थात् छालामा टसिएर रहेका हुन्छन् । लुतो, किर्ना, जुम्मा, उपियां आदि यसका उदाहरण हुन् ।

लुतो: यो आंखाले नदेखिने किरा (Mites) बाट छालामा हुने रोग हो । Mites छालाको बाहिर र भित्र तथा तैका प्वालहरू आदिमा बस्छन् । यिनले गर्दा पशुको छाला चिलाउछ र पशुले शरीर भित्तामा, काठमा राख्ने गर्दछन् । जसले गर्दा छालामा घाउ हुने, रौ झर्ने भै पशुलाई हैरान नै गराउँदछ । पशुलाई तुल्ने असर नपरे पनि बिस्तारै असर पर्ने हुन्छ । पशुको उत्पादन घटाउने, अन्य प्रकारका रोगहरू निम्त्याउने कार्य गर्दछ ।


किर्ना, जुम्मा, उपियां: यी परिजिवीले लुतोको Mites जस्तै शरीरको बाहिर बसी शरीरको रगत चुस्ने कार्य गरी पशु वस्तुलाई कमजोर तुल्याउने, छाला सम्बन्धि रोगको साथै अन्य रोगहरूलाई निम्त्याउने कार्य गर्दछन् ।

उपचार:

- टेटमासोल साबुनको प्रयोग गरी नुहाइ दिने ।
- Benzol Benzol, Ascabiol Lotion लगाउने ।
- Inj. Ivomec 100 50 Kg of 1ml गर्दा बैसी वा बेडा बाखामा दिने ।
- Pestobion १ भागमा ९ भाग पानी मिसाएर प्रयोग गर्ने ।
- Noix: १ लिटर पानीमा २ एम्.एल्.राखी प्रयोग गर्ने ।
- Kuttox: " " " "
- Buttox: " " " "
- Cutirose: " " " "
- Tab. Dermite: सानो पशुलाई १/१ ट्याब र ठुलो पशुलाई २/२ ट्याब
- Ectoaze: शरीरमा सोझै स्ने गर्ने ।
- घाउ भएको भए Acrilavin ले सफा गरी हिमैक्स वा चर्मल मलहमको प्रयोग गर्ने ।

Rx:

- भेडा बाखालाई Deeping Tank को प्रयोग गर्ने ।
- यसरी किटनाशक विषादीहरू पशुको शरीरको साथै गोठमा पनि छर्किदिनु पर्छ ।
- Mange/Scabies for Dog
- Potassium Permangnet
- Tetmasol Soap
- Himexs: 1 Tube
- Scabiol Lotion
- Inj. Ivomec: 1ml (10 Kg. Body weights).
- Tab. Dermite: 1 Phile (1 tab bid)



विभिन्न बाह्य परजीवीहरू

छोरीलाई जस्तै छोरीलाई पनि पढाऔं ।

५८. डिपिङ गर्ने रसायनहरूको मात्रा मिलाउने तरिका र प्रयोग विधि

पशुको उत्पादन घटाउने मुख्य कारणहरू मध्ये जुलो, उषिया पनि हुन् । यी परजीवीले पशुलाई रोगी बनाउने र रोग सँगै समेत गरी पशुको उत्पादन क्षमता घटाउँछन् । डिपिङ भनेको किटनाशक विष (insecticide) मिसिएको पानीमा पशुलाई डुबाएर पशुको शरीरमा लाग्ने माइद, जुम्रा, किर्ना, उषिया आदि रगत चुस्ने परजीवीहरू मार्ने वा मार्ने काम गर्नु हो । डिपिङको लागि रसायनहरूको मात्रा मिलाउने तरिका र प्रयोग विधि बारे यस पाठमा विस्तृत छलफल गरिएको छ ।

डिपिङ गर्नु पर्ने कारणहरू:

- किर्नाले लहुमते रोग लगाउँछ । किर्ना मार्ने डिपिङ गरिन्छ ।
- किर्ना समेतका अरु परजीवीले चुस्ने हुनाले रगतको कमी भएर पशु मर्दछ ।
- पशुमा धेरै किर्ना, उषिया आदि भएमा पशुलाई अठेटो हुन्छ ।
- परजीवीले रोगी पशुबाट निरोगीमा रोग सार्छ यसबाट बचाउन डिपिङ गरिन्छ ।
- परजीवीहरू निर्मूल पार्ने डिपिङ गरिन्छ ।
- किराले, भिँगाँले टोकनबाट बचाउन र टाँकेको घाउमा औसा पार्ने नदिन डिपिङ गरिन्छ ।

डिपिङ कति पटक गर्नु पर्छ ?

जुम्रा, किर्ना, उषिया, सुलसुले आदिको प्रकोप हेरेर वर्षको तीन पटक भेडालाई डिपिङ गर्नु पर्छ । पहिलो डिपिङ ऊन काट्नु भन्दा पहिला, दोस्रो डिपिङ ऊन काटी सकेपछि र तेस्रो डिपिङ जाडो शुरू हुनु अगाडि गर्नुपर्छ । अरु जानावरलाई चारैपछि डिपिङ गर्नुपर्छ । जस्तै: किर्ना, जुम्रा, उषियाले आति सराउने ठाउँमा एक वर्षमा ५२ पटक अर्थात् हप्ताको एक पटक डिपिङ गर्नुपर्छ ।

हस्तै पिच्छे डिपिङ गरेपछि या औषधी छुपेछि Spray'ing शरीरको कुनै काँचामा फेरी हातले राम्ररी विष लगाएर किर्ना मार्नु समेत परेमा मार्नु पर्दछ । डिपिङ वा स्प्रेड (spraying) गरेपछि हातले औषधी लगाउने भागहरू जस्तै: कानको भित्र, सिंगको फेदका वरिपरि, आँखाको वरिपरि चाक र पुच्छरमा फेदको वरिपरि हातले विष लगाएर परजीवी मार्नु या टिपेर पोल्नु पर्छ । डिपिङमा प्रयोग हुने रसायनहरूको मात्रा:

- साइथिन ०.५ प्रतिशत भोल बनाउने ।
- मालिथियन ०.५ को भोल बनाउने ।
- ग्यामेक्सिन ०.४ को भोल बनाउने ।

BHC ले किर्ना नमरे Arsenic र आर्सेनिकले पनि परजीवी नमरेरे Toxaphene नामक किटनाशक औषधीको भोलमा पशुलाई डुबाउनु पर्छ Gamma BHC भनेको ग्यामेक्सिन हो । ग्यामेक्सिन ०.०१ देखि ०.०३ प्रतिशत भोलमा खुवाउदा पनि लुतो रोग लगाउदा Mite सवै मर्दछन् ।

डिपिङ गर्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरू: ठूलो बथानलाई अलग अलग उपचार गर्नु भन्दा डिपिङ ट्याक Dipping Tank को प्रयोग गर्दा छिटो र सुविधाजनक हुन्छ ।

डिपिङ गर्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरू:

- एक महिना सम्मको गर्भणीलाई डिपिङ गर्दा तुहिने डर हुन्छ, त्यसैले नगर्ने ।
- भेडालाई ऊन काटेको ३ ४ हप्ता पछि डिपिङ गर्ने ।
- पानी पर्छ जस्तो छ भने नगर्ने ।
- डिपिङ गर्नु पहिला प्रशस्त पानी खुवाउने, नत्र विष मिसाएको पानी पिएर मर्छ ।
- हिँडाएर ल्याएको पशुलाई १/२ घण्टा आराम गर्न दिएपछि मात्र डिपिङ गर्नु ।
- घाउ किरा परेको विरामी पशुलाई डिपिङ नगर्ने ।
- डिपिङको लगत्तै चरनमा छाड्नु हुँदैन । छाडेमा शरीरको विष दाँस चरनमा भर्छ । कमसेकम १५ मिनेट जति पानी तर्किन दिनु पर्छ ।
- विष मिसाएको भोल खानेपानी, नाला, पोखरी, कुवा र चरनमा पर्ने भविष्य गरी प्रयोग गर्नु पर्छ ।
- डिपिङको मात्रा आदि राम्रो जान्ने मानिसको रोहवरमा मात्र डिपिङ गर्नु पर्छ ।
- डिपिङ गरेको ३ ४ हप्ता सम्म मासु खान वा ऊन सुक्न वा काट्नु हुँदैन ।

विष चाटेमा के गर्ने ?

आमगर चाट्न नदिने, चाटेमा विष लागेको लक्षण देखिएमा एट्रोपिन Atropine २-४ मि.ग्रा. मासुमा दिने भेडाबाख्राको लागि वा क्याल्सियम ग्लुकोनेट Calcium Borogluconate सुई २००-४०० एम.एल. नशामा दिने गोटा पशुलाई डिपिङ ट्याक बनाउनु पर्दैन । हातले नै विषादी प्रयोग गर्नु हुन्छ ।

५९. घाउ, खटिरा, पिलो आदिमा मलहस पट्टी लगाउने र सिष्टमको पहिचान तथा उपचार

घाउ: कुनै चोटपटक वा अन्य कुनै कारणबाट Soft Tissue का छाला वा अन्य अङ्गहरूमा अवरोध आई वा अविद्यिन्नता ल्याई कुनै प्रक्रियाबाट छुट्याइएमा त्यसलाई घाउ भनिन्छ । घाउ २ प्रकारका हुन्छन् ।

बन्द घाउ (Closed Wound): बन्द घाउले छाला भित्र वा मासुमा भैरहेको सामान्य प्रक्रियामा अवरोध आई छाला भित्रै हुने घाउलाई बन्द घाउ भनिन्छ । यस्तो घाउलाई पाके पछि चिरेर त्यो भित्र रहेको फोहोर चुन, पिप, पानी आदिलाई बाहिर निकालिन्छ । जस्तै: Abscess, Haematoma.

खुला घाउ (Open Wound): यस्तो प्रकारको घाउ छालामा वा मासुमा बाहिर वस्तुहरूको प्रभावबाट भएको हुन्छ । बन्द घाउहरू भन्दा खुला घाउहरू पशुमा बढी मात्रामा देखिन्छ । खुला घाउ हुने माध्यम र यसका प्रकार यी हुन्:

- काँडेदार वा अन्य तारहरूको कोत्राईबाट
- किला, सियो, चक्कु आदिले धोचेर
- सिसा, पत्ति वा धारिलो वस्तुले काटिएमा
- कुनै वस्तु वा घासपातबाट पाछिएमा ।
- बन्दकको गोली लागेमा ।
- पशु एक आपसमा लड्ने सिङ्गले धोचेमा ।
- अन्य पशुको टोकाइबाट ।

घाउका लक्षणहरू:

- पशुहरू हिडहुल गर्ने गाह्रो मान्ने ।
- छाला वा मासु सहित पाच्छीनु ।
- रगत बगिरहनु वा रगत लागेको हुनु ।
- खुट्टामा घाउ भए लगाइएर हिड्नु ।
- मुखमा घाउ भए घास खान नसक्नु ।
- भिसाबबाट रगत वा पिप आउनु ।
- काम गर्न क्षमता घट्नु ।
- उत्पादनमा कमी आउनु ।
- छालामा सुनिएको देखिनु ।

उपचार

बन्द खालको घाउ भए पाके नपाकेको पत्ता लगाउने:

- हातले छामेर नरम वा साह्रो,
- हेरेर त्यहाँको रङ्ग रातो वा अन्य,

- निडिलले घाउमा धोचेर हेर्दा पाकेको भए पिप आउने र नपाकेको वा पानी आउँछ ।

घाउलाई पकाउने:

- Boric Acid वा नुन पानीले सेक्ने ।
- Magnesium Sulphate ले सेक्ने ।

पाकेको भए चिर्ने गर्नु पर्छ । यसका लागि आवश्यक औजार एवं औ

BP Blade ३, ४ No. को:

- Dressing Forceps (चिम्टी)
- Artery Forceps
- Scissors (कैंची)
- Duscane पाइप सितको, Nylon को धागो, Syringe, Suturing Needle, (

Acridavin (पहेलो झोल):

- Mercururo Chloride (रातो झोल)
- Gentian Violet (निलो झोल)
- Spirit (सिरिट) (छाला वा औजार सफा गर्ने)
- Povidon, Tr. Iodine, Tr. Benzene.
- Potassium
- Potassium Permanganet, Turpentine Oil, Himax, Herwex, Charcoal, Hesp

Antibiotics:

- Inj. PPF
- Inj. Dicystacin
- Inj. Xyllocane
- Inj. Novocane.
- Inj. Bestopen

सिस्ट (फनफने): यो फित्ते जुकाको लार्वा (Larva) ले मगज वा पानीको झैलो (Cyst) बनाएर रोग लाग्दछ । यस रोगमा पशु एकोहोले ढुँदा फनफने (Grind) पनि भनिन्छ ।

सन्ध्याहरू: यो गाई भैसी भन्दा भेडा बाखामा बढी देखिन्छ । पशु टाउको बटारेर घुम्ने, छटपटाउने, टाउको काठमाथि राख्ने वा भित्तामा वा काठमा ठोक्ने, टाउको पछाडितिर लैजाने, सिङ्गभित्र पट्टीकेले धिच्चा अलि धिचिने हुन्छ ।

भियन्त्रण तथा रोकथाम:

- भेडा बाखा काट्दा मासुमा देखिएका पानीका फोकाहरू कुकुर, बिरालोलाई खान नदिएर
- कुकुरलाई ४/४ महिनामा फित्ते जुकाको औषधि खुवाई राख्ने ।
- भेडा बाखाको निदीमा त्यस्तो पानीको फोका देखिए उक्त मासु नखानेने
- भेडा बाखालाई वर्षमा २ पटक फित्ते जुकाको औषधि खुवाई राख्ने ।
- व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने ।

उपचार: शल्यक्रिया मात्र यसको उपचार विधि हो ।

६०. विभिन्न प्रकारका ज्वरो तथा तिनको उपचार

गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा वा चराचुराही र मानिस समेतको शरीर तातो हुन्छ । त्यस्तो तातोलाई साधारण तापक्रम भनिन्छ । यस्तो तापक्रम गाई र भैसीमा १०२°F, कुखुरामा १०७°F तथा मानिसमा ९८.४°F हुन्छ । हिउँदा, काम गर्दा, डराउँदा वा अन्य कुनै अवस्था परेमा अलिकति तापक्रम बढ्न सक्छ, यस्तो तापक्रमलाई ज्वरो भनिदैन ।

हानिकारक किटाणुहरू र यस्तै विभिन्न कारणहरूले गर्दा शरीरको तापक्रम बढेमा त्यसलाई ज्वरो आएको भनिन्छ । त्यस्तै चोटपटक लागेर वा अन्य कुनै बिरामी भएर तापक्रम बढ्छ भने पनि ज्वरो भनिन्छ ।

ज्वरोका प्रकार:

- विषाणुको कारणबाट आएको ज्वरो: भ्यागुते, चरचरे, टाइफाइड आदि।
- विषाणुको कारणबाट आएको ज्वरो: बोटेट, साउने वा तीन दिन आदि।
- ब्रूटबालिक गडबडीको कारणबाट आएको ज्वरो: सर्दि, किटोसिस आदि ।
- खन्य कारणबाट आएको ज्वरो: चोटपटक लागेर, किराले टोकेर, खानाको ब्रूडबडी, मौसमको कारण ।

ज्वरोका लक्षणहरू:

- पशुले घाँसपात खान छोड्छ, पशुको थुत्तुनो सुख्खा हुन्छ ।
- पशुले छिटो छिटो सास फेर्छ ।
- मुख उलगाउन घट्छ ।
- पशुको शरीरमा पानीको कमी हुन आउँछ ।
- पशुको पिसाब पहिलो देखिन्छ ।
- धेरै ज्वरो आएमा गर्भिणी पशु तहिन सक्छ ।
- पशुको शरीर कान्छो हुन्छ, रौं ठाडा देखिन्छन् ।

ज्वरोको उपचार:

- विषाणुको कारणबाट आएको ज्वरोको खास उपचार छैन, तापनि ज्वरो कागर्न घरायसीटामोल Molicin औषधिको प्रयोग गर्ने ।
- बिरूवाणुको संक्रमण तथा अन्य कारणबाट आएको ज्वरोको लागि सर्वप्रथम ज्वरो कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्ने । त्यसको अलावा निम्न औषधिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- होक्नेन पेनिसिलिन: गाई, भैसीमा ४० लाख, घोडासा ३० लाख, बंगुरमा १० लाख तथा भेडा, बाख्रा आदिमा ४ लाख युनिटसम्म इन्जेक्शन दिने ।

- टेटागहिन इन्जेक्शन: गाई, भैसीमा १५-२० एम.एल. तथा सानो पशुहरूमा ५-१० एम.एल. समय दिन सकिन्छ ।
- सरुवाडिमाइडिन: सानो पशुहरूमा १०० एम.जी. प्रति के.जी. शारीरिक तौल अनुसार खुवाउने ।
- यस बाहेक फिब्रन पाउडर, हर्विन, क्याप्सुल तथा अन्य औषधिहरू औषधिकै बजा बहिर लेखिएको निर्देशन अनुसार खुवाउन सकिन्छ । धेरै ज्वरो आएको भएमा बेरो भिनाएर पशुको शरीरलाई ढान्नाले पशुलाई केही आराम हुन्छ ।



ज्वरो धेरै आएमा उपचार

ज्वरोको उपचार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

ज्वरो निरुद्धको औषधि ३ देखि ५ दिनसम्म लगातार दिनु पर्दछ । उपचार गर्ने काम गोसा वा घट्टाएमा उपचारले काम नगर्ने हुन सक्छ । जसले गर्दा ज्वरो फेरि उल्टिन सक्ने हुन्छ । यसरी ज्वरो फेरि उल्टिएमा त्यसको उपचार बर्झिलो हुन जान्छ, यति मात्र नभई कहिले काहीँ पशु मर्न पनि सक्छ ।

नि जसो अवस्थामा कुनै संक्रामक रोगबाट वा अन्य कुनै कारणबाट आएको ज्वरोमा सोही रोगको कारणको उपचार समेत गर्नु पर्ने हुन्छ । भ्यागुते, चरचरे, बोटेट, पटक आदि जस्ता रोगहरूमा पशुलाई धेरै ज्वरो आउँछ । ज्वरो अवस्थामा यी रोगहरूको उपचारको साथै ज्वरो घटाउने उपाय गर्नु नै प्राथमिक हुन्छ ।

बिरूवा रोपौ र माटो बगनबाट बच्चाऔं ।

६१. खोकी, धम्की तथा निमोनिया रोग

परिचय

पशुहरूमा खोकी लाग्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । जस्तै: फोक्सोमा जुका,जीवाणु, विषाणुको आक्रमण तथा संक्रमणले निमोनिया, ब्रोन्काइटिस आदि हुन्छ । खोकीले गर्दा जनावहरूमा अश्वि हुने हुन्छ । यसले गर्दा पशुहरू बेस्सरी खोक्ने गर्दछन् ।

साथै दमको व्याधा लागेमा हामी धम्की भएको भन्दछौं । पशुहरूको फोक्सोमा विभिन्न प्रकारका गडबढी उत्पन्न भई स्वास प्रस्वास प्रकृयामा कठिनाई हुने रोगलाई निमोनिया भनिन्छ । यो प्रायः गरी अलि ज्यादा जटिल स्वास प्रस्वासको समस्या हो । फोक्सोको टि.वि. र फोक्सोमा पिप वा पानी भरिनाले पनि धम्कीको लक्षण देखा पर्दछ । कम उमेरका पशुहरूलाई यो रोग बढी लाग्छ ।

कारण

पशुहरूमा निमोनिया हुने धेरै कारणहरू हुन सक्छ । जस्तै व्यान्टेरिया, भाइरस, फंगस, परजीवी, रसायनिक एवं भौतिक पदार्थ (चिसो हावापानी) धेरै लामो बाटो हिडाएर ल्याउनाले ।

लक्षण

यस रोगबाट प्रभावित पशुहरूले प्रायः सास फेर्ने कठिनाई भई स्यां स्यां गर्ने, खोक्ने, ज्वरो आउने, नाडीको गति बढ्ने पछि पछि पशु एकदमै घांस नखाने हुन्छ । सास फेर्दा ध्यार ध्यार आवाज आउछ । नाकबाट सिंगान जस्तो पदार्थ निस्की रहन्छ । दात किटकिटाउछ । २-३ हन्तासम्म उपचार नभएमा विरामी पशुको मृत्यु हुन सक्छ । सबै प्रकारको निमोनियालाई भ्यागुते रोग भनी गल्ती गर्नु हुदैन किनकी भ्यागुते केवल एक प्रकारको निमोनिया मात्र हो । उपचार प्रकृयामा केही फरक पर्दैन किनकी दुबैको उपचार भने एकै प्रकारको हुन्छ । तर भ्यागुते हुँदा निमोनियाका लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन् ।

उपचार:

- आईल निमोनियाले आक्रमण गरेपछि उपचार गर्दा त्यति फाइदा हुदैन । तसर्थ रोकथामका उपायहरू अपनाउनु पर्छ । सेकेण्डरी व्यान्टेरियाले आक्रमण रोक्नको लागि स्टेनोपेन्सिलिन वा जेन्टामाइसिस र कोटिकोस्टेरोइड (डेक्सोना आदि) मिसाएर मासुमा सुई दिनु पर्छ ।
- खोकी रोकको लागि क्याफलोन वा कफर्गो पाउडर ठूलो जनावरलाई ३०-४० ग्राम र सानो जनावरलाई १५-२० ग्राम मन्तातो पानी वा खुदोसंग मिसाएर खुवाउने । भेडाबाखालाई १० ग्राम, बगुरलाई १५ ग्राम, पाठापटीलाई ४ ५ ग्राम उपरोक्त अनुसार मिसाएर खुवाउने ।
- पशुलाई एण्टिबायोटिक जस्तै: अक्सिस्टेससकलीन वा टेरासाइसिन सुई गाई, भैसी अहिलाई १०-२० एम.एल. का दरले निको भएपछि पनि ५ दिनसम्म मासुमा सुई लगाउने । सुई नपाएको खण्डमा टेडासाइक्लिन बोलस पनि प्रयोग गर्ने सकिन्छ ।
- एमिल एक्सपेक्टोरान्ट, कोरेक्स कफ सिरप आदि दिनको दुई पटक खुवाउने ।
- परजीवीबाट खोकी लागेको छ भने बोडिस्केटम एन्थेलेमेटिकस औषधीहरू निर्देशित मात्रा अनुसार खुवाउने ।
- धम्की अवस्थामा डेरीफायलीन इन्रोफ्लोक्सासिनको सुई दिने ।
- विरामी जनावरलाई न्यानो,सुख्खा र प्रशस्त हावा लाग्ने ठाउँमा राख्ने ।
- तारपीनको तेल वा टिन्चर बेन्जिनको बाफ नाकबाट सुघ्नु दिने ।
- एमोनियम क्लोराइड १२० ग्राम, एमोनियम बाइकार्बोनेट १२ ग्राम, कपुर ३० ग्राम मिलाएर ४ लि. पानीमा घोलेर ३० एम.एल. दिनको तीन पटकको दरले खुवाउने ।
- रघा खोकी लागेमा नाक घाटीको किलकिले वरिपरि भिक्स अथवा कपुर तेलमा फिटेर लगाउने ।

निरोध:

- निरोधी पशुहरूको संसर्गमा रोगी पशु ल्याउनु हुदैन ।
- गोठको सोतर सोहोरेर जलाइदिनु पर्छ ।
- खोर/गोठ सफा गरी सकेपछि एण्टिसेप्टिक भोल वा चुनपानी छर्कने ।
- मरेका पशुहरू गाडी दिनु पर्छ ।
- जाडो महिनामा पशुलाई भिजनबाट बचाउने, भिजेकोलाई कपडाले पुछिदिने ।
- पशुलाई आभानो, न्यानो र ठिकक हावा खेल्ने ठाउँमा राख्ने ।
- फोहोर, धुलो, धुवाबाट बचाउने ।
- रोगीको तुरन्त उपचार गर्ने ।

६२. लहुमुते तथा तुरतुरे रोग

लहुमुते रोग

यो सबै प्रकारका पशुहरूमा एक कोषिय परजिवीबाट लाग्ने रोग हो । यो रोगबाट प्रभावित पशुहरूमा ज्वरो आउने, दाना पानी नखाने, पिसाब रगत भिसिएको कफि रङ्गको हुने गर्छ । यस रोगमा पशुले रगत पिसाब गरी भएकोले यस रोगलाई लहुमुते रोग भनिन्छ ।

कारण: बेवेसियाओभिस गाई र भैसीमा, बवेसियाओभिस भेडा र बाखामा, बवेसिया इकाई घोडामा, बेवेसिया क्यानिस कुकुरमा ।

रोग सर्ने अवधि: १ देखि २ हप्तामा ।

लक्षण: एककासि ज्वरो आउने, दानापानी नखाने, झोक्राउने, कमजोर हुने, पिसाबमा रगत भिसिएको कफि रङ्गको हुने, शरीरमा रगतको कसि हुने, गुठ घट्ने, श्वास क्रिया तथा नाडीको गती बढ्ने, ब्याउने पशु तृहिनै जान्छ । लक्षणहरू गाई, भैसीमा देखिन्छ । घोडामा रोग सर्ने अवधि २ देखि १० दिन प्रथम दिन १०४०°F सम्म ज्वरो आउने, दोश्रो दिन ज्वरो सामान्य हुने हिंडुल गर्न अठ्यारो मान्ने, पेट दुल्ने, शरीरमा पानी जम्ने, कमल पान रोग हुन सक्ने तथा उपचारको अभावमा ८ देखि १० दिनमा मर्ने सक्छ ।

रोग निदान: रगतो पिसाब गर्ने पशुको पिसाब एउटा सफा टेष्ट ट्युबमा नालि सिसिमा संकलन गरी राख्ने, करीब आधा घण्टा देखि १ घण्टासम्म नहल्लाई राख्ने । सो समयसम्म पिसाबमा कुनै परिवर्तन नभई रगतो वा कफि रङ्गको रह्यो भने त्यो लहुमुते रोग हो भन्ने मान्नु पर्छ । यदि पिसाबमा तल्लो रगतो बस्तु थियीएर बसेको छ र माथि सतहमा सफा देखिन्छ भने पिसाबमा रगत आउने रोग अथवा हिमाच्युरिया वा अन्य रोग हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

उपचार:

- बेरेनिल सबै पशुमा ०.८ देखि १.६ (१.२) चम्चा प्रति १०० किलो गभ शारीरिक तौल अनुसार गहिरो मासुमा सुई लगाउने । छालामुनि पीन दिन सकिन्छ ।
- यो सुईको कहिले काहीँ दुस्त्रभाव पनि पर्न सक्छ । तसर्थ एन्टिपीनिक नु जस्तै Avil पनि लगाउने ।

- पशुको शरीरमा रगत पनि कसि हुने भएकोले इन्फेरेन Iron Inj. 10 मासुमा ३ देखि ४ दिन सम्म लगाउने ।

तुरतुरे रोग

यो पशुहरूमा तिष्ठण र जीर्ण अवस्थामा लाग्ने रोग हो । यो रोग प्रभावित जनावरमा एककासि ज्वरो आउने गर्दछ । यो रोग ट्यापासोनेनोने नामक परजिवीबाट घोडा, भेडा, बाख्रा, कुकुर र गाई, भैसीमा लाग्ने हो । यो रोग सरे पछि देखिने समय (incubation period) ३ हप्ता हुन्छ ।

लक्षण: जनावर झोक्राउने, हिंडुल गर्न अठ्यारो मान्ने, ज्वरो १०३-१०४ सम्म आउने, स्नायु प्रणाली सम्बन्धि जस्तै: चक्कर लगाएर घुम्ने, उत्तेजित हुने, लडीबुडी खेल्ने, शरीरमा कमजोरी हुने, मुर्छा पर्ने, अठ्यारो गरी लिने, पसिना काढ्ने, छिटोछिटो हिसापिसाब गर्ने लक्षणहरू देखिन्छन् । यी लक्षणहरू केही समयसम्मको लागि कसि पनि पानी नखान्छ । दाँत कटकटाउने, धक्के, पछि मुर्छा परी मृत्यु हुन सक्ने हुनाले शोक्राउने, ज्वरोमा उतार चढाव हुने, स्नायु प्रणाली सम्बन्धि लक्षणहरू हेरेर शरीरमा रगतको कसि हुने, शरीरको विभिन्न भाग सुनिने, हिसा पातलो भएमा अन्तमा मर्ने सक्ने हुन्छ ।

रोगको निदान: लक्षण तथा रगत परिक्षणबाट ।

उपचार:

- बेरेनिल सुई लहुमुतेको उपचार सरह मात्रा भिनाएर दिने ।
- एन्टी हिस्टामिनिल सुई 10 ml मासुमा लगाउने ।
- रगतको कसि हुने भएकोले इन्फेरेन वा लिभर एक्स्ट्राक्ट भएको सुई ४ सम्म लगाउने ।

प्रेमन्धपः सदैव गोठ सफा राख्ने ।

६३. खरी, कुम्भी र डेनाला रोग

खरी रोग

यो रोग पहिला दार्जुला जिल्लामा देखा परेको थियो । यो रोग घुलबुले, चौखुरी आदि स्थानीय नामले पनि चिनिन्छ र दुधालु बधुवा भैसीहरूमा जाडो र गर्मी याममा र बेसी क्षेत्रमा भन्दा डाँडाकाँडामा बढी देखिन्छ । यो रोग लागेपछि पशु दुब्लाउँदै जान्छ र उत्पादनमा ह्रास आउँछ ।

रोगका कारण: यो रोग सारकोन्टीक भेज भन्ने परजिवीको कारणबाट लाग्दछ ।

रोगका लक्षणहरू: पशुहरूमा खरी रोग लागेमा तल उल्लेख भए अनुसारको लक्षणहरू देखा पर्दछ:

- भैसीहरूमा छालामा पाप्राहरू देखिने र पछि घाउ हुने, छाला खस्रो र सुख्खा हुने ।
- घास कम खाने, दुध कम दिने र दुब्लाउँदै जाने ।
- लागेो समय पछि हाडहरू बाँझिने र खुर चुर्केको खण्डमा सेतो खरीधुलो झर्ने ।
- कुनैमा सेतो पाप्राहरू झर्छ ।
- खुर पातलो हुँदै जाने र जनावर लङ्गडो हुने तथा थला पर्ने ।
- कुनै जनावर मर्न पनि सक्छ तर रोगले निकै प्रत भएका जनावर पनि घाँस खाने र दुध दिने गर्दछन् ।
- हिउँद लागेपछि देखा पर्ने यो रोग, बर्षा याममा जब पशुहरू हथियो घाँस प्रशस्त मात्रामा खान्छन् तब यसको प्रकोप कम हुन्छ ।

उपचार विधि:

- ईन्जेक्शन आइभरमेक्टिन (Ivermectin Injection) 1ml/50Kg Body Weight S/C.
- यो Injection को साथमा मिनरल मिक्चर पनि खान दिने ।
- भण्डार गरेको खर कम खुवाउने ।
- छालामा Himax, Charan/Ointment लगाउने ।

कुम्भी (बाखाको पक्षघात रोग, सेरीब्रो स्पाइनल नेमाटोडियासिस)

नेपालको मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिम क्षेत्रका राजमार्गहरूसँग जोडिएको ब्रह्मल नजिकका क्षेत्रहरूमा करीब २०४४/४५ साल देखि गर्मीयाम सकिए जाडो शुरु हुने समय खासगरी कार्तिकको अन्तिम हप्तादेखि मंसिर महिना सम्म बाखाहरूमा पछाडिका खुट्टा पक्षघात भई टेक्न वा हिड्डुल गर्न नसक्ने वा आंशिक पक्षघात भै खोच्याए जस्तो गरी हिड्ने हुन्छ । बथानका १२ २० जनावरमा रोग फैलिन सक्छ । समयमा उपचार नभएमा ३ जति मर्दछन् । हाल यो रोग प्रायः नियमित रूपमा बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा देखिन्छ ।

रोग लाग्ने कारण: गाई वस्तुको शरीरमा पाइने सेटेरिया नामक लामखुट्टेको फाइलेरिया प्रजातिको संक्रमणबाट हुन्छ । लामखुट्टेले यो जनावरको शरीरको रगत चुसी बाखालाई पुनः टोक्न पुगेमा यो परजिवीको संक्रमण हुन्छ । बाखाको जीउमा प्रवेश गरेपछि बाखाको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अन्तर्गत परजिवीहरू मेरुपण्डमा प्रवेश गर्दछन् । मेरुपण्डबाट शरीरका विभिन्न भागमा सर्वाहित हुने स्नायु केन्द्रहरूमा क्षति पुर्‍याउँछन् । यसरी यी परजिवीले क्षति पुर्‍याए अनुसार जनावरले लक्षण देखाउँदछ ।

रोगको लक्षण:

- पछाडिको खुट्टा तथा पिठ्ठुको पुर्ण पक्षघात भई टेक्न नसक्ने र पछाडिको खुट्टा घिसाेर हिड्ने ।
- पछाडिको खुट्टा खोच्याए जस्तो गरी टेकेर हिड्ने वा अर्धपक्षघात हुने ।
- शरीरको कुनै एकापट्टिको भाग पुर्ण पक्षघात भई एकापट्टि पल्टेर बस्ने ।
- टाउको एकापट्टि तन्काएर र पछाडिको पिठ्ठु खुट्टा त्यसको विपरीत पट्टि तन्काएर बटारिए जस्तो देखिने ।
- मर्दत गरीहिएमा खानेकुराहरू खाने ।
- रोग लागेको जनावरको राम्रो हेरविचार भएन भने जनावर मर्छ ।
- १ हप्ता पछि आफैँ निको हुन्छ तर केही बिरामी ५-१०% अर्धपक्षघात अवस्थामा रहन्छन् ।

औषधि उपचार: बेमोसाइट ट्याब वा हेट्रजिन १०० mg चक्की दिनको २ पटक ५ दिन, अन्य नदुल्ने सुई र भिटाभिन सुई दिने ।

नियन्त्रण: गाई, भैसीबाट सर्ने हुँदा माथिको औषधि १० दिनसम्म दिने । लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने । बाखामा रोग लाग्न पूर्व माथिको औषधि दिने ।

डेगनाला (Degnala): यो रोग पनि पश्चिम नेपालमा पाइने रोग हो । यो धेरै जसो भैसीमा देखिन्छ तर कहिले काहीँ गाई, गोरुमा पनि देखिन्छ । यो रोग खासगरी जाडो मौसममा जब जनावरहरूलाई हरियो पराल दिइन्छ; त्यस समयमा देखिन्छ ।

रोगको कारण: अतिसन्धान भै राखेको छ ।

रोगको लक्षण:

- खाना नखाने, आँखाबाट चिप्रा आउने, चाल काड्ने, र शरीरको तल्लो भागमा पानी भरिएर सुनिने।
- खुट्टा, कान, जिब्रो र पुच्छर सड्ने तथा सुक्ने हुन्छ ।
- छुर झर्ने हुन्छ ।

उपचार: Injection Vitamin E Care Se 5-10 ml सम्म मासुमा दिने, १ हप्ता पछि दोहोर्‍याउने ।

पटुके रोग: यो रोगलाई एन्थ्रक्स पनि भनिन्छ । यो रोग पशुबाट मानिसमा पनि सर्न सक्ने भएकोले यसलाई जुनेटिक रोग पनि भनिन्छ । यो रोग वेसिलस एन्थ्रेसीस नामक स्पोर बनाउने ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ । यो ब्याक्टेरियाका स्पोरहरू वीसौँ वर्षसम्म पनि जिवीत रहन सक्छन् । यो रोगले माटोमा जिवीत अवस्थामा रहेका जिवाणुबाट घना वर्षा हुँदा माटोबाट वस्तुभाउमा सक्रमण गर्दछ । यो रोग एक पशुबाट अर्को पशुमा सर्दा दुषित खाद्य पदार्थ खाएर वा श्वास प्रश्वास वा छालाको माध्यमबाट जिवाणु शरीर भित्र प्रवेश गर्दछ । यो रोग उन उद्योगमा काम गर्ने मानिसमा लाग्ने भएकोले यसलाई उल सटर डिजिन पनि भनिन्छ । यो रोग मानिसको फोक्सोमा लागेपछि सन्चो नहुने निमोनिया हुन्छ ।

लक्षण: यो रोगको लक्षण संक्रमणको १ देखि २ हप्ता भित्र देखिन्छ । गाई, भैसी, भेडामा लक्षण नदेखिकन एककासि मर्दछन् । पशु शरधर कान्ने, १०६°F ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, मृत्यु पछि नाक, मुख, मलद्वार र योनिबाट छिउँ नजम्ने छैरो रात निस्कन्छ ।

उपचार: एन्टी एन्थ्रेक्स सिरम १०० देखि २५० मिलि लिटर दिन। एन्टीवायोटीकसँग ५ दिनसम्म दिने । पेनिसिलिन १०,००० युनिट प्रति के.जी. तौलका अनुसार दिनको २ पटक ५ दिनसम्म सुई दिने ।

नियन्त्रण तथा रोकथाम: शंकास्पद भई मरेका पशुहरूको सिनो र सोतर नगाडी चुना छर्कने । शंकास्पद भई मरेको पशुको पोष्टमार्टम नगर्ना रोकथामको लागि १ एम.एल. एन्थ्रेक्स स्पोर एटेनुएट भ्याक्सीन छाला दिने ।

गौगोटी रोग

यो विषाणुबाट हुने अत्यधिक डर लाग्दो सरुवा रोग हो । यो रोग भैसी, बाख्रा, बंगुर आदि जनावरमा लाग्दछ । यो रोगमा मृत्यु दर ९०% हुन्छ । नेपालमा यो रोग सन् १९३९ मा काठमाडौँ उपत्यकामा देखा परेको थियो ।

रोगका कारण: यो रोग मोरवली भाईरस नामक विषाणुबाट हुन्छ ।

लक्षणहरू: अचानक देखा पर्छन् । ६ देखि १२ दिन भित्र बथानका व पशुहरूको मृत्यु हुन्छ । २ दिन सम्म १०५°F - १०७°F ज्वरो आउँदा पशुहरू ठटपटाउनु, झाकाउनु, टाउको निहुराएर बसिरहनु, नउघाउनु, मिजाहाउनु, मुखको भित्री छालामा र जिब्रोमा स-साना खटिराहरू देखा पर्छ । नाक, आँखाबाट एक प्रकारको सेतो पदार्थ बाहिर निस्कीरहन्छ । सुटीइ डहाइ हुन्छ । दुब्लाउँदै जान्छ र अस्थीपञ्जर मात्र बाँकी रहन्छ । शरीरको ताप पट्टै जान्छ र अन्तमा मृत्यु हुन्छ ।

रोग सर्ने तरीका: रोगका विषाणुहरू रोगी पशुको रगत, तन्तुहरू र शरीर निस्कने सबै तरल पदार्थहरूमा पाइन्छ । त्यसकारण रोगी र निरोग पशुहरूको बीचमा सिधा सम्पर्क भएमा रोग सर्दछ ।

गौगोटी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम: यो रोगलाई विश्वबाट नै निर्मूल गर्न १९९५ मा कृषि संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व व्यापी गौगोटी उन्मुक्त कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । नेपालमा युरोपेली संघको अनुदान सहयोग १९९५ देखि यो रोग उन्मुक्तताको लागि पशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिबद्ध गरी कार्यन्वयन भई हाल यो रोग नेपालबाट मुक्त भै सकेको छ ।

६४. पशुहरूमा लाग्ने भ्यागुते तथा चरचरे रोग

पशुहरूमा लाग्ने भ्यागुते रोग (Haemorrhagic Septicemia)

यो पशुहरूमा लाग्ने निकै छतरनाक सरवा रोग हो । आँखाले देख्न नसकिने जीवाणुको कारणबाट यो रोग हुन्छ । यो अचानक लाग्ने रोग हो । जनावरबाट बढी काम लिनु, पुरा मात्रामा आँखाला उपलब्ध नगराउनु, एकै ठाउँमा बढी भिड हुने गरी जनावर राख्नु, जनावरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँनु जस्ता Stress का कारण यस रोगका जीवाणुको वृद्धिमा सहायक बन्दछन् । यस रोगका जीवाणु दुषित दाना, पानी, घाँस खाँदा स्वस्थ जनावरलाई सर्दछन् ।

कारण: पास्टुरेला मल्टोसिडा (Pasteurella Multocida).

रोग सन्ने: रोगका जीवाणुबाट दुषित दाना, पानी, घाँस, रोगी पशुको लसपसबाट यो रोग सर्दछ ।

रोगको निदान: रोगको लक्षणको आधारमा पोष्टमार्टम गरेर, प्रयोगशाला परिक्षणबाट यो रोग पत्ता लाग्दछ ।

लक्षण (Symptoms): कुनै जनावर लक्षण नै नदेखाई अकस्मात् फेला पर्दछन् । अन्य जनावरमा १०६°F - १०७°F सम्म ज्वरो आउने, आँखाला नखाँने, च्याल आउने, झोक्राउने घाटी सुन्तीने, बिब्रो बाहिर निकल्ने, साँस फेर्ने गाह्रो हुने, घ्यार-घ्यार आवाज आउने, अलि अलि पेट ढाडिन्छ, पातलो रात एवं म्युकस भिसिएको हिसा गर्दछ । आँखा रातो हुन्छ, प्रायः २४ घण्टाभित्र पशु मर्दछ ।

उपचार (Treatment):

- सल्फाडिमाइडिन ईन्जेक्सन 30mg/50kg शारीरिक तौल अनुसार नशामा दिने वा आधा मात्रा नशामा र आधा मात्रा छालामा दिने, पुनः १२ घण्टा पछि दोहोर्चाई ३ दिनसम्म उपचार गर्ने ।
- अक्सीटेट्रासाइक्लीन ईन्जेक्सन बढी मात्रामा 60-80mg सम्म नशा तथा मासुमा दिई ३ दिनसम्म उपचार गर्ने ।
- ईनरोसीन र मेरीकुईन Injection 1ml per 10 Kg body Weight अनुसार नशा तथा छालामा सुई दिने । यस रोगमा घाटीको सुजन निकै छतरनाक हुने

भएकोले पशुलाई रवात लिन निकै कठीनाई हुन्छ । त्यसैले सुजन हेक्साग, क्युसाइडस, थेटकोर्ट, डेसाथेट, वेटनीसोल जस्ता सुईहरूले सुजन सगाउन सकिन्छ । यदि पशु गम्भीर छ भने यी सुईहरूले पशु तसर्थ गम्भीर पशुलाई जोडीड, डाइक्लोथेट, न्युकिनाक, बुटोजेसिक (15-20ml मासुमा दिनमा २ पटक लगाउने ।

- भ्यागुते रोग रोग परेको ठाउँमा पशुहरूको तापक्रम लिने, सामान्य बढ्दा तापक्रम भएको पशुलाई Inj. 1ml LA शारीरिक तौल अनुसार प्रभावकारी हुन्छ ।

रोकथाम: फागुनको पहिलो हप्ता र कात्तिकको पहिलो हप्ता लगाउने । Dose: (3-5)ml S/C प्रत्येक ६/६ महिनामा भ्याक्सीन लगाउने

चरचरे रोग (Black Quarter)

यो रोग गाई, भैसीको एक क्षिण किसिमको सरवा रोग हो । यो पशु एक्कासी लडाउने, बढी ज्वरो आउने, जाँघ तथा छातीको मासुमस हुने र प्रायः रोग रोग परेको १२ देखि २६ घण्टामा पशुको मृत्यु गरेको पाइन्छ ।

कारण: क्लोस्ट्रिडियम च्याउचवाई (Clostridium Chauvei)

लक्षण: पशुलाई एक्कासी १०६°F ज्वरो आउँछ । झोक्रिने, दानापानी हिँड्छा लडाउने, बिस्तारै जाँघ, खुट्टा, र गर्दनको भाग सुनिँदै सुनिँएको भागमा हातले दबाउँदा करकरको आवाज आउने, शुरुमा तागा देखि हुल्ने गर्छ । केहि घण्टामा सुनिँएको ठाउँमा चिसो र नुनको हुने

रोगको निदान (Diagnosis): शुरुमा अस्थियो भए पनि रोग बढ्दै सुनिँएको भागबाट रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । सुनिँएको ठाउँमा चि कलो गन्हाउने पदार्थ बाहिर आउँछ ।

उपचार: यो रोगको उपचारमा पेनिसिलिनको सुई निकै प्रभावकारी हुने र

- पेनिसिलिनको सुई २०,००० युनिट प्रति किलो शारीरिक तौल अनुसार घण्टाको फरकमा मासुमा दिने । D. Cyp 40, FPP 40-80 Labh Unit मा घण्टाको फरकमा दिने वा डाईक्रिटिसिन, मिप्रापेन (Large dose) १ - 15ml D/W मा घोली मासुमा १२ घण्टाको फरकमा ३ दिनसम्म दिने ।

- सुनिष्को भागमा चिरेर कुहिएको भाग हटाई डेस्ट्रुज सलाइन 20 100ml I/V दिने । साथमा FPP ८० लाख युनिट मासुमा ३ दिनसम्म दिने । चिरेको ठाउँमा हाइड्रोजन पेरोक्साइडले सफा गरी एन्टीसेप्टिक मलहम जस्तै: नाईट्रोयुराजोन, न्युरासिन आदि लगाउने ।
- पेनसिलिन सुईको साथमा सुजन कम गर्न जस्तै: डेसामेट, भेटकोर्ट, क्याराडेक्स आदि दिन सकिन्छ ।

नग खोरेत रोग बारे जानकारी (Foot and Mouth Disease)

पशुपालन व्यवसायलाई हानी पुऱ्याउने एउटा प्रमुख रोग खोरेत (F.M.D.) हो । यो बढी उत्पादनीशिल पशु (उन्नत, स्थानीय गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बगु, हात्ती) मा समेत यो रोग लागेको देखा परेको छ । प्रायः गरी खोरेत हुँ फाटेका जनावरहरूलाई लाग्दछ । खोरेत आर्थिक दृष्टिकोणले अति नै महत्वपूर्ण रोग हो । हाथो जस्तो कृषि व्यवसायमा खनजोत, ग्रामिण यात्रायातको लागि पशुमा निर्भर रहने परम्परा रही आएको मुलुकमा खोरेतको काण हुने हानी नोक्सानीको विशेष महत्व छ ।

खोरेत लागेमा आधाजसो बाच्छा बाच्छी, पाडा पाडी, पाठा पाठी मर्ने गर्छन् । उन्नत जातका वयस्क गाई, भैसीको दूध उत्पादन ६०% ले घट्छ । दुधालु गाई, भैसीमा खोरेतको कारण शुनेलो भएमा मेहनत गरेर दानपानी खुवाएर पाल्नुको कुनै अर्थ रहदैन । वर्षातको समयमा गोह, रागोमा खोरेत रोग लाग्दा खोच्याएर हिँड्ने, छुर पार्ने भएकोले जोत्ने काम हुन नसक्दा खेतीपातीको काम ठप्प हुन्छ ।

खोरेत रोगका लक्षणहरू:

- शुरु शुरुमा पशुले घासपात, दानापानी खान छोडेर झोक्याएर बस्छ
- उग्रान छोड्छ ।
- दूध दिने पशु गाई, भैसीले अचानक दूध दिन छोड्छ ।
- खोरेत रोग लागेको पशुलाई कडा ज्वरो (१०६°F सम्म) आउँछ ।
- चाल काड्न शुरु गर्छ र मुखबाट चाल चुहिन्छ ।
- मुख भित्र गिजा, जिब्रो तथा शुतुनो वरिपरि स-साना पानीले भरिएका फोका देखिन थाल्छन् ।
- मुखमा भएका स-साना फोकाहरू फुटेर छाला उन्की हल्का रातो रङको आलो घाउ देखिन्छ ।
- मुखबाट बाक्लो, लस्सादार चाल चुही नै रहन्छ ।

- रोगी पशुको नरम छाला भएको भाग जस्तै: छुरको काण, छुरको छान जोडिएको भाग, कल्चौडा र शुनमा समेत फोका र घाउ देखिन्छ ।
- छुट्टा सुनिने, खोच्याउने गर्दछ ।
- बाच्छा बाच्छी र पाडा पाडीमा भने मुटुको मांशपेशीमा खोरेत विषाणु आक्रमण गर्ने हुँदा माथि उल्लेखित लक्षण नदेखाई अचानक मर्न सक्दछन् ।
- व्याउने गाई, भैसी तुहिन्छन् ।
- बंगुरमा खोरेत रोग लागेमा कडा ज्वरो आउने, नखाने, गिजा वरिपरि पानीको फोका देखा पर्ने, छुट्टा वरपर फोका आउने, घाउ हुने, छुर झर्ने आलो घाउ देखिन सक्छ, खोच्याएर हिँड्छ । खोरेत रोग लागे पछि हु पार्ने, औँला पर्ने स्थिति वर्षा याममा आइपर्छ ।

खोरेत रोगका विषाणुहरू सात प्रकारका छन्:

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| • A | • O | • C |
| • Sat I | • Sat II | • Sat III |
| • Asia I | | |

पहिचान: रोगी जनावरको गिजा, जिब्रो वरिपरि पात्राको रुपमा निस्कने छाल (Vesicular epithelium) वा छुर वरिपरि देखा पर्ने फोका सहितको छाल प्रयोगशालामा फोस्फेट बफर सलाइन युक्त स्याम्पल किटमा राखी पठाएमा F.M.D. Virus पत्ता लगाउन सक्छ । यसरी स्याम्पल लिनको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सहयोग चाहिन्छ ।

उपचार: खोरेत लागेको जनावरको खासै उपचार त छैन तर रोगको लक्षणको आधारमा बिरामी जनावरलाई राहत दिन घाउ, खटिरा समयमा निको पार्न र रोगको कारण हुन सक्ने अन्य संक्रमण (Secondary Infection) हुन नदिन औषधि उपचार गरिन्छ । ज्वरो घटाउन Antibiotics, दुखाई कम गर्न Analgesic, रोगको क्षमता बढाउन र घाउ खटिरा सुकाउन सुई भेटेरीनरी शुगरको सल्लाह बमोजिम दिने । साधारण स्थितिमा मुख, जिब्रो, वरिपरिको ण्ड, खटिरा निको पार्न फिटकीरी, बोरेक्स मिश्रित पानीले सफा गरिदिने । वरपरको घाउ निको पार्ने, किरा पर्न नदिन, झिझा भन्कन नदिन फिनेल, फाटिनको तेल वा Himex Ointment लगाउनु पर्दछ ।

1) कयाम तथा नियन्त्रण: खोरेत रोग नियन्त्रण गर्नका लागि जति सक्दा चाडो पशुमा रोगले छोएको फार्म, गोठ, वा इलाका पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । गर्भ कृषक, कृषक समूह, सामाजिक कार्यकर्ता तथा ग्रामिण अनुवा कृषकले

नजिकको पशु सेवा केन्द्र वा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई तुरुन्तै खबर गर्नु पर्दछ । वास्तविक अर्थमा रोग नियन्त्रण गर्ने हो भने सामुहिक चरन बन्द गर्ने, रोग ग्रस्त क्षेत्रबाट अन्यत्र र अन्यत्रबाट रोग ग्रस्त क्षेत्रमा पशु तथा मानिसको आवत जावत बन्द गर्ने । स्वस्थ गाई वस्तुलाई यथासक्य चाँडो खोरेत विरुद्ध खोप लगाउने ।

नजिकको गाउँ विकास समितिहरूलाई खोरेत रोगको सम्भावित प्रकोपबाट आफ्ना वस्तु भाउलाई जोगाउन खोप लगाउने सल्लाह दिनु अति आवश्यक हुन्छ ।

रोगी जनावर भएका ठाउँमा गोठ वरिपरि फिनेल छर्कने र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन सकेमा रोग नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पर्दछ । रोगी जनावरको दूध राखरी उमालेर मात्र आफु वा बाच्छा बाच्छीलाई प्रयोग गर्ने तर कर्को दूध अन्यत्र नलैजाने ।

पशुको आवतजावत, दूधित हावा, घाँसपात, दानापानी वा पशु जन्य पदार्थको माध्यमबाट यो रोग चाँडो ठूलो ठाउँमा फैलिन्छ ।

खोपको प्रयोग:

- ठूलो जनावरलाई 5ml S/C.
- सानो जनावरलाई 3ml S/C
- प्रत्येक ६ महिनामा खोप दितु पर्दछ ।

संचय: खोप (F.M.D. Vaccine) फ्रिजको तल्लो भागमा (2-8)°C तापक्रममा राख्नु पर्दछ । Vaccine लाई सूर्यको प्रकाशमा कहिल्यै पनि राख्नु हुदैन ।

पशु पन्थीलाई प्रशस्त पानी खुवाउनु पर्छ ।

३५. साउने तथा खुर कुहिले रोग

साउने रोग (Ephemeral Fever)

यो एउटा छुवाछुतबाट नसर्ने (Non-Contagious) भाइरसको कारणबाट गाईको रोग (Acute) रोग हो । यसलाई तीन दिने रोग (Three Day Sickness) पनि भनिन्छ । यो ज्यादा जसो वर्षा याममा देखिन्छ । किराटारा फैलिएर सर्ने रोग हो । यस रोगबाट पशु मर्दैन र धेरैजसो पशु कुनै उपचार बिना आफैँ निको हुने गर्दछन् । तर अन्य बिबाणुबाट संक्रमण भएमा समयमा उपचार हुन नसके मात्र पशुको मृत्यु हुन सक्छ ।

संज्ञा: एककसि ज्वरो ज्यादा भएको देखिन्छ । खुट्टाको मांसपेशी कट्याइथि लहडो भई हिड्ने गर्दछ र एउटा खुट्टाबाट अर्को खुट्टामा सर्ने जान्छ पशुलाई अरुची भएर जान्छ । लिम्फ नोड्स सुलिएको हुन्छ, श्वास प्रश्वास कठिनार्थ पर्दछ । दूध पानी जस्तो हुन जान्छ । कहिले काहीँ रगत मिसिएर हुन जान्छ । यो रोग ३/४ दिनमा आफैँ ठिक भएर जान्छ तर बिबाणु संक्रमण हुन गएमा निमोनिया हुन जान्छ ।

उपचार: ज्वरो तथा लहडोपन निको पार्न एनाल्जेसिक औषधिमा डाइक्लोफेनिसिलिन ईन्जेक्सन वा बोलेस दिन सकिन्छ । थप बिबाणु संक्रमण हुन नदिन एन्टीबायोटिक औषधिमा लहड एकट्टि ट्रेट्रासाइक्लीन अथवा स्ट्रेप्टोसेनिसिलिन Dicristicim डाइक्रिसिसिन ईन्जेक्सन) दिन पर्दछ ।

रोकथाम: विरामी पशुलाई जति सक्थो टाढा, अलग राखी उपचार गर्नु पर्दछ रोकाथामको लागि कुनै खोपको व्यवस्था छैन ।

खुर कुहिले (Foot Rot)

खुर कुहिले रोग एउटा गम्भीर किसिमको संक्रामक रोग हो जसले भे गालाको छुरमा असर गर्दछ । यसले कहिले काहीँ गाई, बैसीलाई पनि अ गर्दछ । यो Sph. necrophorus ब्याक्टेरियाले असर गरी हुने रोग हो ।

संज्ञा: लहडोपन ज्यादै गम्भीर हुन सक्ने हुँदा पशु उठ्न पनि चाहिँदैन यसले गर्दा अवस्था खराब हुन गई वचन पनि कम भएर जान्छ । खुट्टा भापमा हुने ज्वलन (Inflammation) ले खुट्टामा घाउ भै प्रायः जसो फुक्का

छुट्टिन जान्छ । तन्हुहरू कुहिएर पिप हुन जान्छ र यसबाट नराम्रो दुर्गन्ध आउने हुन्छ ।

उपचार: राम्रो सँग खुर काटेर घाउ सफा गरि दिने । खुला घाउ छ भने घाउलाई किटाणु नाशक तरलमा चोपेको कपासले प्याक गरि दिला राम्रो हुन्छ । कडा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न एन्टीबायोटिक ईन्जेक्सन दिनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा Penicillin र Streptomycin ईन्जेक्सन लगाउँदा राम्रो हुन्छ । खुरलाई ५% कपर सल्फेटको झोलले धोई दिएमा पनि राम्रो असर हुन्छ । Metranidazole ईन्जेक्सन पनि लगाउन सकिन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- बथानलाई नै १०% Formalin को झोल भएको Foot Bath बाट हिंडाउनु पर्दछ ।
- पाकेको खुर भएको पशुलाई सुख्खा ठाउँमा राख्नु पर्दछ ।
- नियमित किसिमबाट खुर काट्ने गानलि पनि रोकथाम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

हाम्रा कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूको सहभागिता बढाऔं ।

६६: पशुहरूका आन्तरिक परजीवीहरू (गोलो जुका र फित्ते जुका) र जानकारी तथा उपचार

परजिवी आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका छन् ।

आन्तरिक परजिवी: यो एक कोषिय प्रोटोजोआ देखि बहुकोषिय विभिन्न जुव हुन सक्छन् । आन्तरिक परजिवी बाह्य वातावरणमा केही समय व्यतीत पशुको शरीरमा विभिन्न माध्यमहरूबाट सर्ने भएकाले बाह्य वातावरणमस पिनको नियन्त्रण गर्न सके सबैभन्दा राम्रो हुनेछ ।

गोलो जुका: यी जुकाहरू नाम जस्तै गोलो र लामो हुन्छन् । ठूला ख जुका गड्यौला जत्रा र साना खालका जुका सौ जस्तै मसिना समेत हुन्छन् यी जुकाहरूले शरीरमा रगत एवं शारीरिक रसहरू चुसी आफ्नो निर्वह गर्छन् । त्यसैले दूध खाने पशुहरूको मृत्यु समेत हुन सक्छ । ठूलो पशुमा उत्पादकत्व घटाउनुको साथै प्रतिरोधात्मक शक्ति समेतमा गर्दछन् । यसले गर्दा विषाणु तथा जिवाणुले आक्रमण गरी रोगी बनाउँदछ:

- ठूलो गोलो जुका (Ascaris): यो जुका पशुको सानो आन्द्रामा बसी रगत शारीरिक रसहरू चुप्ने काम गर्दछ । गाई भैसीमा Toxocara Vitulic घोडामा Parascaris Equorum, बङ्गरमा Ascaris, कुखुरामा Ascariidia Galli न जुकाहरू हुन्छन् ।
- सानो गोलो जुका: यी जुकाहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् । कुनै सानो आन कुनै ठूलो आन्द्रा, भुडी त कुनै श्वासप्रश्वास अङ्गमा पाइन्छन् । अंकुसे (hook worm) सानो आन्द्रामा रहन्छन् ।


संक्षणहरू:

- पाचन प्रणालीका अङ्गहरूमा क्षति पुग्ने ।
- गोबर कहिले पातलो वा सारो हुने
- पेट फुल्ने, कराउने ।
- कहिले काहीँ दिसागा रगत देखिने, प्रायः कालो रङ्गको दिसा हुने ।
- सौ ठा-ठाडा पर्ने ।
- बान्ता हुने, बान्ता वा दिसामा जुका देखिने ।
- रक्त अल्पता देखिने ।
- पशु लमसार गरेर पल्टिने ,
- पशुले खोक्ने ।

रोग निदान: पशुको गोबर परिक्षण गरेर जुकाको फुलहरूबाट कुन जुका छ, सो पत्ता लाग्दछ ।

उपचार: प्रिमाजिन ४५%, पानाकुर, अलवेन्डाजोल, Valbazene, Albendazole, Panfungual आदि औषधिहरूको प्रयोगबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।

फित्ते जुका (Tapeworm): यो जुका हेर्दा च्याप्टो फित्ता जस्तो देखिने भएकाले यसलाई फित्ते जुका भनिन्छ । यसको टाउको सानो र पछाडिको भाग ठूलो चारपाटे हुन्छ । खण्ड खण्ड परेको हुन्छ र यसमा भाले तथा पोथी प्रजनन अङ्गहरू हुन्छन् । हजारौं खण्डहरू प्रत्येक अण्डमा अटाइरहेका हुन्छन् । यसरी प्रत्येक खण्डबाट निस्केका फुलहरूलाई विकसित हुन आश्रयकर्ता (Intermediate Host) को आवश्यकता पर्दछ ।



मानिस र पशुबिच सर्ने विभिन्न छ प्रकारका फित्ते जुकाहरू

लक्षणहरू:

- गोली जुकाको जस्तै छेर्ने, दुब्लाउने, कमजोर हुने ।
- दिसामा भातका सिला जस्तै वा बार्फाको बिया जस्तो खण्ड खण्ड देखिने ।

रोग निदान: गोबर जाँचबाट रोग निदान हुन्छ ।

उपचार: उपचारका लागि औषधिहरू यी हुन्:

- Praziquantel (Albendazole 300mg, Praziquantel 50mg).
- Niclosamide 200mg/Kg body weight.

- Fenbendazole 5-10 mg/Kg body weight.
- Albendazole 7.5mg/Kg body weight.
- Pyrantel Pamoate 13.2mg/Kg body weight.
- Zenil.

नाम्ले रोग, रोकथाम तथा उपचार

नाम्ले (Liver Fluke) लाई माटे, लेउ, सिम आदि पनि भनिन्छ । पशुमा लाग्ने आन्तरिक परजीवीहरू नेमाटोड, सिस्टोड र ट्रेमाटोड मध्ये यो ट्रेमाटोड ग्रुपमा पर्ने Fasciola Hepatica or Fasciola Gigantica बाट लाग्दछ ।

रोगका कारक तत्वहरू (इपिडिमियोलोजी): नाम्लेको असर नेपालका गाई, भैँस आदिमा (60-70)% सम्म भएको देखिन्छ । यो रोग तराई, पहाड सबै ठाउँसम्म फैलिरहेको देखिन्छ । यो रोग तराई, पहाड, बाखामा यसको अग्रगण्य रोग नै देखिन्छ ।

- नेपालमा नाम्लेको मुख्य कारण नदी नालाको सिंचित स्थानहरूमा चरन एवं भिजेको पराल खुवाउनु नै मुख्य मानीन्छ ।
- यो रोगको बढी असर वर्षा पश्चात् खास गरी जेठ देखि मंसिर सम्म बढ्ता देखिने भए तापनि वर्ष भरि नै पशुलाई असर भएको देख्न सकिन्छ ।
- यो रोगबाट पशुमा दूध उत्पादन, मासु उत्पादन र जोत्न सम्बन्धी क्षमता ठूलो हानि भएको देखिन्छ ।
- यो रोग भेडा, बाख्रा, गाई, भैँसी र बंगुरालाई आक्रमण गर्दछ । हालसम्म एकमुटु रुपमा फैलिएको यो रोगबाट बाख्राहरूमा आउट बेक भई उदर अंगुलीमा निकै बाख्राहरू मृत्यु भएको देखिन्छ ।
- हरियो सागपातबाट यो रोग लाग्न सक्दछ । पराल, घाँसपात र पानीबाट यो रोग सर्दछ ।

लक्षण:

- दूध घटाउने, पानी कम खाने गर्छ ।
- दिसा थुलमा साह्रो (कब्जियत) भए पनि पछि छेर्ने गर्दछ ।
- रोगी पशु दुब्लाउँदै जाने र निश्चिर परेको हुन्छ ।
- माटो खाने वा चाट्ने गर्छ ।
- गाई वस्तु सुख्खा चिन खान मन पराउँछ ।

- पखाला लागेको पशुहरूमा आन्द्राकै भाग हिसामा आउँछ र वेस्सरी गन्ताउँछ ।
- पोष्टमार्टममा कलेजोमा नाम्से देखिने र कलेजो छिथोछिथो परेको हुन्छ ।

परजीवीको निदान: गोबर जाँच (सेडिमेन्टेशन) तरीकाबाट छुट्याउने ।


उपचार:

- अक्सीक्लोजानाइड ट्याबलेट १ ग्राम १०० किलो ग्राम तौल । (डिल्टिडिन बोलस, हैक्सानाइड) । टोलजान, निलजान, जेनिल आदि झोल ६० - ९० एम.एल. माड वा पानीमा मिसाई खुवाउने ।
- रिफेक्सोनाइड (एमफानाईड) १० ग्राम थुलो ८० एम.एल. पानीमा मिसाएर गार्ड, बैसीलाई खुवाउने ।
- एल्वेण्डाजोल (अल्बीडोल, भल्वाजीन) बोलस/झोल १०० - २०० एम.एल., १० मि.ग्रा./के.जी. शारीरिक तौलको हिसाबले खुवाउने ।
- ट्राइक्लोवेण्डाजोल (भान् फोसिनेक्स) भेडा, बाखामा सरदर १० मि.ग्रा. के.जि. भए पनि बैसीमा असर छैन ।
- कुनै पनि औषधि खुवाउन अगावै १% २०० एम.एल. Copper Sulphate (निलोतुथो) खुवाउनु राम्रो र २४ घण्टा भोको पेटमा खुवाउनु झनै राम्रो हुन्छ ।
- लिभर टोनिक खुवाउने ।

रोकथाम:

- प्रत्येक ६ महिनामा माटे विरुद्ध औषधि खुवाउने ।
- पोखरी, नदी नाला, चरन क्षेत्रको छेउछाउमा ९ के.जि. प्रति हेक्टर निलोतुथो छरेर शंख किरा उन्मुलन गर्ने ।
- कलेजोलाई पूर्ववत् ल्याउन लिथोल ५० ग्राम दैनिक एक हप्ता सम्म खुवाउने ।
- नाम्से रोग निदानका लागि गोबर जाँच गार्ड गार्ड औषधि खुवाएको ११ दिन पछि पुनः गोबर जाँचार्ड Positive देखिएमा पुनः औषधि खुवाउन सकिन्छ ।
- नाम्से जुका मुख्यतया परालबाट सार्ने भएकोले र त्यो पनि चिस्यान भाग रहेको पराललाई धानको बोट काट्दा एक बिना भन्दा माथिबाट काटी पराल खुवाएमा मेटासर्किरिया टाँसिएको हुँदैन र पशुलाई नाम्से नलाग्ने हुन सक्छ ।

नाम्से किराको जीवन चक्र



६७. मानिस र पशु एक आपसमा सार्ने रोग तथा रोकथामका उपायहरू

पशुबाट मानिसमा सार्ने रोगलाई जुनोतिक रोग भनिन्छ । पशुपंक्षीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, पशुजन्य पदार्थको सेवन तथा अन्य माध्यमबाट जुनोतिक रोगहरू मानिसमा सर्दछ ।

हाम्रो देशको परिस्थितिमा रेबिज, बुसेलोसिस, एन्थ्रक्स, बोभाइन, ट्युबरकुलोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, जापानीज इन्सुफिलाइटिस जस्ता रोगको जुनोतिक हिसाबले विशेष महत्त्व छ ।

ब्याक्टिरियल रोगहरू

एन्थ्रक्स: बेसिलस एन्थ्रासिसबाट सार्ने यो ब्याक्टिरियल रोग विश्वभरि नै फैलिएको एवं मानिसमा यो बुल सरटर डिजिन (Wool Sorter Disease) को रूपमा चिनिन्छ । यो मानिसमा छाला, श्वास वा खानेकुराबाट सर्छ । स्पोर बनाउने भएकोले लामो समयसम्म माटोमा रहिरहन्छ ।

बुसेलोसिस: बुसेला एबोरेटस, बुसेला मेलेन्टीस, आदिबाट सार्ने यो रोग प्रत्यक्ष सम्पर्क र दूध जस्ता पदार्थबाट समेत सर्दछ । पशुमा यो रोगले तुहिने हुँदा महिलामा तुहिने र पुरुषमा अण्डकोष सुनिने र बाँझोपन आउने गर्दछ ।

लेप्टोस्पाइरोसिस: लेप्टोस्पाइराबाट सार्ने प्रत्यक्ष सम्पर्क, पिसाब वा अन्य दुषित सक्रिय पदार्थबाट मानिसमा सर्दा तुहिने हुन्छ ।

साल्मोनेलोसिस: साल्मोनेलाबाट सार्ने रोग जुनसुकै पशुबाट मानिसमा सर्दछ । खासगरी फुड प्वाइजनिङ्ग, टाइफाइड गराउने यो रोग काँचो खाद्य पदार्थ खानाले वा दुषित पानी पिउनाले सर्दछ ।

टेटानस: क्लस्ट्रिडियम टेटानीबाट सार्ने यो रोग घाउको इन्फेक्शन भई दुषित फोहोरबाट सर्दछ र मानिसको मृत्यु समेत हुने गर्दछ ।

ट्युबरकुलोसिस: माइकोब्याक्टिरिया बोभिसबाट सार्ने यो रोग दुषित पदार्थ खाएमा वा श्वास प्रश्वासबाट मानिसमा सर्दछ । मानिसमा भएको यो ट्युबरकुलोसिस पशुलाई समेत सर्दछ ।

फंगल रोगहरू

दाद (रिङ्गवर्म): माइक्रोस्पोरम र ट्राइकोफाइटोन जस्ता, दुसी (फंगल) बा यो रोग मानिसमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा अन्य प्रयोगमा ल्याइएको सा सम्पर्कमा आएमा दाद लाग्दछ ।

परिजीवीबाट लाग्ने रोगहरू

टोक्सोप्लाज्मोसिस: टोक्सोप्लाज्मा गोनोर्डबाट सार्ने यो रोग काँचो पदार्थ दुषित मासु, दिसा आदिबाट सर्दछ ।

फ्लुक: मानिसमा सार्ने लिभर फ्लुक काँचो माछा, सागपात वा पानीमा सरकेरियाबाट सार्ने सक्दछ ।

फितेजुका: मानिसमा सार्ने फितेजुका मुख्यतय टेनिया समूहको हो र हाड सिष्टले समेत लार्भा स्टेजबाट मानिसमा सिष्ट बनाउँछ । यो काँचो, पाकेको वा कुकुर आदिको दिसाको सम्पर्कमा आए यो रोग सर्दछ ।

भाइरल रोगहरू

काउपक्स: यो भाइरस मानिसमा प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट लाग्दछ ।

बोरेल रोग: यो प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट मानिसमा सर्दा ज्वरो बढ्ने र मुखमा हुने गर्दछ ।

कृन्टा रूपा (इनफलेन्जा): मेक्सोभाइरसबाट हुने यो बंगुर, मुसा, कुकुर पक्षीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्दछ ।

जापनीज इन्सुफिलाइटिस: बंगुर र हाँस क्यारियरको रूपमा रहने र लामो रोग मानिसमा सार्ने गर्दछ ।

पाण्डित रोग: पारामेक्सोभाइरसबाट लाग्ने यो रोग पक्षीको सम्पर्कले मानिने गरीदा मानिसलाई ज्वरो आउन सक्छ ।

रेबिज रोग: लाइसा भाइरसबाट सर्ने यो रोग कुरुर, जंगली जनावरको टोकाईबाट मानिस र घर पालुवा पशुलाई लाग्दछ । यो प्राणघातक रोग हो ।

जुनोटिकबाट बच्न अपनाइने रोकथामका उपायहरू:


- दूध राम्ररी उमालेर खाने र मासु पकाएर मात्र खानु पर्दछ ।
- रागो, खसी, बोको काट्दा र बेच्दा मासु र आन्त्राभुङ्गी मिसाउनु हुँदैन ।
- रोगी वा रोग लागेर मेरेको जनावरको मासु खान हुँदैन र पट्के लागेको शका भएमा मृत जनावरको छाला काट्न वा चिरफार गर्नु हुँदैन । सकेसम्म जमिन मुनि गाडिदिनु पर्छ ।
- पालतु कुकुर, बिरालोलाई कहिले पनि कोचो मासु खान दिनु हुँदैन र खसी-बोको काट्दा फेला परेको सिष्ट (पातीको धैली) जलाइ दिने वा कुनुर, बिरालोले नपाउने गरी जलाइ दिने ।
- कुनै पनि बहुला कुकुर वा जंगली जनावरले टोकेमा तुरुन्त साबुन पानीले घाउ सफा गर्नु पर्दछ । यदि टोकेको कुकुर मर्‍यो भने रेबिज विरुद्ध खोप दिनु पर्दछ ।
- गाई, भैसी तुहेको वा अन्य प्रजनन रोग भएको फेला परेमा नाशो हातले जाँच्नु हुँदैन र काम सकिएपछि सरसफाईमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ।
- झुनेलो रोग लागेको गाई, भैसीको घुनमा एन्टीबायोटिक्स हालिएको छ भने कम्तीमा २ दिन सम्म दूध सेवन गर्नु हुँदैन ।
- कोचो दूध खानु हुँदैन । उमालेको दूध मात्र खाने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
- पालतु कुकुरलाई एन्टीरेबिज भ्याक्सीन र जुका विरुद्ध औषधि नियमित लगाउनु पर्दछ ।
- पशु उपचार वा अन्य त्यस सम्बन्धि काम गर्दा एप्रोन, गमबुट आदि सुरक्षात्मक प्रक्रिया अपनाई मात्र परिक्षण गर्ने र तत्पश्चात् हात सफा गर्ने गोडा धुने वा नुहाउने काम अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

सधैँ सफा दूध पिऔँ ।

फोहर दूधले रोग लाग्न सक्छ ।
होशियार रहौँ ।

६८. रेबिज रोग बारे जानकारी, रोकथाम तथा उपचारका उपाय

पशुबाट मानिसमा सर्ने सबैभन्दा खतरनाक, प्राणघातक रोग रेबिज यसलाई "हाइड्रोफोबिया" अर्थात् "पानी देखि डराउने" पनि भनिन्छ । रोग हो जसले सबै स्तनधारी पशुको स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ र यसले मृत्यु गराई छाड्छ । यो एक भाइरस भन्ने जिवाणुबाट हुन्छ र सार्ने कायमा बहुला कुरुर नै विशेष भिम्मेवारी हुन्छ । जंगली जनावर जस्तै: स्याल, फ्याउरो, ब्याँसो, न्याउरी मुसा आदिको भूमि डरलाग्दो छैन । पालतु जनावर मध्ये बिरालो, कुरुर, घोडा, गधाला रोग लागेमा आक्रामक हुने भएकाले भयावह स्थिति सृजना हुन सक्छ



रेबिज सर्ने माध्यमहरू

पानी कुरुर र स्यालले टोक्दा स्याल (Saliva) मा फैलिएको भाइरसले मानिस प्रवेश गर्छ । त्यसपछि भाइरस बिस्तारै स्नायुको माध्यमबाट फैलिन्छ । यो रोग लाग्न ३-७ हप्ता समय लाग्छ । तर कहिले र कसरी भन्ना पनि बढी लाग्न सक्छ । अन्तमा भाइरस मिदीमा पुग्छ

पशुले लक्षण देखाउन थाल्छ । भाइरसहरू पशुले लक्षण देखाउन थाले पछि मात्र च्यालमा देखिन्छन् । तब मात्र पशुबाट रोग फैलन सक्छ ।

लक्षणहरू: कुकुरमा रेबिज रोगको लक्षण २ किसिमको देखा पर्दछ: उत्तेजक र लाटो ।

उत्तेजक (Furious):

- सामान्य बानी व्यहोरा र शिल स्वभावमा परिवर्तन हुनु ।
- राम्रोसँग निल्न नसकेर साविक झै खान र पिउन मन नहुने ।
- बोलाएको नसुन्ने, भनेको नमान्ने, चन्चले हुने, अप्रयारोमा बस्ने ।
- केहि दिन पछि च्याल काट्न थाल्छ, बिना कारण झम्टन पुग्दछ ।
- कुकुर टाङ्गुनि पुच्छर लुकाएर बेजोडले दगुर्छ । जे पायो टोकने र झम्टने गर्दछ ।
- अन्तमा शरीरका विभिन्न भागमा पक्षघात (Pawbais) को थालनी हुनुका साथै तल्लो बङ्गरा झुन्डिएको देखिने, मुख खुला हुने, जिब्रो लत्रने र श्वास फेर्न नसकी मर्दछ ।
- साधारणतय लक्षण देखाएको १ हप्ता भित्र जनावर मर्दछ ।

लाटो (Dumb)

कुकुरलाई लाटो किसिमको रेबिज लागेमा पछाडिको खुट्टाले हिड्न नसक्ने र मुख तथा घाँटी पक्षघातग्रस्त हुने भएकोले टोकन त सक्दैन तर च्यालबाट रोग सर्छ । साधारणतया ४ - ५ दिनमा मर्छ ।

गार्ड, भैसीमा रेबिजको लक्षण

धेरै चनाखो हुने, छटपटिने, कान ठाडो पारी हेर्ने, झत्कने, चम्कने, बिना कारण कराउने, दूध कम दिने, तुरुन्त पिसाब गरिरहने, किला दाभलो वा चुनौ वस्तुमा हिकोउने, जीउ कान्छे दारा किटने, सिङ्गले भित्तामा ठोकिरहने वा जमिन खन्ने, उठबस गर्ने, अर्को पशुमा चढ्ने, नउग्राउने र केही निलन नसक्ने, च्याल काटिरहने, आँखा रातो देखिने, अन्तमा शरीर भरी पक्षघात हुने अनि श्वास फेर्न नसकेर मर्छ । यो रोग लागेको ४-७ दिनमा जनावर मर्छ । लाटो रुपमा पछाडिको खुट्टाको भाग पक्षघात ग्रस्त हुने र अविरल च्याल काटिरहने हुन्छ ।

रोग निदान: लक्षणबाट तथा प्रयोगशालामा भिदीको परिक्षणबाट यो निदान गर्न सकिन्छ ।

रोकथाम:

- रेबिज शका लागेको पशुले टोकेमा १० दिनसम्म त्यस्तो टोकने पशुले राख्ने । यदि १० दिन पछि जनावर मरेमा वा नमरेमा सोही रोकथाम गर्नु पर्छ ।
- टोकेको घाउमा किटाणुनाशक तरलले राम्रो सँग सफा गर्ने । यदि भएमा तुरुन्तै खोप दिन पर्दछ ।
- कुकुर र बिरालालाई प्रत्येक ६ महिना वा १ वर्षमा रोकथामवक (A.R.V.) २०% खोप दिनु पर्दछ ।
- रेबिज लागेको कुकुरले टोकेमा वा लसपस भएमा ५% A.R.V. खोप वा १४ दिनसम्म दिनु पर्दछ ।
- लसपस वा टोकेको जनावरलाई पनि नोभीश्याक र रक्स्यारेब १ जम्मा ६ पटक सम्म खोप दिन सकिन्छ ।
- रोगको शंका मात्र लागेमा पनि अस्पतालमा संपर्क राखी हाल्नुपर्छ ।

रक्स्यारेब र नोभीश्याक (Raksharab & Novi-vac)को खोप तालिका:

- पहिलो: टोकेकै दिन वा सकेसम्म छिटो ।
- दोश्रो: पहिलोको ३ दिन पछि
- तेस्रो: ७ दिन पछि
- चौथो: १४ दिन पछि
- पाँचौ: २८ दिन पछि
- छैटौ: ९० दिन पछि

तर खोप दक्ष डाक्टरबाट सल्लाह गरेर मात्र लगाउनु पर्छ ।

रोग लागेर औषधी गर्नु अनुरोध गर्नु
रोग लाग्न नदिनु राम्रो है

६९. सुंगुरको हैजा तथा रक्त अल्पता

यो सुंगुर तथा बंगुरमा विषाणुबाट लाग्ने अत्यन्त कडा तथा खतरनाक रोग हो । यो रोग संसारभर पाइन्छ । यस रोगबाट मृत्यु दर बढी हुन्छ ।

रोग लाग्ने कारण: Enteric/Picorna RNA Virus बाट लाग्छ, जसलाई Hog Cholera Virus पनि भनिन्छ । Hog Cholera Virus बाट लाग्ने भएकोले यस रोगलाई Hog Cholera वा Swine Fever पनि भनिन्छ ।

रोग सर्ने माध्यम: दूषित दाना, पानी, हावा र प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट रोग सर्दछ ।

रोग सराई अवधि: १-१२ दिनसम्म ।

लक्षणहरू: १०५-१०७°F सम्म ज्वरो आउने, दानापानी नखाउने, बान्ता गर्ने, शुरुमा दिसा कब्जीयत भै छेर्ने भाल्ने, श्नुनो, कान, पेट, खुट्टाका भित्री भागमा राता राता गुलाबी रङ्गका धब्बा देखिने, पुच्छर ओठ र योनीको भाग तिर पनि खटिरा आउने र घाउ हुने, आँखाबाट सिसान जस्तो बाक्लो पदार्थ निस्कने, नाकबाट सिसान बग्ने, शरीरका विभिन्न भागमा नशा सम्बन्धि समस्या देखिने, कान्ने, पक्षघात हुने, ब्याउने बंगुर तुहिने, रोग लागेको ९-१९ दिन भित्र मर्ने ।

रोग निदान: लक्षणबाट, प्रयोगशाला परिक्षणबाट, शव परिक्षणबाट (Post mortum गर्दा) आन्त्रामा टाँक जस्तो घाउ Botton Like Ulcer देखिन्छ ।

उपचार: यसको उपचार छैन । Secondary Bacterial Infection हुन नदिन, मृत्यु दर कम गर्न Antibiotic सुई दिन सकिन्छ । जस्तै: Sulphadimidine, Tetracycline आदि ।

नियन्त्रण/रोकथाम: सरसफाईमा ध्यान दिने, बिरामीसँग लसपस हुन नदिने, बिरामीलाई अलग्गै राख्ने र उपचार गर्ने । मरेका जनावरहरूलाई खाल्दी खनी पुर्ने । Capivised Swine Fever Vaccine 1ml S/C प्रत्येक वर्ष दिने । Swine Fever Tissue Culture Vaccine 5 ml S/C प्रत्येक वर्ष दिने ।

शरीरमा रगतको कमि लार्इ रक्त अल्पता भनिन्छ । रगतको प्रमुख भाग हेमोग्लोबिन बन्न अवश्यक पर्ने फलाम तत्व बंगुर/सुंगुरका पाठापाटी

जन्मदरको अवस्थामा नै ज्यादै कम हुने भएकोले फलाम तत्वका कीमक कारण बंगुरका पाठापाटीमा रक्त अल्पता देखिन्छ । जसको कारण पाठापाटी नबढ्ने, रगतको कमि भै पहेलो देखिने हुन्छन् ।

रक्त अल्पता हुने कारण: शरीरमा फलामको मात्राको कमि हुनु नै यसका प्रमुख कारण हो ।

लक्षणहरू: पाठापाटी बढ्न नसक्ने, अल्छी भएर बस्ने, छाला हल्का पहेल देखिने, छेर्ने, कमजोर भै मर्ने हुन्छ ।

रोग निदान: लक्षण हेरेर ।

उपचार: जङ्गलको सफा रातो वा कालो माटो ल्याएर पाठापाटीलाई खुवाउने फलामको सुइ (Inferan आइरनको सुई) जन्मेको तेथ्रो दिनमा 2 ml IM दिने भै सबै भन्दा बढी प्रभावकारी उपाय हो । Hematin/Anemidox Capsule-500 दैनिक दिने ।

रोकथाम/नियन्त्रण: बंगुरका पाठापाटी राख्ने खोरमा सिमेन्ट प्लास्टर लगाएर माटोको भित्ता र भुईँ नै रहन दिने । दानामा फलामयुक्त औषधि खान दिने र माटोको पेष्ट बनाई माउको फाँचोमा दल्ने ।

उन्नत जातका पशुपंक्षी पालन गरौं

रानी खेत

कुखुरामा लाग्ने यो रोग विषाणु (Viral Disease)बाट हुने रोग हो । यो रोग एककासी फैलिएर (८०-८५%) कुखुराको मृत्यु हुन सक्छ ।

लक्षणहरू:

- श्वास - प्रश्वास प्रक्रियामा कठिनाई आउँछ । नाक, मुखबाट एक प्रकारको तरल पदार्थ बग्दछ । जुन बाक्लो हुँदै जान्छ । खोको लक्षण पनि देखिन्छ ।
- छेर्ने, हरियो रङ्गको सुली दिसा गर्दछ ।
- स्नायु सम्बन्धि लक्षण देखाउने, घाटी बटारिने, रक्सी खाई मात्ति, हिँड्ने, पक्षघात पखेटा र खुट्टाको हुन्छ । पखेटा शरीरबाट बाहिर फिर्नागरी गर्दछ ।
- अण्डा र मासु उत्पादनमा कमी आउँछ ।
- बिरेर हेर्दा भित्री अङ्गहरूमा आन्ता, प्रोभेन्टिकुलस, फोक्सो, कलेजोमा रगतभरण भएको तथा प्रशस्त तरल पदार्थ देखिन्छ । यो रोगमा प्रोभेन्टिकुलसको भागमा स-साना रगतका कणहरू देखिन्छन्। यसलाई Paecial Hemorrhage । पेटिकियल हिमोरेज) भनिन्छ । यसबाट रोगको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

उपचार: यो रोग विषाणु (virus)बाट हुने भएकोले खासै कुनै उपचार छैन । एन्टीबायोटिक्स उपचार गरी Secondary Bacterial Infection हुन नदिने गर्नु पर्दछ । जस्तै: Marquim, Neodox, Tetracycline आदि । यसका साथै कुखुरालाई न्यानो पारी राख्ने । Lasoth खोप पुनः दिनाले पनि रोकथाम हुन जान्छ ।

रोकथाम: खोप लगाएर रोकथाम गर्न सकिन्छ । खोपको तालिका ठाउँ अनुसार आजभोलि फरक-फरक अपनाउने गरेका छन् । तर रानी खेतको लागि निम्नानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ:

- पहिलो हप्ता ७ दिन भित्र रानीखेत एक १ (F1 Strain) आँखा, नाकमा राख्ने।
- तेश्रो हप्ता २१ दिन भित्र F1 Strain वा लसोटा आँखा, नाकमा राख्ने।
- सातौँ हप्ता ५० दिन भित्र F१ Strain वा लसोटा पानीमा ।
- ६५ दिनमा R2B मासुमा सुई लगाउने ।
- आवश्यक परेमा ८५ दिनमा R2B मासुमा सुई लगाउने ।
- ब्रोइलर्सलाई १ दिनमा F1 आँखा, नाकमा दिने ।
- ब्रोइलर्सलाई २१ दिनमा F1 वा Lasoth आँखा, नाकमा राख्ने ।

विफर (Fowl Pox)

विषाणुबाट हुने सरुवा रोग हो । यो रोग साना तथा ठूला उमेरका कुखुरामा लाग्दछ । रोगमा मृत्युदर कम भए तापनि अण्डा उत्पादनमा बाधा । शरीरको नरम भाग र प्वाँख नभएको भागमा जस्तै लोती, सिसि आँखाको डिलमा तथा खुट्टामा खटिरा आएर पछि सुकेर पात्रा बन्दछ । ३-४ दिन, ज्वरो धेरै आउने र केही कुखुरा अन्धो पनि हुने हुन्छन् ।

उपचार: कहिले काहीँ कुखुराको मुख भित्र पनि सेतो पदार्थ टाँसिएको हुन्छ । भित्रको सेतो पदार्थ निकाल्ने, बाहिरी भागमा एक्रिफ्लेभिन (Acridine) समावेश भइलेट (Gention Violet), मर्क्युरी कोम डोलले सफा गर्ने । पाण्डो एन्टीबायोटिक तथा भिटामिन औषधि राखी खान दिने ।

रोकथाम: ६ हप्ताको उमेरमा प्वाँखको प्वालहरूमा सुईले औषधि दिने ।

रोग लागेर औषधी गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु राम्रो हो

७१. कुबुरामा लाने गम्बोरो र मुल्नोरम रोग तथा उपचार

गम्बोरो

यस गम्बोरो (Gumboro) रोग लाई आई.बी.डी. (Infectious Bursal Disease) पनि भनिन्छ । यो रोगले कुबुराको बर्सा फोब्रिक्सलाई विशेष रूपले असर पार्दछ । यो रोग सर्वप्रथम १९६२ मा देखिए तापनि नेपालमा भने ९० को दशकमा मात्र देखिएको थियो । यो अमेरिकाको गम्बोरो भन्ने ठाउँमा पहिलो चोटी फैलिएको हुनाले यसको नाम गम्बोरो रहन गएको हो ।

कारण: यो वीरनाभिरिडे परिवारको RN भाइरसबाट हुने रोग हो ।

रोग सर्ने माध्यम: यो रोग आपसी संसर्ग, रोगीले दुषित गरेको दानापानी, मल र फोहोर दोहोरबाट चाँडै फैलिन्छ । ३-६ हप्ताको उमेरमा यो रोग चाँडै फैलिन्छ । यसमा अन्य रोगबाट बचाउने प्रतिरोधात्मक शक्तिमा ह्रास आउँदछ ।

लक्षण:

- प्वाखमा मलद्वार नजिक सुनिन गर्दै पोतिने, मलद्वार सुनिने, सेतो र पानी जस्तो छेर्ने, खाना नखाने, झोक्राउने र प्वाख गुज्मुजिएको हुने।
- कुनै-कुनै कुबुराको सुलीमा रगत भिसिएको, कुबुरा कामे र पखाला लागेर शरीरमा पानीको किमि हुने ।
- चल्लाहरूमा मृत्यु दर २०% सम्म हुने तर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति ह्रास भई मृत्यु दर बढ्दै जाँदा कुबुराहरूमा निकै मृत्यु हुने गर्दछ ।

पोस्टमार्टम:

- बर्सा फोब्रिक्स सुनिएको, पहेलो र रक्तश्राव समेत भएको हुन सक्छ।
- मुगौला, फियो केही सुनिएको हुन्छ ।
- प्रोभेन्टीकुलस र पिवाडको बीचमा रक्तश्राव भएको हुन्छ ।
- फिला र छातीको छाला छुट्ट्याई हेर्दा यी मांसपेशीहरूमा लामा, राता धर्काहरू वा थोप्ला रक्तश्राव देखिन्छ ।

रोग निदान:

- लक्षणको आधारमा ।
- पोस्टमार्टमबाट ।
- सिरोलोजिकल परिक्षण ।

उपचार: विषाणुबाट लाग्ने रोगको उपचार सन्तोषप्रद नभए तापनि ब्याक्टिरियल इन्फेक्शन रोक्न इनराफ्लोक्सासिन, सेफालेक्सीन जस्ता एन्टीबायोटिक्स एवं मृत्यु दर रोक्न लेभामिसोल र इलेक्ट्रोकेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

रोक्थाम-ब्रोइलरको भ्याक्सीन:

- १०-१४ दिनको उमेरमा नाक तथा आँखामा भ्याक्सीनको २ थोपा दिने ।
- २०-२४ दिनको अन्तरालमा दोश्रो भ्याक्सीन स्क्रिम भिलकमा मिसाई खुवाउने ।

लेयर कुबुरामा:

- ३-४ पटक भ्याक्सीन गर्ने ।
- १०-१२ दिनमा पहिलो ।
- २०-२२ दिनमा दोश्रो ।
- रोगको प्रकोप हेरी आवश्यकतानुसार सिसोमोनिट्रिङ गरी भ्याक्सीन लगाउने

साथै कुबुरामा लाने गम्बोरो रोगको रोक्थामको लागि सरसफाई तथा बायोसेक्युरिटीको व्यवस्था राम्रो राख्नु पर्दछ ।

पुल्नोरम रोग (Pullorum Disease)

यो रोगलाई Bacillary White Diarrhoea वा सेतो छेर्ने पनि भनिन्छ ।

कारण: यो रोग सालमोनेला पुल्नोरमबाट लाग्दछ र २ हप्तासम्मको कुबुरामा बढीमा बढी असर गर्दछ तर जुनसुकै अवस्थामा वा खासगरी लेयर कुबुरामा समेत पनि असर गर्दछ । यो रोग वंशानुगत हो जुन कुबुराको अण्डाबाट समेत सर्दछ ।

सर्ने माध्यम: अण्डाबाट सर्ने भई वंशानुगत हुनुको साथै यो रोग सुलीबाटाना दानापानी दुषित भै समेत रोगी बनाउँदछ । शुरुमा मृत्यु दर ५% देखिएपम क्रमशः Dehydration भै यो २०-२५% सम्म पुग्दछ ।

लक्षण:

- चल्लाले सेतो पहेलो भिसिएको छेर्छ ।
- सुली गृहद्वार बरिपरि टासिएको र भल्लामा पनि लागेको हुन्छ ।
- यो बिण अवस्था भएमा खुट्टाको जोर्नी सुनिने र लरखराउने हुन्छ ।
- खानामा रुची नहुने र लरखराउने गर्छ ।
- कुबुराको फुल उल्टाउन एककासि घट्छ र शाशरिक वृद्धि हुँदैन ।

पोस्टमार्टम गर्दा:

- आन्त्रा सुनिएको र रक्तमय देखिन सकिने ।
- फोक्सो र कलेजोमा र स-साना सेतो मिर्चा देखिने आदि ।

उपचार:

- सलफामेथाक्साजोल र ट्राइमेथप्रिम (सल्कोप्रिम ५ ग्राम ४ लिटर पानीमा) ।
- फ्लुक्वीन १ चम्चा ५ लिटर पानीमा ५ दिन खुवाउने ।
- फ्युराल ०.५ ग्राम १ लिटर पानीमा १० दिनसम्म ।

रोक्थाम:

- वंशानुगत रोग भएकोले रोग लागेको कुबुरालाई सकेसम्म नष्ट गर्ने ।
- रोगमुक्त हयाचरीबाट चल्ला खरीद गर्ने ।
- बायोसेक्युरिटीको व्यवस्था गर्ने ।

७२. कुबुरामा लाग्ने कक्सीडियोसिस तथा यसको उपचार

कारण: कुबुरालाई विभिन्न १, जातका प्रोटोजोआ परजिवी आइमेरियाबाट रगत छेर्ने रोग लाग्छ । यसैलाई कक्सीडियोसिस भनिन्छ । यो परजिवी कक्सीडिया स्पोरोजोआ वर्गमा पर्दछ । यो आइमेरिया र आइसोपोरा गरी २ किसिमको हुन्छ ।

इपिडिमोलोजी: यसले धेरै जसो ४ - ६ हप्ताका कुबुरालाई असर पार्दछ । यसको मृत्यु दर ५०% सम्म पुग्दछ ।

सर्ने माध्यम: कुबुराको सुलीबाट अर्गान्ती सिष्ट छर्छ र सो स्पोरलेटेड बनी हानिकारक बन्छ । यसलाई अन्य कुबुराले खानापानी र सोतर भिसिएको स्पोरलेटेड सिष्ट खान्छ । यसबाट कक्सीडिया लाग्छ ।

चित्र: कक्सीडियोसिसको जिवन चक्र ।

कारण-आन्त्रामा हुने कक्सीडिया:

- आइमेरिया नीकाटिक्स लगायत अन्य ४ वटा कक्सीडियाले सानो आन्त्रालाई आक्रमण गर्दछ । ४ महिनाको उमेरसम्म यो तीक्ष्ण र जीर्ण खालको हुन्छ।
- तीक्ष्ण खालको कक्सीडियोसिसमा मृत्यु संख्या बढी हुने, पखेटामा सुली टासिएको, जुच्चोको रङ फुस्रो र कुबुरा झोक्राइ रहने हुन्छ । ५ - ७ दिन भित्र कुबुरा मर्दछ ।
- जीर्ण खालको कुबुरामा दुब्बाउने, रातो छेर्ने गर्दछ ।
- फुल उत्पादन घट्छ र शारीरिक विकास हुदैन ।
- पाला रगत भिसिएको छेर्ने, दानापानी नखाने र विस्तारै दुब्बाउँदै जाने हुन्छ।

सिकल कक्सीडियोसिस:

- आइमेरिया टोनेलाबाट लाग्ने यो रोग १२ हप्तासम्मको कुबुरालाई लाग्दछ ।
- यसलाई रक्तयुक्त (Bloody) कक्सीडिया पनि भनिन्छ ।
- चल्ता एकै ठाउँमा रहने, दानापानी खान मन नगर्ने, सिउर र लोती फुसो हुने, पहेलो वा सुलीमा रगत किसिमको हुने गर्छ ।
- चल्तो दुब्बाउँदै जाने हुन्छ ।

पोष्टमार्टम:

- सिकल कक्सीडियोसिस: यसमा सिका भित्र रक्तश्राव भई रातो भएको वा रगत जमेको हुन्छ । आकार समेत ठूलो र सुनिएको हुन्छ ।

- इन्स्टेसटीनल कक्सीडियोसिस: सानो आन्त्राको अगाडि र बीच भागमा रस्त भई आन्त्रा बाक्लो भएको पाइन्छ । आन्त्रामा सेतो र फुस्रो रङको देखिन्छ ।

उपचार:

- एप्रोसोल: ३० ग्राम, २५ लिटर पानीमा ५ दिन ।
- सुपर कक्स: ५ ग्राम, ४ लिटर पानीमा ५ दिन ।
- युरासोल: १ ग्राम, १ लिटर पानीमा ७ दिन ।
- कर्डीनल: ४ ग्राम, १ लिटर पानीमा ३ दिन ।
- कक्सीक्वीन: ३० ग्राम, ६० लिटर पानीमा ५ दिन साथै इलेक्ट्रोकेयर र १ लिटर पानीमा ।

रोकथाम:

- कक्सीडियोसिस रहित श्रोतबाट चल्ता ल्याउनु पर्दछ ।
- सोतर जहिले पनि सफा, ओभानो र सुख्खा राख्नु पर्दछ ।
- कुबुरा पालेको कोठामा हावा रामरी संचार हुनु पर्दछ ।
- दानामा नियमित तवरले कक्सीडियोस्टेट औषधि राख्नु पर्दछ ।
- सोतर चिसो भएमा १ वर्ग फिट क्षेत्रमा छुनु पर्दछ।
- कुबुरा घरको क्षमता भन्दा बढी राख्नु हुदैन ।
- विभिन्न उमेरका कुबुरा छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दछ ।
- एक बथानमा प्रयोग भएका भाँडा, उपकरण आदि अर्को बथानमा लगादा रूपले सक्रमण मुक्त गरेर मात्र लरनु पर्दछ ।

उन्नत जातका पशुपंक्षी पालन गरौं

७३. पशु तथा कुखुराको खोप तालिका

खोप (Vaccine): कुनै पनि रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न खोप दिइन्छ । रोग लाग्नु अगावै रोग विरुद्ध लड्ने क्षमताको विकास गर्नु वा रोगको रोकथामको लागि खोप दिइन्छ । खोप दिदा खतरनाक रोगहरू जसले लक्षण देखाउन पूर्व मृत्यु हुने वा रोग लामिसके पछि उपचार नहुने रोगहरूको खोप तयार गरिएको हुन्छ ।

जस्तै: गाई, भैसीमा: भ्यागुते, चरचरे, खोरेत, पटके, गौगोटी ।

बंगुरमा: स्वाइन फ्लु, खोरेत ।

भेडा बाखामा: पी.पी.आर., खोरेत, भ्यागुते, विफर, ई. टेरोटोक्सीमिया ।

कुकुरमा: रेबिज, डिस्टेम्पर, हेपाटाइटिस, पार्वो इन्टेराइटिस, इन्फुक्सीयस ल्यारङ्गो, टेकाइटिरन, ल्यान्टो स्पाइरोसिस ।

कुखुरामा: स्प्रेक्स, रानीखेत, गन्बोरो, फावलपक्स, Infectious Bronchitis (IB), Egg Drop Syndrome (EDS).

गाई/भैसी

भ्यागुते Haemorrhagic Septicemia- HS Vaccine: BPD Nepal ठूलो पशुलाई 5ml S/C र सानो पशुलाई 3ml S/C Intenat ठूलो पशुलाई 3ml र सानो पशुलाई 2ml (६/६ महिनामा वा कम्पनीको Leaflet अनुसार) ।

B.Q. or Black Quarter (चरचरे): B.Q. Vaccine BPD ठूलो पशुलाई 5ml S/C र सानो पशुलाई 3ml S/C (६/६ महिनामा) ।

HSBQ (Combined) Vaccine BPD: ठूलो पशुलाई ५ ml र सानो पशुलाई ३ ml (६/६ महिनामा) ।

खोरेत भ्याक्सीन (Foot & Mouth Disease): Raksha Ovac ठूलो पशुलाई 2ml र सानो पशुलाई 1ml (१/१ महिनामा) Raksha ठूलो पशुलाई 2ml र सानो पशुलाई १ ml (६/६ महिनामा) ।

गौगोटी (R.P. Vaccine): GTV 1ml S/C लोकल पशु TCV 1ml S/C उन्नत पशु

Anthrax Spore Vaccine: 1ml S/C १/१ वर्षमा ।

बंगुर

Swine Fever Vaccine: 1ml S/C, १/१ वर्षमा, ६ हप्ता भन्दा माथि बंगुरहरूलाई दिने ।

खोरेत: FMD Raksha Ovac १ ml S/C १/१ वर्षमा ।

भेडा / बाख्रा

P.P.R. Vaccine: १ ml S/C २/२ वर्षमा ।

FMD (खोरेत): Raksha Ovac 1ml S/C १/१ वर्षमा ।

Goat Pox: भ्याक्सीनमा रहेको पचानुसार ।

Enterotoxemia: भ्याक्सीनमा रहेको पचानुसार ।

कुकुर / बिरालो

Rabies Vaccine: ६/६ महिने र १ वर्ष ।

DHP P I+L Vaccine: Megavac- S/C or I/M, १/१ वर्षमा ।

कुखुराको खोप तालिका

उमेर	रोग	भ्याक्सीनको किसिम	भ्याक्सीनेशन
बोइलर कुखुरा:			
१ दिन	मेरेक्स	एच.भि.टी.	०.१ ml छालामुनि
५-७ दिन	रानीखेत	F१	आखा वा नाकमा
८-१२ दिन	गन्बोरो	इन्टरमिडियट	आखा वा नाकमा
१८-२० दिन	रानीखेत	लासोटा/ F१	आखा, नाकमा वा पानीमा
२४-२६ दिन	गन्बोरो	इन्टरमिडियट	आखा, नाकमा वा पानीमा

७४. कुष्ठरुमा लाग्ने सि.आर.डि. र गोलो जुका तथा उपचार

यसलाई श्वास नलीको निर्ण रोग वा Chronic Respiratory Diseases छोटकरीमा C.R.D. ले बुझिन्छ ।

कारण: सामान्यतया यो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम (Mycoplasma Gallisepticum) बाट लाग्दछ । माइकोप्लाज्मा, ब्याक्टेरिया तथा भाग समुहको बीचमा पर्दछ । यसमा दोश्रो ब्याक्टेरियल संक्रमण समेत हुन सक्छ

इपिडिमियोलोजी: मृत्यु दर धेरै नभए पनि यो रोग लागे पछि अर्को रोग आक्रमण हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । मुख्य रूपले यो रोग जाडोमा देखिन्छ जुन सुकै उमेरमा यो रोग लाग्न सक्छ ।

गर्न माध्यम: अण्डाबाट नै चल्तामा रोग सर्न सक्छ । साथै बिरामी कुष्ठरुमाकाको सिंगान, सुली र संसर्गबाट पनि अन्य पंक्षीमा सर्दछ । एमोनिय प्रतिशत बढी भएको सोतरबाट सर्दछ ।

प्राक्षण:

- यो रोग आक्रमण पश्चात् १० - ३० दिन भित्र सर्दछ ।
- खोक्ने, सिंगान आउने र कुष्ठरा मुख खोलेर बस्छ ।
- रोगी कुष्ठरालाई श्वास फेर्न गाह्रो हुने र ध्यार ध्यारको आवाज आउँछ ।
- रोगी कुष्ठरा रातीको समयमा धेरै खोक्छ र हाँछ्यु गर्दछ ।
- नाक र ओखाबाट पानी झर्दछ ।
- यस्ता कुष्ठरा बचेपछि थिनको फुल उत्पादन गर्दछ ।
- कुष्ठरा कमजोर हुन्छ र झोक्राएर बस्छ ।
- दानापानी खान मन नलागेर थोरै खान्छ ।
- यस्ता रोगी कुष्ठराले फुल पारेमा फुलमा किटाणुहरू सरेको हुन्छ र फुलबाट निस्केको चल्ता रोग ग्रस्त हुन सक्छ ।

प्राणमार्म:

- टाकिया फुलेको एवं पिप वा सिंगान जमेको हुन्छ ।
- Air Sac फुल्नु, साथै पिप जमेको हुन्छ ।
- फोक्सो समेतको रङ परिवर्तन भै कालो हुन्छ ।
- भित्री अङ्गहरू लिभर, किडनी, आन्त्रा आदिमा समेत रक्तश्राव वा रगत छिर्का हेर्न सकिन्छ ।

लेयर्स कुष्ठरा:

१ दिन	मेरेक्स	सि.भी. १९८८	०.१ml छालामा
५-७ दिन	रानीखेत	F1	१/१ थोपा ओखा वा नाकमा
८-१२ दिन	गम्बोरो	इन्टरपीडियट	१/१ थोपा ओखा वा नाकमा
१८-२० दिन	मेरेक्स	एच.भि.टी.	छालामा
२४-२६ दिन	गम्बोरो	इन्टरपीडियट	ओखा, नाक वा पानीमा
२८-३० दिन	आई.बी.	लासोटा	IB Lasoth पानीमा
४२ दिन	पक्स	फावलपक्स	पछेटामा घोक्ने
४९-५० दिन	आई.बी.	लासोटा	IB Lasoth पानीमा
८-१० हप्ता	रानीखेत	R 2 B	मासुमा ०.5ml
१२-१४ हप्ता	पक्स	फावलपक्स	पछेटामा
१५ हप्ता	आई.बी.	लासोटा	IBN १२० पानीमा
१६ हप्ता	रानीखेत	Lasoth F1	पानीमा

खोप दिता ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- पानीमा भ्याक्सीन दिता कुष्ठरालाई २ घण्टा अगावैबाट पानी खान नदिने ।
- भ्याक्सीन पानी दिता अन्य औषधि नमिसाउने र Chlorine भएको पानीमा नदिने ।
- भ्याक्सीन दिता कुष्ठराहरू बिरामी हुनु हुँदैन ।
- भ्याक्सीन दिता चिसो समयमा बिहान वा बेलुकी मात्र दिने ।
- भ्याक्सीन मिसाउनु पूर्व Skim Milk १००० चल्तालाई ४५ ग्रामका दरले घोलि औषधि पानीमा मिसाई बुवाउने
- औषधि पानी एक घण्टा भित्रैमा सकिने गरी राख्ने ।
- भ्याक्सीन नाक वा ओखामा दिता चिसो Normal Saline मा घोलेर १ घण्टा भित्रै लगाई सक्ने ।
- भ्याक्सीन खरिद गर्दा विश्वव्यापी बिक्रेता संग मात्र खरिद गर्ने ।
- Cold Chain राम्ररी मेनटेन गरिएको हुनु पर्छ ।
- खोप ल्याउदा, नैजाँदा सोझै पूर्वको किरण नपर्ने गरी बुबानी गर्ने ।

खोप उत्पादक कम्पनीहरू:

- औषधि उत्पादन शाखा त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
- Interrel-Holland
- Medivac-Indonesia

- सि.आर.डि. लागेको कुखुरामा सामान्यतया Secondary Bacterial Infection हुने भएकोले सालमोनेला, ई. कोली एवं कक्सीडियोसिसको प्रकोप देखिन्छ।

उपचार:

- नियोमाइसिन र डोक्सीसाइक्लीन (Nedodox १ ग्राम, १ लिटर पानीमा ३ - ५ दिन खुवाउने) ।
- अलथ्रोसिन/इरिथ्रोमाइसिन १५ ग्राम, ४ लिटर पानीमा मिसाई ३ - ५ दिना
- टाइलोसिन/टाइमुटिन निर्माताको निर्देशन अनुसार खुवाउने ।
- माइकोम्युलीन (कन्सेन्ट कम्पनीको) कौनिक केसमा फाइदा देखिएको छ ।

नियन्त्रण:

- सि.आर.डि. रोगमुक्त ह्याचरीबाट चला ल्याउने ।
- भेन्टीलेशनको राम्रो व्यवस्था गर्ने ।
- सोतरमा एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन नदिन पटक पटक सोतरलाई चिसो हुनबाट बचाउन घाममा सुकाउने, समयानुसार पल्टाउने वा थप सुक्का सोतर मिसाउने गर्नु पर्छ ।
- बायोसेक्युरिटीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
- दुई लट कुखुरापालनमा कम्तीमा १५ दिनको फरक दिने र डिस्इनफेक्टेन्टको आवश्यक ध्यान दिनु पर्दछ ।
- वाटर सेनाटाइजरको व्यवस्था गर्ने ।
- रोगी कुखुरालाई फुल पार्न नराख्ने ।

गोलो जुका: कुखुरामा लाग्ने गोलो जुकाहरू मध्ये तपसिलका जुकाहरूले अलि बढी नोक्सानी गर्दछन्:

- ठूलो गोलो जुका: "एस्कोरडिया गेली" नामक जुका कुखुराको लागि अति खतरनाक मानिन्छ । यो जुका आन्द्रामा बस्न र सुलीबाट असंख्य फुलहरू निस्की सोतरमा भिसिन्छ । यी फुलहरू अन्य कुखुराले खान पुगेमा यो जुका सर्दछ ।
- क्रप वर्म: केपलेरिया स्पेसिजबाट लाग्ने यो कुखुराको गाडमा लाग्ने जुका हो । यसको जीवनचक्रमा प्रत्यक्ष असर मध्यस्थकर्ताको रूपमा गड्यौलाको हुने भएकोले यसको प्रभाव क्रप वर्ममा रहन्छ ।
- गेप वर्म (Gape Worm): यो Sumpganus Trachea बाट लाग्दछ र यसले श्वासा प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्दछ । यसमा मध्यस्थकर्ता गड्यौला र चिन्ने किरा हुने भएकोले अप्रत्यक्ष रूपमा यसको सङ्ख्याले असर गर्दछ । यसमा भुलु दर बढी हुन्छ ।

- सिकल वर्म (Saecal Worm): सिकममा पाइने Helicakis, Strongylidosis/boils जस्ता जुका हुन् । जसमा अप्रत्यक्ष रूपमा ग मध्यस्थकर्ताको रूपमा असर गर्दछ ।

गोलो जुकाका लक्षणहरू:

- ठूलो गोलो जुका ३ महिना भन्दा कमका चलामा देखिए तापनि गोलो साधारणतया त्यस पछिका उमेरमा जतिबेला, जुनसुकै उमेरमा असर सक्छ ।
- पानी र च्याल जस्तो छेर्ने गर्दछ ।
- कमजोर भै तौलमा कमी हुने ।
- फुल उत्पादन घट्ने ।
- प्वाँख जिग्रि परेको हुन्छ ।
- गेप वर्म लागेमा टाउको उठाएर श्वास फेर्ने र खोकी लाग्ने हुन्छ ।
- एनिमिया गराउन सक्छ ।

पोस्टमार्टम: मरेको कुखुरा चिरेर हेर्दा जुकाले सम्बन्धित बासस्थान नोक्सान पुर्‍याएको, कहिले काहीँ छेडेको देखिन्छ । सिकल वर्मले सिर्षा गराउँछ । कहिले काहीँ जुका नै देखा पर्छ ।

उपचार: पिप्राजिन, अल्बेण्डाजोल, लिभाभिसोल - हालसम्म एक मात्र अन्तरालमा पिप्राजिन र अल्बेण्डाजोल दिदा राम्रो असर रहेको र भुलु गर्नु ७ दिन अगावै लिभाभिसोल दिदा फाइदाजनक भएको देखिएको छ ।

रोकथाम/नियन्त्रण:

- फार्म सफा र स्वच्छ हुनु पर्छ ।
- कुखुरा छुल्ला र चरनको रूपमा पाल्नु हुदैन ।
- सोतरमा चिस्यान हुन नदिन एवं एनिमिया ग्यास बन्न नदिने गर्नु पर्दछ ।
- स्टुटेजिक डिट्रिच गराउने ।

७५. कुकुरको DISTEMPER AND PARVO ENTERITIS रोग तथा उपचार

कुकुरको Canine Distemper

यो कुकुरहरूलाई सबैभन्दा बढी हुने सरुवा रोग हो । यो विशेष गरी १ वर्ष भन्दा तलका कुकुरहरूलाई हुन्छ । ६ महिना भन्दा कमका छाउपछाउरीहरूलाई बढी नै असर गर्दछ । यो रोगका Parvovirus विषाणुहरू जंगली जनावर फ्याउरो, ब्याँसो, आदिमा रहेका हुन्छन् । यिनै जंगली जनावरहरूबाट कुकुरमा रोग सार्छ ।

रोगका लक्षणहरू:

- रोगले ६ महिनाभन्दा तलका कुकुरहरूलाई बढी असर गर्दछ ।
- यो रोगको प्रष्ट लक्षणहरू ८ - १० दिनमा मात्रै देखिन थाल्छ ।
- कुकुरलाई शुरुमा बेचैन (Restlessness), खान मन नगर्ने, सामान्य Temperature बढ्ने हुन्छ ।
- पछि गएर शरीरको तापक्रम (Temperature) १०४°F हुने ।
- रगत भित्रिएको हिसा गर्ने ।
- खान मन नगर्ने, शरीरमा पानीको कमी हुने ।
- नाक तथा आँखाको Mucous सतों हुने, कचेरा आउने ।
- श्वास फेर्न गाह्रो हुने, उल्टिने ।
- Broncho Pneumonia को लक्षण देखिने ।
- Bronchitis का लक्षणहरू देखिने ।
- हिंडिन गाह्रो मान्ने, खुट्टाका छाला बाक्लो (Food Pad) हुने ।
- पेट तथा तिघाहरूमा फोका देखिने ।
- स्नायु सम्बन्धि असरहरू देखिने ।
- कुकुरलाई चक्कर लाग्ने लगाउने, बेहोस हुने ।
- Muscular Spasm मासुमा कम्पाक्ट (कम्पन) देखिने ।

उपचार:

- Symptomatic Treatment गर्ने ।
- रोगीहरूलाई न्यानो तथा सुख्खा कोठामा राख्ने ।
- Inj. Ampicillin + Cloxacillin, Moxil 500mg, IM x ७ दिन ।
- Inj. Diclofenac - 3 ml, IM x ७ दिन ।
- Inj. Metron - 100ml, IV.
- Inj. Dextrose (5%) 200ml IV.
- Inj. B. Complex C Vit C - 2ml, IM.
- Inj. Pernorm, Siquel, Avomin आदि उल्टि रोक्नलाई दिने ।

तोकामास:

- Vaccination
- Megavac-6 S/C or IM.
- Candure DHL - 1ml IM or S/C.
- ३ महिनाको उमेर पुगेपछि पहिलो Vaccination गर्ने र १/१ वर्षमा दोहोर्ने ।

Parvo Enteritis: यो कुकुर तथा बिरालोमा लाग्ने संक्रामक रोग हो । यो १९७८ भन्दा अगाडि विश्वभरै चिनिएको थिएन । यो रोगले बिरालो, गाई, भैँसी र मानिसमा पनि असर पार्न सक्छ । यो रोग Canine Parvo Virus बाट हुन्छ ।

लक्षणहरू:

- शरीरको तापक्रम बढ्ने, ज्वरो आउँछ ।
- खाना नखाने ।
- भान्ता गर्ने (पहेँलो गन्ताउने) ।
- पखाला हुने, पखालामा आउँ वा रगत भित्रिएको छेर्ने ।
- आन्तमा घाउ हुने, Heart Muscle Damage हुने हुन्छ ।
- Dehydration हुने र उपचार नपाए मर्ने हुन्छ ।

उपचार:

- Inj. Pernorm - 2ml (Siquel/Vomitin), IM.
 - Inj. Moxil 500mg, IM.
 - Inj. Diclofenac - 2ml, IM or Sy Ampicillin + Cloxacillin 500mg IM.
 - Chloramphenicol - 500mg IM.
 - Inj. Metron - 100ml, IV.
 - Inj. Normal Saline 200ml, IV.
 - Inj. Vitamin B Complex (Polibion) 3ml, IM.
- तोकामास:
- Megavac P - 1ml S/C or IM.
 - Candure P - 1ml.
 - फर्मासिनले कुकुरको खोर सफा गर्ने ।
 - पहिलो Injection ६ - ७ हप्तामा लगाउने ।
 - दोस्रो Injection १२ हप्तामा लगाउने ।
 - प्रत्येक वर्ष एक पटक ।

७६. सल्फर, बोरिक एसिड, जिङ्क अक्साइड, मलहम बनाउने र प्रयोग विधि

गन्धक: यो मलहम बाह्य लुतो, खोइरो लागेमा प्रयोग गर्न सकिन्छ:

- प्रयोग गर्ने सिकेने अवस्था: लुतो लागेमा, खोइरो लागेमा ।
- औषधिको मात्रा: आवश्यकता अनुसार ।
- सावधानी: शरीरको बाह्य भागमा मात्र प्रयोग गर्ने, चाट्न नदिने ।
- प्रयोग: दिनमा एक पटक गरी १ हप्तासम्म प्रयोग गर्ने ।
- प्रयोग गर्ने तरिका: लुतोको सबै पाया उप्काउने, लुतो लागेको सबै भाग औषधि पानी वा सफा पानीले सफा ओभानो पार्ने र तयार पारेको मलहम आवश्यकता अनुसार लगाउने ।
- मलहम बनाउने तरिका: १ भाग गन्धक, १० भाग थ्यासलिन, तोरीको तेल वा नौनी भिसाएर मलहम बनाउने ।
- गन्धक: ४५० ग्रामको पाकेटमा धुलो वा ठिकामा रुपमा पाइन्छ ।
- Boric Acid (अर्वा सफा गर्ने घोल): १ को घोल बनाई अर्वा सफा गर्ने, अर्वा चिलाउने, चिप्रा आउने जस्ता अर्वा सम्बन्धि रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले शुरुको फुलो परेको, अर्वामा चोट लागेको समेत निको हुन्छ ।
- झोल बनाउने तरिका: Boric Acid १ भाग, पानी १०० भाग, सफा पानीमा औषधि घोली सफा सिसिमा राख्ने र प्रयोग गर्ने ।
- बोरिक एसिड मलहम: यो मलहम शरीरका विभिन्न भागमा आएका विविध शुनका घाउहरू, पोलिएका घाउमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मलहम प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले मलहम प्रयोग हुने ठाउँ सफा पानी वा औषधि पानीले सफा गरी ओभानो पारी मलहम लगाउने गर्नु पर्छ ।

Zinc Oxide/ Boric/ Sulpher Ointment:

- जिङ्क अक्साइड ५ भाग, • बोरिक एसिड ५ भाग,
 - सल्फर पाउडर २ भाग र • थ्यासलिन ५० भाग राम्रो सँग भिसाएर बनाउने
- यसलाई पिलो र पाकेको घाउमा लगाइ दिने । घाउबाट रस निस्की रहने घाउमा चिलाउने, विविध आएका ठाउँमा यो मलहम प्रयोग गर्न सकिन्छ । मलहम प्रयोग गर्ने तरिका: प्रयोग गर्ने ठाउँ सफा गर्ने, रौहरू काट्ने, सडेको मासु, सूकेका टुप्पा हटाउने, पिप, रगत सफा गर्ने, कपासले घाउ सफा गर्ने, घाउ ओभानो पार्ने मलहम लगाउने, मलहम पातलो लगाउने, घाउ निको नभए सम्म दिनको २/१ पटक लगाइ राख्ने । सरसफाइमा ध्यान दिने ।

Golden Lotion: यो लोशन लुतो, चिलाउने, सै झर्ने, घाउहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

Lotion बनाउने तरिका: सल्फर २४० भाग, लाइम (चुन) ५०० ग्राम, पानी २०० मिलि लिटर, सबैलाई भिसाउने, फिटने, भिसाइ सके पछि ३० देखि ४५ मिनेट सम्म पकाउने । २ दिन सम्म चिसो ठाउँमा राख्ने । छान्ने र छनौट गरी सिसिमा राख्ने । लुतो, चिलाउने, सै झर्ने, घाउहरूमा प्रयोग गर्ने ।

७७. सडेको पशु तथा सिनो तह लगाउने तरिका

जनावर, पशुपंक्षीको सिनो (Carcas) तुरुन्तै हटाउनु पर्ने वा गाड्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय पशुपंक्षीहरू संक्रामक रोगहरू लागेर मरेका हुन्छन् । यसरी मरेका जनावरको सिनोबाट रोग फैलिन सक्ने ठूलो माध्यम हुन सक्छ । सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि त्यतिकै हानिकारक हुन्छ । खास गरी गर्मी समयमा सिनो लामो समयसम्म राख्नु हुदैन । यदि राख्ने भने वातावरण प्रदूषित हुन जान्छ ।

यसै सखा रोग चरचरे, भ्यागुते, पट्के आदि जस्ता रोगहरूबाट मरेका जनावरको सिनोलाई समयमै उपयुक्त ठाउँमा नहटाउने हो र खुला ठाउँमा राख्ने हो भने यसले स्वास्थ्य जनावरलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसिमले हानि पुर्याउँछ । यस्तो भए पछि त्यो क्षेत्रमा सजिलैसग रोग फैलिन जान्छ ।

विकसित देशमा यस्तो कानुनको व्यवस्था भएको छ । जसबाट यस्तो सिनोले गुरक्षित एवं तुरन्त हटाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरी चाडै रोग फैलिन सक्ने ठाउँमा गुरक्षित मरेका जनावरको सिनो तुरन्त सुरक्षित किसिमले हटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो पट्के, खोरेत, प्लेग आदि । मरेको जनावरको सिनोलाई हटाउनु पर्ने स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने र वातावरणलाई पनि असर नपर्ने ठाउँको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिनो राखेको गोठ वा अन्य ठाउँ किटाणुनासक औषध राखेर सफाइ गर्नु पर्छ । सिनो हटाउने निम्न तरिका छन् ।

गाड्ने तरिका: सिनो गाड्दा यस्तो ठाउँको छनौट गर्नु पर्छ जहाँ सिनोको वातावरण दूषित हुने सम्भावना नहोस् । नदीनाला, नहर, पानीको झोल आदि नभएको ठाउँ हुनु पर्छ । ८-१० फिटसम्म खाल्डो खन सक्ने उपयुक्त ठाउँ हुनु पर्छ । खाल्डो जनावर(सिनो)को साइज अनुसार खन पछि खाल्डो खनिसके पछि उक्त खाल्डोमा अलिकति चुना छर्किने र ढाड र ढाँडा माथि पर्ने गरेर राख्नु पर्छ, फेरि कुनै किटाणुनासक औषधि छर्किनु पर्छ । Compact किसिमले माटोले ढाक्नु पर्छ । यस्तो ठाउँमा करीब ६ मीटर सम्म खनजोत गर्न दिनु हुदैन ।

बिसाएर नष्ट गर्ने तरिका: यो तरिका नेपालमा प्रयोगमा आएको छैन । हामी विदेशमा सिनोलाई कोइलामा जलाउने काम हुन्छ । यसकोलागि नदी किनारमा सिनोलाई ठाउँ बनाएर राखेको हुन्छ । यस्तो ठाउँमा सिनो राखेर कोइला

७८. प्रयोगशाला परीक्षणको लागि विभिन्न नमुनाहरू बुझानी एवं अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू

परीक्षण किन गर्ने, कुन-कुन नमुना संकलन गर्ने, फिल्डमा कार्य कसरी गर्ने, कसरी यति कुनै रोग त्यो क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा फैलिएको गर्दा पनि निको नभएमा तुरुन्त पशु सेवा कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने

रात, स्लाइड, विर्य, गोबर, भित्री अन्नहरू, आन्त्रा, छाँलाको नमुना ल्याउनु । गोबरलाई ६ घण्टा भित्र प्रयोगशालामा पठाउने, मलद्वाराबाट श्लिफ

गोबर नमुना पठाउने ।

Labeling:

नमूना नाम: कृषकको ठेगाना:

नमूना जात: पशुको रङ:

नमूना अवस्था: संकलन मिति:

नमूना रोग वा विवरण (History):

पशु पक्षीको अलग्गै विवरण पठाउने, नमुनालाई बरफमा राखेर पठाउनु । नमूनाको बाहिर "सावधान नमुना" लेख्नु । बुझानी गर्दा विषाणुबाट हुने रोगको लागि नमुना पठाउनु । बरफमा प्याक गरी पठाउने, बिबाणुबाट हुने रोगको नमुना पनि जहिले पनि बरफमा राखी पठाउने, सेक्सन कटिड गरी पठाउनु । पठाउने, छाँला सम्बन्धि नमुना पठाउदा कागजमा बेरेर पठाउनु ।

दाउरा, पराल, मशीन र पेट्रोलको सहायताले ५ - १० घण्टा सम्म नष्ट गीन्छ र त्यो ठाउँ माटोले पुरिन्छ । यसरी माथिका कुनै पनि तरीकाबाट सिनो तह लगाउँदा निम्न कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ:

- सिनो राखेकै ठाउँमा वा अन्य कुनै ठाउँमा सिनोको रात पिए वा पदार्थ खसेकै रहेछ भने यस्तो खिजलाई कडा किटाणुनासक औषधि गरेर नष्ट गर्नु पर्छ ।
- सिनो एक ठोड्बाट अर्को ठाउँमा लदा सो को नाक, मुख र कटनको प्त्त्यग राख्नुको साथै औषधि छर्किने गर्नु पर्छ, ताकी दाँदा किस्मको प्त्त्यार्थ क्षति नपरोस् ।
- सिनोसँग त्त्वन्पस भएका सामानहरू राशोसँग सफा गरेर किटाणुनासक छर्नु पर्छ ।
- बिरामी जन्मावरको प्रयोगमा आएका सामानहरू हटाइ दिने गर्नु पर्छ ।
- सिनो Hand Walle गर्ने सबै मानिसहरूले हातखुट्टा राशो सँग धोएर Disinfectant औषधी प्रयोग गर्नु पर्छ ।



भरेको जनावर जथाभावी नफाल्ने: भरेको जनावरलाई गहिरो खान्दोमा गाडेर खान्दोमा जुना छर्कुने पर्छ । यसले फैलाउने किटाणु मारिन्छ । यदि जथाभावी किटाणु फल्यो भने रोग फैलिन्छ ।

पशुले खोज्ने बित्तिकै भाले लगाउनु हुदैन ।

७९. उन्नत पशुपालन बारे गाउँमा प्रचार प्रसार गर्ने

अगुवा कृषक वा कार्यकर्तालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उन्नत पशुपालन तथा रोग व्याध नियन्त्रण गर्नको लागि समुदायका पशुधनीले पशुधनबाट छिटो र बढी फाईदा लिन सहयोग गर्दा, आवश्यक पर्ने प्रचारप्रसारको तरिका र महत्त्व बारे उल्लेख गरिएको छ ।

"बोल्लेको पिठो बिक्रम नबोल्लेको चामल पनि बिक्रमैन" भनिन्छ । प्रचारको महत्त्व भनेको पनि त्यही हो । गाउँमा पशुको उपचार गर्न जान्ने मान्छे छ भन्ने कुरा गाउँलेहरूले थाहा पाएनन् भने विभिन्न तालिम लिई अगुवा कृषक भएको महत्त्व हुदैन । त्यसैले सबै अगुवा कृषक ले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पशुको उपचार सेवा गर्न सक्ने भएको बारे पशुधनीहरू सबैले थाहा पाउने गरी प्रसार गर्नु पर्छ ।

प्रसार प्रचार गर्ने तरिका :

- उन्नत पशुपालन बारे प्रसार गर्ने र
- रोगव्याध नियन्त्रण बारे प्रसार गर्ने

माथिका दुवै कामको लागि ग्रामीण समुदायमा प्रसार गर्ने तरिका एउटै हुन्छ । गाउँ विकास समितिको सबै वाडैमा सेवा पुर्याउन तल लेखिएको तरिका अनुसार प्रसार गर्न सकिन्छ ।

तरिकाहरू :

- व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर ।
- समुहमा सम्पर्क गरेर ।
- धेरै जनतामा (आम) सम्पर्क गरेर ।

अगुवा कृषकले तीनवटै तरिका प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न सक्छन् । कुन माध्यमले प्रचार गर्ने र प्रत्येक तरिकाका फाइदा बेफाइदाका बारेमा तल छलफल गरिएको छ ।

व्यक्तिगत सम्पर्क गर्ने तरिकाहरू:

- कृषकको घरखेतमा भेट्न जाने ।
- कृषकलाई चिठी पठाउने ।
- टेलिफोनबाट कुरा गर्ने ।

यी तरिकाले प्रसार गर्दा ठीक र भरपर्दो हुन्छ । साथै आरिमयता बढाउने पनि हुन्छ । तर हाम्रो पहाडी समुदायमा हिडेर गर्नु पर्ने काम हिलो र खर्चिलो हुन्छ किनभने कुनै गा.वि.स.को १ नं. वार्डबाट ९ नं. वार्डमा पुग्न एक दिन भन्दा बढी समय लाग्छ ।

समुहमा सम्पर्क गर्ने तरिकाहरू:

- प्रदर्शन गरेर प्रसार गर्ने तरिका प्रदर्शन गर्ने : जस्तै गाउँको गोठबाट प्रयोगशालामा पठाउने गोबरको नमुना र मात्रा लिने तरिका प्रयोग गरेर देखाउने । नतिजा प्रदर्शन गर्ने: आफ्नो बारीको आली कालामा नेपियर र अग्रीसो घाँसको उत्पादन स्थानीय घाँस भन्दा धेरै भएको नतिजा देखाउने ।
- बडा समितिका नेताहरूलाई सम्पर्क गरी प्रसार गर्ने । पशुपालन उन्नत प्रविधि र कुनै महामारी रोगको रोकथामको लागि खोप गर्नु परेमा बडा समितिका सदस्यहरू मार्फत सम्पूर्ण गाउँमा खबर गर्न सकिन्छ ।
- भेला भिटिङमा छलफल गरेर प्रसार गर्ने । आफैले काम गर्दै आएका समुहहरूमा छलफल गरी प्रसार गर्ने । समुहमा हप्दै पिच्छे भिटिङ गर्ने र हरेक हप्ता छुट्टा छुट्टै र कृषकलाई अति आवश्यक विषयमा छलफल गर्ने । बैसीपालन कृषक गोष्ठी, प्रजननको लागि बोका छनौट गोष्ठी समुहमा गराउने । नौ वार्डमा १०० गा.वि.स. नेपियर वा अग्रीसो लगाउने र "नेपियर पर्वा" या "अमृसो पर्वा" मनाउने र हरेक वर्ष सहभागी कृषकहरूलाई नेपियर र अग्रीसो सफल क्षेत्र भ्रमण गराउने । कृषक भ्रमण आफ्नो टोल, वार्ड, गा.वि.स. र जिल्ला वाहेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सम्वन्धमा छलफल गर्ने ।

धेरै जनतामा सम्पर्क गरेर प्रसार गर्ने: अगुवा कृषकले आफ्नो गाउँघरमा सेवा गर्दा यस्तो कुरा जानकारीमा आयो । प्रजननको लागि गाउँ मै छनौट गरेको बोका ७ महिनामा ५० के.जी. तौल भयो, मासु पुष्टिएको, तन्डुस्त छ । यो नेपालमै उच्च स्तरको प्रजननको बोका मानिन्छ । त्यो बोका सम्वन्धमा अधिराज्य भिरका जनतामा तल लेखिए अनुसार प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ:

- रेडियोबाट प्रसार गर्दा सम्पूर्ण जनतामा पुग्छ ।
- पत्र पत्रिकामा छपाउनाले धेरै जनतामा पुग्छ ।
- टेलिफोनमा प्रशारण गर्दा केही जनतामा पुग्छ ।
- पोस्टरहरू बनाउने ।
- फिल्म बनाएर सबै ठाउँमा पठाउने ।
- सफलतापूर्वक पाडा फिकेको इतिहास: पाडो पाठेघरमा अड्केको कारणले माउले व्याउन नसकेर समस्या भएमा तर आफूले सफलतापूर्वक पाडो निकालेर माउ पाडा बचाएको कथा व्याप रेडियो, पत्रपत्रिका आदिबाट प्रसार गर्न सकिन्छ ।

प्रचार प्रसार गर्दा ह्याल गर्नु पर्ने कुराहरू:

- गाउँमा प्रचार गर्दा व्यवहारिक र सजिलो तरिका अपनाउनु पर्छ ।
- अगुवा कृषकका लागि उपयोगी तरिका चाही व्यक्तिगत सम्पर्क र समुह सम्पर्क हुन् ।
- कृषकहरूसँग आत्मीय सम्पर्क कायम गरी आजीवन मित्रको व्यवहार गर्नु पर्छ ।
- अगुवा कृषकले आफुले पुरा जाने बुझेको र कृषकले विश्वास गर्ने खालको मात्र कुरा कृषकको अगाडि गर्नु पर्छ ।
- कृषकहरूका व्यक्तिगत कमजोरी सार्वजनिक गर्ने दुस्प्रयास गर्नु हुँदैन । तर कृषकको प्रसंशा र सफलताको गुणगान मात्र प्रचार गर्नु पर्छ ।
- अन्तमा कृषकले अगुवा कृषकलाई एउटा पशुको सुई लगाएर पैसा कमाउने व्यक्ति वा पेशेवर कर्मचारीको रूपमा मात्र हेर्न गाउँले कृषकको साक्षत सहयोगी, सफल अगुवा कृषक र अभिन्न मित्र हो भन्ने विश्वास गर्ने चारित्र र व्यवहारको प्रदर्शन गर्नु अति जरुरी हुन्छ ।

निष्कर्ष: अगुवा कृषकले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र व्यापक प्रचार प्रसार गरेर मात्र आफू र पशु पाल्ने कृषक दुवैलाई फाइदा हुने वातावरण बनाउन सक्छन् । आफुले पशु उपचार सम्बन्धी तालिम लिएको गाउँले कृषकहरूले थाहा पाए भने मात्र ती सेवाहरू कृषकहरूले माग गर्दछन् । सेवा र औषधी समुदायमा परयाउदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले पशु सेवामा अगुवा कृषकको हैसियतले गर्न सक्ने कामहरू र आफ्नो कानु बाहिरका समस्याहरूको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र ठूला निकायमा सम्पर्क राख्नु पर्ने कुराको यथार्थता सबै मिटिड र भेलाभा भन्नु जरुरी हुन्छ ।

जिल्लाका कृषि तथा पशु विकासमा संलग्न निकायहरूका काम कारवाही बारे जानकारी लिई ती कार्यक्रमहरूबाट फाइदा लिन सिकौं ।

८०. पशु पालन तथा रोग नियन्त्रण बारे समुदायमा प्रचार प्रसार गर्ने तरिका

पशुपालक कृषकहरूमा उन्नत पशुपालन सम्बन्धि उपयुक्त जानकारी नहुँदा पशुरोग बारे जानकारी नहुँदा हाम्रो देशमा परम्परागत तरीका र अनुत्पन्न वा थोरै उत्पादन दिने खालका पशुहरू नै पालिने गरिनुका साथै पशु पक्ष लाग्ने रोगको समयमा नै उपचार नहुँदा कृषकका लगानी र परिश्रम अनर्थक प्रतिफल पाउन सिकिएको छैन । तसर्थ कृषकहरूलाई पशुपालन प्रति उत्प्रेरित गर्ने गराउन, पशुहरूको अकाल मृत्युबाट जोगाउन, पशुहरूबाट उत्पादन गराउन, पशु पालनमा सुधार ल्याउन, स्थानिय श्रोत साधनको सही परिचायक गर्न गराउन, सिकेको सिप र ज्ञान सिकाउनका साथै जीवनस्तर उकास्नसक्ने तरिकाहरू अपनाई प्रचार प्रसारको साथै जनचेतना जगाउने कार्यक्रम संचालन गरिराखेको छ । जो निम्न प्रकार छन् ।

कृषक गोष्ठी: सेवा केन्द्र, उपकेन्द्र वा विभिन्न स्तरमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूबाट कृषकहरू भेला गराई उनीहरूको समस्या एवं सामाधानका उपायहरू बारे छलफलको साथै उन्नत पशुपालन एवं रोग व्याधी नियन्त्रण जानकारी दिने गरिन्छ । यसरी सहभागी कृषकहरू आफ्नो क्षेत्रमा गई र स र कुरा अन्य कृषकहरूलाई बताउने छन् र सोही अनुसार क्रियाकलाप परिचालन गर्ने गर्दछन् ।

कृषक भ्रमण: सुनेको कुरामा भन्दा पनि देखेको कुरामा बढी विश्वास ग भएकोले कृषकहरूलाई समय समयमा विभिन्न क्षेत्र वा ठाउँहरूको स्थल भ्रमण गराउँदा कृषकहरूमा राम्रो प्रभाव पर्न सक्छ ।

कृषक तालिम: कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्रले र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले आयोजना गरी उनीहरूले उन्नत पशुपालन प्रति बढी अभिन्धिव जगाएर र पशु रोग बारे जानकारी कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको छ । कृषकहरूलाई ग्रामिण अगुवा कृषक तालिम गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर कुखुरा पालन सम्बन्धि तालिम दिने गरिन्छ । यसका साथै उन्नत घाँसेबातीहरूका बीउ र बेर्ना पनि गरिन्छ । यो पनि प्रचार प्रसारको एक भन्दा राम्रो पक्ष हो ।

नतिजा प्रदर्शन: परिणाम देखाएर जस्तै: घाँसको बीउ छरी त्यसको नतिजा प्रकाशन गरेर पनि प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ तथा उन्नत जातका पशु वितरण गरी त्यसको उत्पादन देखाएर चेतना बढाउन सकिन्छ ।

उत्पादन प्रदर्शन: कुनै नयाँ कुराको प्रयोगबाट उत्पादनमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुरा उत्पादन गरेर देखाउन सकिन्छ । जस्तै: सन्तुलित दाना आदि खुवाएर दूधमा उत्पादन भएको वृद्धि हेर्न सकिन्छ । जसबाट कृषकहरू अभिप्रेरित भएर पशुहरूलाई सन्तुलित दाना खुवाउने बानी लाग्दछ र उन्नत नशलको उत्पादन तुलना गर्न सकिन्छ ।

रेडियो: रेडियो जनसमुदायमा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा प्रमुख साधन हो । विभिन्न रोग व्याधि वा उन्नत पशुपालन बारे रेडियोबाट विज्ञापन वा कार्यक्रमहरू नै दिएर पशुपालक कृषकहरूलाई जानकारी गराउन सकिन्छ ।

टेलिभिजन: टेलिभिजनबाट विभिन्न व्यवस्थित ठाउँहरूका बारेमा प्रत्यक्ष प्रसार गरेर र रोग व्याधिका बारेमा कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेर ग्रामीण जनसमुदायमा प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ ।

भिडियो: विभिन्न ठाउँहरूमा भएको सफल कार्यक्रमहरूको भिडियो रेकर्डिङ गरी भिडियो रोग सम्बन्धि वा उन्नत पशुपालन सम्बन्धि जस्तै: उन्नत तथा रोगबाट भएका र हुने क्षति बारे फिल्म बनाई कृषकहरूलाई भेला गराई त्यसबारेको डकुमेन्ट्री फिल्महरू देखाई प्रचार प्रसार गर्ने हाल नयाँ प्रविधिको रूपमा विकास भएको छ र यसबाट पनि कृषकहरूमा जनचेतना जगाउने गरिन्छ ।

पोस्टर: विभिन्न रोग सम्बन्धि वा उन्नत पशुपालन सम्बन्धि जस्तै: उन्नत खालका बाख्रा पालन वा बांगुरपालन वा पशु आहारा सम्बन्धि चित्रहरू बनाई वा लेखनहरूको पोस्टर बनाई विभिन्न ठाउँमा टाँसी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ ।

पम्प्लेट: कुनै रोग वा खोप वा यस्तै अन्य कुराहरूको बारेमा छोटकरीमा सफासुथ सवै जानकारीहरू समावेश गरी पम्प्लेट तयार गरिएको हुन्छ । उक्त पम्प्लेट विभिन्न समुदायमा वितरण गरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ ।

बुकलेट: यो किताबको सानो रूप हो । यसमा पम्प्लेटको भन्दा थपि बढी जानकारीहरू राखिएको हुन्छ । यो पनि कुनै विषयमा लेखिएको हुन्छ । यस्ता बुकलेटहरू वितरण गरी कृषकहरूको ज्ञान र सिपमा वृद्धि गरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ । यसको अलावा पशु सेवा विभागबाट विभिन्न तरीकाहरू अवलम्बन गरी प्रचार प्रसार कार्य संचालन गर्ने गरिन्छ । जस्तै: कृषकहरूका समूहगत रूपमा कार्यक्रमहरू गरेर पनि जनचेतना जगाउने वा प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

८१. नुन तथा खनिज पदार्थको द्रव्यकाको प्रयोग

पशुको शरीर रचनामा नुन र खनिज पदार्थले भाग लिएको हुन्छ भनी पहिले नै बयान गरियो । दूध, फल, मासु, बनाउन नुन र खनिज पदार्थहरू पशुलाई चाहिन्छ । त्यस्ता खनिज पदार्थहरू मात्र दिनु भन्दा मिसाएर द्रव्यका बनाएर पशुको इच्छा अनुसार चाट्न दिनु राम्रो हुन्छ । एउटा खनिज तत्वले शरीरमा गर्ने काम अर्को खनिजले गर्न सक्नेन ।

पशुलाई नुन तथा खनिज चाहिने कारणहरू: रगत, मासु, हाड, दूध र फुल सबै नुन तथा खनिजले बनेका हुन्छन् । नुन तथा खनिजले प्राणीलाई अस्थीय र क्षारीय हुनबाट बचाउँछ । शरीरमा नसन बढी भएको भागातिर पानी Osmosis थिने कारणहरूलेगार्दा बढ्ने हुर्कने र दूध, फुल उत्पादन गर्ने पशुपंक्षीलाई नुन तथा खनिज पदार्थ नभै हुदैन।

गार्डको दूधमा नुन र खनिज भएको प्रमाण: दूधलाई लगातार उमाले पछि कुराउनी वा खुवा बन्छ । खुवा वा कुराउनीलाई आगोमा पोलेपछि खरानी बन्छ । त्यस खरानीलाई दूधको खरानी Milk Ash भनिन्छ । दूधको १०० ग्राम खरानीमा पाइने खनिजहरूको मात्रा तल दिइएको छ।

गार्डको दूधको १०० ग्राम खनिजको बनावट:

• पोटास (Potash)	२९.० ग्राम
• चून (Lime)	२०.० ग्राम
• सोडा (Soda)	७.० ग्राम
• म्याग्नेसिया (Magnesia)	३.० ग्राम
• फलाम (Iron oxide)	०.५ ग्राम
• फस्फोरिक एसिड (Phosphoric Acid)	२९.० ग्राम
• नुन (Choline)	१४०० ग्राम

पशुको शरीर रचनामा भाग लिने खनिजहरू: पशुलाई चाहिने मात्राको आधारमा नुन तथा खनिजहरूलाई दुई भागमा बाँडिएको छ:

क) धेरै चाहिने (Macro Minerals) जस्तै:

	आहाराको %
क्याल्सियम (Calcium) प्रतिदिन दूध दिने गार्डलाई	०.४३
फस्फोरस (Phosphorus)	०.३९
सोडियम (Sodium)	०.१८

पोटासियम (Potassium)	०.३०
क्लोरोन नुन (Chlorine)	२०.०
म्याग्नेसियम (Magnesium)	०.३०
गन्धक (Sulphur)	

ख) थोरै वा कम चाहिने (Micro minerals) जस्तै:

फलाम (Iron) रात बनाउछ, बढाउछ	PPM
ताँबा (Copper)	०.५०
कोबाल्ट (Cobalt)	०.१०
आयोडिन (यास्लिसियम र फस्फोरसको प्रयोग गर्छ र लुलो लंगडो हुनबाट बचाउछ ।)	०.५०
म्यान्गानिज (Manganese)	०.४०
जस्ता (Zinc)	४०.०
सेलेनियम (Selenium)	०.१०
मोलिब्डेनम (Molybdenum)	एकदम कम
फ्लोरिन (Fluorine)	एकदम कम

थेरै चाहिने खनिज दानाको ०.८० प्रतिशतसम्म चाहिन्छ । थेरै चाहिने खनिज दैनिक आहारको १० लाख भागको ५० सम्म मात्र पनि पुग्छ । वासपातमा, पाइने नुन पशुलाई कम हुन्छ । नल, पराल, जंगली घांस, डालेघांस, दाना, दानापानीमा माथि लेखिएका सबै किसिमका खनिज लक्षणहरू पाइन्छन् । तर पशुलाई दैनिक चाहिने जति मात्रामा घांसबाट मात्र खनिज तत्वहरू पाउन सकिने किनभने घांसपातमा नुनको मात्रा साह्रै कम हुन्छ । त्यसैकारण हाम्रो गाउँघरका पशुपक्षीहरू दुब्ला, कमजोर, रोगी भै कम दूध, मासु, फुल उत्पादन दिने हुन्छन् ।

पशुको शारीरिक अवस्था स्वस्थ राखी बढी उत्पादन लिन नुन तथा खनिज पदार्थको ठिकठा घरमै बनाई आफै खुवाउनु र ठिकठा बनाउने प्रविधि अरुलाई पनि सिकाउनु आवश्यक छ ।

खनिज नुन ठिकठा बनाउन चाहिने सामानहरू:

- रातो माटो एक माना
- 'आयो' नुन एक माना
- कुबुराको फुलको बोका ५ गोटा
- पानी २ माना जति ।



भिनरल ठिका चटाउंदा भोक जाग्य ।

खनिजको ठिकठा तयार गर्ने तरिका:

- रातो माटो एक माना, रातो माटोको खानी वा करिब एक मीटर गहिरो खाडल मुनिको प्रदूषण रहित माटो ल्याई राम्ररी छानेर मसिनो माटो एक माना भरेर नाइलोमा राख्ने ।
- आयोडिन एक माना भरेर नाइलोको एक कुनामा राख्ने ।
- पाँच वटा कुबुराको फुलको खोस्तलाई आगोमा पोलेर बनाइएको खरानी (एक चम्चा जति हुन्छ) कागजमा राखेर नाइलोको एक कुनामा राख्ने ।
- अण्डाको खरानी भएको कागजमा एक एक मुठी रातो माटो र नुन राम्ररी फिजाएर मिसाउने ।
- अब नाइलोको बीचमा एक एक मुठी माटो र आयोडिन पालैपालो एक माथि अर्को पर्ने गरी फिजाउने । हरेक मुठी पछि एक चिम्टी अण्डाको खोस्ता मिसाएको मिश्रण पनि थप्दै जाने ।
- दश पटकसम्म मुठी गरेर माटो र नुन अनि अण्डाको मिश्रण, माटो, खरानी र नुन) पत्रेपत्र गरेर राख्दा एकनासले मिसाउन सकिन्छ ।
- दुवै हातले राम्रोसँग मिसाउने गरी ५ मिनेटसम्म चलाई रहने ।
- बढी गोलो हुने गरी पानी मिसाएर मुख्ने
- सुक्ने खालको आकारको (इटा जस्तो) बनाएर ४-७ दिनसम्म घाममा सुकाउने ।
- गाई वस्तुले आफ्नो इच्छा अनुसार चाट्न सजिलै गरी ठिकठा भुण्डाउने वा काठको या माटोको आरीमा (भाडोमा) राखी चाट्न दिने ।

मिश्रण १:

- एक भाग फ्लोरिन निकालिए कोफफेटको चट्टान,
- दुई भाग हाडको चोक्रा (पोलेको हाडको धुलो)
- दुई भाग आयोडिन युक्त नुन (वा देस भिनरल साल्ट)

मिश्रण २:

- हाडको धुलो र आयो जुन
- आयोडिन (वा) देस भिनरल साल्ट वा साधारण जुन)
- दुबै बराबर किसाउने

४ के.जी. काठको खरानी दिने:

- १ के.जी. आयोडिन युक्त जुन (वा) देस भिनरल साल्ट)
- सबै मिश्रण आफुखुसी खान दिने ।

केही नपाउने ठाउँमा काठको धुलो १ विद्या चम्बा प्रति ४० के.जी. शारीरिक तौलको हिसाबले दानामा मिसाएर प्रति दिन विषालु रखको खरानी नदिने ।

केही पशु आहारारुका पौष्टिक तत्वहरू

क्र.सं.	विवरण	पञ्ज सक्ने काँचो प्रोटिन (D.C.P.)%	पुरा पञ्ज सक्ने तत्व (I.D.N.)%	क्याल्सियम %	फस्फोरस %
क	धानको पराल भुसा	०.००	०.००	४०.०	४३.०
	गाह्रको भुसा	०.३३	०.३३	०.०७	०.०७
	काठको मकैको टुप्पा	२.६७	१.१७	११.५	१७.०
ख	बरासम	०.३२	०.१०	०.०६	०.०७
ग	अन्न र भुस				
	जौ दाना	७.१०	७.०७	५.०	७०.६
	मकै	०.०७	०.१२	०.२८	०.३३
घ	तेलबाली र पीना				
	आलसको पीना	२५.८३	४१.५५	५१.८	५१.०
	बदामको पीना	०.४९	०.०८	०.८९	०.२३

रासायनिक औषधीहरूको प्रयोगा
सकेसम्म कम गरौं ।

८२. पशु स्वास्थ्यमा खनिज तत्व तथा भिटामिनहरूको महत्त्व

पशुहरूलाई जिवित राख्न र पशु जन्म पदार्थको उत्पादन लिन नभई नहुने पदार्थहरू: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिल्लो पदार्थ, खनिज तत्व, भिटामिन, भिनरल र पानी हुन् ।

पशु स्वास्थ्यमा खनिज तत्वको महत्त्व:

- क्याल्सीयम तथा फस्फोरस जस्ता खनिज तत्वले हाडको निर्माण गर्दछ र शरीरलाई स्थिरता प्रदान गर्दछ ।
- शरीरमा रहेको तरल पदार्थलाई सन्तुलन गर्न सोडियमको आवश्यकता पर्दछ।
- गर्भिणी पशुलाई आयोडिनको सन्तुलित मात्राको आवश्यकता हुन्छ ।
- यस बाहेक शरीरलाई अन्य माइक्रोन्युट्रिएन्टको आवश्यकता पर्नेहरूमा पोटासियम, म्याग्नेसियम, सल्फर, आइरन, कपर, कोबाल्ट, म्याग्निज, सेलेनियम र जिङ्क हुन् ।
- क्याल्सीयम र फस्फोरसको अनुपात रासनमा २:१ हुनु पर्छ र यसको मात्रा पूर्ति गर्न कोसे घाँस प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्छ । बोनमिल र थप कमर्सियल क्याल्सियम र फस्फोरस समेत दानामा थप गरी पशुलाई खुवाउने गरीन्छ । क्याल्सियम र फस्फोरसको कमिले तत्काल नै पशु जन्म पदार्थमा कमि आउँछ, जस्तै: दूधमा कमि ल्याउँछ वा हाइपोक्याल्सिमिया (मिल्क फिबर) जस्ता रोग ल्याउँछ भने पछि गएर ओस्टियोरोसिस, ओस्टियोपेट्रोसिस जस्ता हानि कमजोर हुने रोग देखा पर्छ र पशुहरूको शारीरिक विकासमा समेत असर पर्दछ ।
- आयोडिनको आवश्यकता मुख्यतया थायरोक्सीन रलान्डको सुचारु राख्न आवश्यक पर्छ । थायरोक्सीनको सन्तुलनले मेटाबोलिक प्रक्रिया, शारीरिक वृद्धि, प्रजनन प्रणाली, दुध उत्पादन जस्ता प्रक्रियामा पदार्थ पुर्नदछ भने यसको कमिले नवाइटर (गला फुल्ने) जस्ता रोग देखा पर्छ । यसको कमिले निर्मूल गर्न नुनमा ०.०१ आयोडिन मिसाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- सामान्य रसिनल मेटाबोलिज्मको लागि कोबाल्टको आवश्यकता पर्दछ । यसको कमिले रसेनमा पाइने फाइटाजनक व्याक्टेरिया पर्दछ, जसले गर्दा भिटामिन बी १२ बनाउने प्रक्रियामा कमि आउँछ ।
- कपरको आवश्यकता इनजायम संचालन, रौ र छालाको मेन्टेनेन्स गर्न र नर्भस तन्तुहरूलाई सामान्यतया सुचारु राख्नमा पर्दछ ।
- पशुहरूमा म्याग्नेसियम तत्वको कमिबाट हाइपोम्याग्नेसियम टेटानी (ग्रास टेटानी) जस्ता रोग लाग्दछ । यसलाई ल्याक्टेशन टेटानी पनि भनिन्छ ।
- फस्फोरस तत्वको कमिबाट हुने रोगलाई हाइपोफोस्फेटेमिया वा हेमोग्लोबोनेरिया भनिन्छ ।

पशु स्वास्थ्यमा भिटाभिनको महत्त्व

पशुलाई स्वस्थ राख्न, शारीरिक वृद्धि र प्रजनन कार्यको लागि भिटाभिनको अति महत्त्वपूर्ण स्थान छ । आहारमा भिटाभिनको कमी भएमा एभिटाभिनोसिस लाग्दछ ।

रासायनिक दृष्टिकोणले भिटाभिनलाई २ भागमा बाँडिएको छ:

- चिल्लो पदार्थमा घुल्ने (फ्याट सोलुबल) भिटाभिन: भिटाभिन ए, डी, ई, के ।
- पानीमा घुल्ने (वाटर सोलुबल) भिटाभिन: बी वर्गका भिटाभिन र भिटाभिन सी:
 - भिटाभिन "ए" आँखा र पाचन अङ्गको तालुहरूलाई मजबुत राख्न, शारीरिक वृद्धि र प्रजननको लागि आवश्यक पर्दछ । यसको कमी भएमा रतन्धो हुन्छ ।
 - भिटाभिन "डी"ले क्याल्सियमलाई शरीरमा ग्रहण गर्ने कार्य गर्दछ, यसले गर्दा शारीरिक वृद्धिमा समेत मद्दत पुग्दछ । यसको कमीले रिकेट्स लाग्दछ ।
 - भिटाभिन "ई"ले प्रजनन क्षमता तथा छाला रौलाई तन्दुरुस्त राख्नमा मद्दत गर्दछ ।
 - भिटाभिन "के"ले रगत जम्न मद्दत गर्दछ ।
 - साधारणतय पशु वस्तुमा भिटाभिन "बी" कम्प्लेक्स रमेनमै बन्ने हुँदा त्यति कमी हुँदैन तर सप्लीमेन्ट डोज नहिँदा वा खीमल प्रक्रियामा कमजोरी हुँदा यसको कमीले पशु बिरामी हुन सक्दछ ।
 - थायामिन (B1) को कमीले शारीरिक कमजोरी हुने गर्दछ ।
 - राइबोफ्लोभिन (B2) को आवश्यकता स्नायु प्रणाली सुचारु राख्न, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीन मेटाबोलिज्म चालु राख्न र दूध उत्पादन गर्नमा पर्दछ ।
 - पेन्टोथोनिय एसिड (Vitamin B6): यो भिटाभिन छाला र शारीरिक वृद्धिको लागि आवश्यक पर्दछ ।
 - साइनोकोबालामाइन (Vitamin B12): यो भिटाभिन हेमोग्लोबिन उत्पादन गर्न, प्रोटीन मेटाबोलिज्म, शारीरिक वृद्धिको लागि चाहिन्छ ।
 - निकोटिन एसिड: पशुलाई स्वस्थ राख्न, शारीरिक वृद्धि गर्न यसको आवश्यकता पर्दछ ।
 - कोलीन: हाडको विकास गर्न र चिल्लो पदार्थ मेटाबोलिज्मको लागि कोलीन चाहिन्छ ।
 - भिटाभिन "सी" को आवश्यकता हाडको विकास गर्न, चिल्लो पदार्थ मेटाबोलिज्मको लागि चाहिन्छ ।

द३. पशु स्वास्थ्यमा विभिन्न पोषक तत्वहरूको महत्त्व

संसारमा पाइने जुन सुकै प्राणी आहार बिना बच्न सक्नेन । आहार प्राणीव लागि नभई नहुने तत्व हो । आहारमा विभिन्न पोषक तत्वहरू रहेका हुन्छन् । ती पोषक तत्वहरूले शरीरका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । एउटा कुनै आहारलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा त्यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण तत्वहरू देखिन्छन् ।

उपरोक्त तत्वहरू आहार निहित रहेका हुन्छन् । यिनीहरूको महत्त्व बारे त चर्चा गरौ ।

पानी: यो शरीरको लागि आवश्यक पर्ने आहारमा ८०% सम्म रहेको हुन्छ पानी बिना शरीरको प्रमुख रक्त सञ्चालन देखि अन्य शारीरिक क्रियाकला सञ्चालन हुन सक्नेन । पानीले शरीरमा निम्न कार्यहरू गर्दछ:

- शरीरको रक्तसञ्चालन सहित अन्य अत्यावश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ
- शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्दछ ।
- शरीरमा पाचन क्रिया बनाउने, निस्ले, अवशोषण गर्ने कार्य गर्दछ ।
- अक्सिजन, कार्बोहाइड्रेट, हर्मोन आदिको ढुवानी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ
- दूध, फुल, मासु उत्पादन गर्दछ ।
- शरीरमा काम नलाग्ने पदार्थ मलमुत्रको रूपमा बाहिर फाल्दछ ।

पानीका श्रोत:

- पिउने पानीका श्रोतहरू इनार, कुवा, धारा आदि ।
- आहारमा रहेको पानी ।
- शरीरको Metabolism (पाच्य) हुँदा निस्कने पानी ।

प्रोटीन: प्रोटीनको श्रोत नाइट्रोजन हो । नाइट्रोजनबाट नै प्रोटीन प्राप्त हुन्छ नाइट्रोजन प्रोटीन युक्त पदार्थहरू प्रोटीन नभएका पदार्थहरूबाट बनेको हुन्छ यी प्रोटीनहरू विभिन्न एसिडबाट बनेका हुन्छन् । यसरी धेरै एमिनो एसिडबाट प्रोटीन बन्दछ, धेरै प्रोटीनबाट नाइट्रोजन बन्दछ । शरीरमा पाच हुँदा सिधै प्रोटीन पचन सक्नेन, एउटा एउटा मसिनो एसिडहरू मात्र पाच हुन्छ । यी एमिनो एसिड शरीरको लागि नभई नहुने हुन्छन् । यिनीहरू मध्य कुनै कुनै अति आवश्यक हुन्छन् । यस्ता अत्यावश्यक एमिनो एसिडलाई Essential Amino Acid भनिन्छ । यी एमिनो एसिड कुखुरा, बगुर जस्तै जनावरले शरीरमा तयार गर्न सक्नेनन् । त्यसैले यिनीहरूको आहारमा अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ ।

ती एमिनो एसिड निम्न छन्:

- आर्गिनाइन
- लुसाइन
- फिनायलानिन
- थायलिन
- हिस्टाडिन
- लाइसिन
- थियोलिन
- आइसोलुसिन
- मेथियोनिन
- ट्रिप्टोफ्यान


अन्य प्रकारका एमिनो एसिडहरू पनि छन् तर तिनीहरू त्यति आवश्यक छैनन् । तिनीहरूलाई Non-Essential Amino Acids भनिन्छ । यी Non Essential Amino Acids पशु वस्तुले शरीरमै तयार गर्न सक्छन् । त्यसैले यी एसिडलाई आहारमा दिई राख्नु आवश्यक पर्दैन ।

प्रोटिनको कार्य:

- दूध, फुल, मासु उत्पादन गर्न (प्रोटिनको अभावमा उत्पादन हुन सकैन) ।
- ईन्जाइन हर्मोनको सन्तुलन गर्न ।
- पुराना कोष तथा तन्तुहरूको पुननिर्माण गर्न ।

प्रोटिनका श्रोतहरू:

- वनस्पति जन्य पदार्थ: घासपात ।
- पशु जन्य पदार्थ: दूध, फुल, माछा, मासु ।
- कृषि जन्य पदार्थ: तिल, बदाम, भटमास, चना ।



शक्ति र प्रोटिनको बँटौट

चिल्लो: आहारमा चिल्लोलाई Lipid भनिन्छ । यसले शरीरमा तापक्रम नियन्त्रण, शरीरका प्रमुख अङ्गको सुरक्षा, शक्तिको संचय, शक्तिको श्रोतको रूपमा काम गर्छ ।

श्रोतहरू:

- पशु जन्य चिल्लो: दूध, फुल, माछा, मासु ।
- कृषि जन्य पदार्थ ।
- वनस्पति जन्य पदार्थ ।

कार्बोहाइड्रेट: शरीरमा कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्न शक्ति चाहिन्छ । शरीरका भित्री अङ्गहरू संचालन गर्न तथा शारीरिक कार्य गर्न शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति कार्बोहाइड्रेटबाट प्राप्त हुन्छ । कार्बोहाइड्रेट सजिलै पाचन हुने तथा ढिला टुकिएर पाचन हुने आधारमा कार्बोहाइड्रेट निम्न प्रकारका छन्:

- मानो साकाराइड (Mono Saccharide): यिनीहरूमा एउटै अणु रहेको हुन्छ । त्यसैले शरीरमा छिटो र सजिलै शोषण हुन्छन् । ग्लूकोज, फ्रुक्टोज यसका उदाहरण हुन् ।
- डाई साकाराइड (Di-Saccharide): यिनका मोलिक्युल २/२ वटा जोडिएर रहेका हुन्छन् । ग्लूकोज, माल्टोज यसका उदाहरण हुन् ।
- पोलि साकाराइड (Poly-Saccharide): यसलाई Starch/Fibre गरी २ भागमा बाडिएको छ । यिनीहरू मध्ये Starch मा कम रेशा तर Fibre मा धेरै रेशायुक्त आहारहरू पर्दछन् । यिनमा धेरै मोलिक्युलहरू एक आपसमा जोडिएर बसेका हुन्छन् ।

कार्बोहाइड्रेटका श्रोतहरू:

- बालीजन्य पदार्थहरू: मकै, गहुँ, धान, मुला, आलु, चामल ।
- वनस्पतिजन्य पदार्थहरू: धान, पराल, गहुँका उप पदार्थ ।
- उपरोक्त तत्वहरू बाहेक अन्य पदार्थमा पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छन् ।
- भिटामिन: चिल्लोमा घुल्ने A, D, E, K.
- पानीमा घुल्ने समुपार्ग B भिटामिन र C भिटामिन ।
- मिनरल:

0 क्याल्सियम	0 जिङ्क	0 पोटासियम
0 मोलिब्डिनम	0 सोडियम	0 सेलेनियम
0 कपर	0 नाइट्रट	0 क्लोरिन
0 फस्फोरस	0 आइरन	0 म्याग्नेज
0 म्याग्नेसियम		

८४. हरियो घासको आपूर्तिका लागि कृषि वनको महत्त्व र उपयुक्त जालेघासहरू

नेपालमा उन्नत पशुपालन व्यवसाय केही वर्ष यतादेखि निकै नै फस्टाउँदै गैरहेको छ । पशुको जीवन निर्वाह वा तिनबाट राम्रो उत्पादनको लागि उचित आहाराको व्यवस्था हुनु पर्छ । हामी कहाँ प्रयोग हुने आहारा कृषि जन्तु उपपदार्थ जस्तै: पुराल, भुसा, नल, मकैको ढोड, घानको ढुटो, तेलको पिना आदि र चरन क्षेत्रका चराउने हरियो भुईँ घास, डाले घासहरू नै हुन् । यी कृषि जन्तु उपपदार्थ पशुलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक पदार्थ निकै नै कम हुन्छ । यिनले पशुलाई टम्म पेट अघाउने काम मात्र गर्दछन् । पशुलाई सबैभन्दा राम्रो आहारा भनेको हरियो घास नै हो । यसमा पशुलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक पदार्थहरू पाइनुका साथै उत्पादन लागत कम पर्छ ।

नेपालमा हरियो घासको खेती अन्य देशको दाजोमा निकै नै कम छ । नेपालमा घासखेती खेती योग्य जमिनको २ प्रतिशत रहेको छ । जब कि अन्य विकसित राष्ट्र अमेरिकामा खेती योग्य जमिनको ३५ भागमा घास खेती, न्युजिल्याण्डमा खेती योग्य जमिनको ९० भागमा घास खेती, भारतमा खेती योग्य जमिनको ५ भागमा घासखेती गरिन्छ । नेपालमा पनि बिगत वर्ष भन्दा हाल उन्नत जातका गाई कभैसी पालिएका ठाउँहरूमा हिउँदमा: जै, वर्षिम, भेक्स वर्षायाममा: मकै, बोडी, टियोसेन्टी, ज्वार, एम.पी. चरीस बहुवर्षे: नेपियर, स्टाइलो, मोलासेस, कुडजु आदि घासखेती गरिन शुरु गरिएता पनि अझै पनि हाम्रा अधिकतर पशु कृषि जन्तु उपपदार्थ र वनका डाले घासमै निर्भर छन् । पशुपालन व्यवसाय हाल वनमै आधारित रहेको छ । बिहान वनमा लगी दिन भरि चराई साँझ केहि स्याउला दिएर पशुपालन गरिएको छ । त्यसैले उत्पादन पनि निकै कम छ । पशुलाई आवश्यक सन्तुलित आहारा त परै जाओस, पेट भरी हरियो घास पनि दिन सकेका छैनौ । हामीले हाम्रा पशुबाट राम्रो उत्पादन लिन सन्तुलित दानाको साथै हरियो घास पनि प्रसस्त मात्रामा दिनु पर्दछ । सधै हरियो घासका लागि निम्नानुसारको घास खेती गर्नु पर्दछ ।

हिउँद जै, वर्षिम, भेक्

वर्ष टियोसेन्टी, मकै, बोडी, बाजरा, जुनेलो (ज्वार), सुडान आदि । बहुवर्षे सेटारिया, स्टाइलो, नेपियर, डेसोडियम, अप्रिसो, सेतो क्लोभर, राई घास आदि ।

डालेघासहरू: इपिल-इपिल, बडहर, बाँस, कोइरालो, टाकी, भिमल, कुटभियो, किम्बु आदि ।

इपिल-इपिल: पशु आहारको लागि डालेघासहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो यसलाई मानिन्छ । २५-३० जति कच्चा प्रोटिन र ५५-७० कुल पाचनीशिल तत्वहरू हुन्छन् । डालेघास खाने पशुहरू गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा आदि मानिन्छ ।

- बीउ संकलन: माघ महिना ।
- बीउ छर्ने समय: वैशाख दोश्रो हप्ता - यसको बीउ निकै नै कडा हुने हुनाले बीउ पोलिथिन ब्यागमा राख्नु अगावै बीउको उपचार गर्नु पर्छ । बीउलाई कपडामा पोको पारी उम्लेको पानीमा एकै छिन चोबी निकाल्ने र त्यस पछि २४ घण्टा जति चिसो पानीमा डुबाएर राखी दिने र त्यस पछि पोलिथिन ब्यागमा रोप्ने ।
- नर्सरी अवधि: प्रत्येक ब्यागमा २/२ दाना राखी बीउ उमार्ने र उम्रिसके पछि २/३ महिनामा सार्ने लायक हुन्छ ।

बडहर: डालेघास मध्ये यो उपयुक्त डालेघास मानिन्छ । यो घास विशेष गरी गाई, भैँसी, भेडा, बाख्राले खाने गर्दछन् । बडहरको प्रयोग काठ, घाँस र फल प्रमुख हुन् ।

- बीउ संकलन: श्रावण महिना ।
- बीउ छर्ने समय: श्रावण, भाद्र । बीउ छर्नु भन्दा पहिला बीउलाई फलबाट निकाली पोलिथिन ब्यागमा रोप्नु पर्दछ । पोलिथिन भर्दा एक भाग गोबर एक भाग बाजरा र दुई भाग माटो मिसाउनु पर्दछ र एउटा ब्यागमा २/३ बटा बीउ रोप्नु पर्छ ।
- नर्सरी अवधि: ११ महिना ।
- उत्पादन: ४ वर्ष पछि पहिलो कटाई गर्न सकिन्छ । ६०-२०० किलो ग्राम प्रतिवर्ष घास प्राप्त हुन्छ ।

कोइरालो: यो घाँस गाई, भैँसी, भेडा, बाख्राका लागि लगाइन्छ ।

- बीउ संकलन: फागुन देखि आषाढ ।
- बीउ छर्ने समय: चैत्र, वैशाख ।
- बीउ उपचार: २४ घण्टा चिसो पानीमा भिजाएर प्रत्येक पोलिथिन ब्यागमा २/२ दाना बीउ रोप्ने ।
- नर्सरी अवधि: ६ महिना ।

टाकी: यो काइरालो जस्तै तरीकाले लगाइन्छ, स्वभाव, विरवाबाट उत्पादन पनि कोइरालो जस्तै हुन्छ ।

कुटीमिरो: यो घांस गाई, बैसी, भेडा, बाघा आदि पशुले मन पराएर खान्छन् ।

- बीउ संकलन: जेठको दोश्रो हप्ता ।
- बीउको उपचार: चिसो पानीमा भिजाएर नर्सरी पोलिथिनमा रोच्ने ।
- नर्सरी अवधि: लगभग १ वर्ष ।
- उत्पादन: १०-८० कि.ग्रा. प्रति बोट प्रति वर्ष ।

जान्नु पर्ने कुराहरू:

- गाई तीन पटक दुध दुहुँदा दुई पटकमा भन्दा बढी दुध उत्पादन हुन्छ तर बैसीमा यस्तो हुँदैन ।
- हरियो घांसपात उत्पादन लागत कम हुन्छ ।
- चारा बदल्दा विस्तारै बदल्नु पर्छ अन्यथा पशुलाई अपच हुने सम्भावना रहन्छ ।
- दुसी लागेको दाना (आहारा) पशुलाई खुवाउनु हुँदैन ।
- यदि पशुलाई खुवाउँदा फाइदा हुने तर पशुले खाइरहेको छैन भने ५ सिरा मिसाइ दिला राम्ररी खान्छ ।
- दुध दिने पशुलाई प्रति ३ लिटर दुध बराबर १ किलो ग्राम दाना थप दिनु पर्ने हुन्छ ।

प्रांगारिक पदार्थहरूको प्रयोगमा जोड दिऔं ।

परिचय: नेपालमा पशु विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न पशु विकासका अन्य कार्यक्रमहरूको साथै पशु आहाराको विकासलाई पनि संग संगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । एका तिर देशमा पशु आहाराको ठुलो कमी छ भने अर्को तिर तिब्र रूपमा पशु जन्म पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गराइनु पनि आजको आवश्यकता हो । पशु उत्पादनमा वृद्धि गराउन पशु आहाराको क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ र यो सुधार ल्याउनको लागि चरन तथा घाँसे बालीको विकासमा बढी जोड दिनु समायोजित हुन्छ ।

वर्षीम खेती: हिउंदै याममा घाँसको कमिले गर्दा पशुवस्तुहरूको शारीरिक अवस्था र दुध उत्पादनमा ह्रास आएको पाइन्छ । हिउंदको सुख्खा सिजनमा हरियो घाँस खुवाउन सकेमा पशुवस्तुलाई स्वस्थ राख्न र दुध उत्पादन समेत बढाउन सकिन्छ । त्यसैले कोशे घाँसको रूपमा रहेको वर्षीम घाँस हिउंदमा हरियो हुने, सजिलै संग पशुवस्तुले पचाउन सक्ने र यसमा पोषिलो तत्व समेत रहेको एवं सबै पशुवस्तुले रचाएर खाने हुनाले खेतमा यो वर्षीम घाँस लगाएर राम्रो उत्पादन प्राप्त गरी फाइदा लिन सक्दछौं । यस घाँसमा प्रोटीन, क्याल्सीयम र पोटासियम तत्वहरू पनि पाइन्छन् । यस घाँसको जरामा स-साना भिर्वाहरू हुन्छन् । ती भिर्वाहरू भित्र सुक्ष्म जिवाणुहरूले बायुमण्डलबाट नाइट्रोजन लिई नाइट्रोजनलाई स्थिरीकरण गरेर भिर्वा भित्रै भईन्छन् । उक्त नाइट्रोजन विरुवाले प्रयोग गरी बाँकी रहेको नाइट्रोजन जति सबै माटोमा रहने भएको कारणले गर्दा वर्षीम लगाएको खेतको माटोमा पनि मलिलो पन रहन्छ । यस घाँसको उत्पत्ति इजिप्ट भन्ने देशमा भएको कारणले गर्दा यस घाँसलाई इजिप्शियन क्लोभर पनि भनिन्छ ।

वर्षीम खेती कस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ ?

यो घाँसले हिउँ तथा बढी तुसारी सहन सक्दैन तर कम तुसारी पर्ने ठाउँहरूमा सिँचाईको व्यवस्था गर्न सकेमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । यो घाँस समुन्द्रको सतह देखि १२०० मिटर सम्मको उचाईमा राम्रो संग गर्न सकिन्छ । यो घाँसको खेतीका लागि दोस्रो माटो सबभन्दा राम्रो हुन्छ तर सिँचाईको राम्रो व्यवस्था भएमा चिम्टाइलो र बलौटे माटोमा पनि गर्न सकिन्छ ।

जमिनको तयारी: वर्षीम घाँसको बीउलाई धान बाली भएकै जग्गामा लगाउने हो भने खेतलाई खनजोत गरी राख्नु पर्दैन । यदि असोज - कार्तिक महिना तिर छर्ने हो भने धान लगाएको खेतमा हल्का सिँचाई गरेर बीउ छरिदिए हुन्छ । तर धान नभएको खेतमा लगाउने हो भने १ - २ पटक खनजोत गरी माटोलाई बुर्बुराउदो बनाएर जमिन तयारी गर्नु पर्दछ ।

मलखाद: मलको प्रयोग गर्नाले घाँसे खेती राम्रो हुने भएकोले यसको खेतीमा मलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । वर्षीम घाँसले सुक्ष्म जिवाणुको माध्यमद्वारा वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन प्राप्त गर्ने भएकोले यसलाई नाइट्रोजन मल धेरै मात्रामा दिनु पर्दैन । त्यसैले एक कठठा जग्गामा ८ - १० डोको जति गोबर मल, २ किलो ग्राम युरिया, ६ किलो ग्राम डि.ए.पी. दिएमा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । गोबर मलको प्रयोगले मात्र पनि सिँचाईको राम्रो व्यवस्था भएको ठाउँमा घाँसको उत्पादन हुन सक्ने पाइएको छ । प्रत्येक कटिङ्ग पछि प्रति का ६०० ग्राम युरिया मलले टप देसिङ्ग गर्नु पर्छ ।

बीउ छर्ने तरीका: वर्षीमको राम्रो उत्पादन लिनका लागि बीउ छर्नु भन्दा पहिला एउटा गहिरो भाँडोमा पानी राखेर बीउ भिज्नु पर्दछ । यसरी बीउलाई भिजाउँदा फोसो बीउहरू पानीको सतह माथि आउँछन् र भाँधि आएका बीउहरूलाई झिकेर फ्याक्नु पर्दछ । यदि पहिलो पटक वर्षीम खेती गर्न लागिएको हो भने यसरी बीउलाई छानी सकेपछि पानी मुनी रहेको बीउलाई उपचार (इनोकुलेशन) गर्नु पर्दछ । यदि इनोकुलम नपाइएमा पहिले वर्षीम लगाएको खेतको माटो ल्याएर १ भाग बीउ बराबर २ भाग माटो मिसाएर छर्नु पर्दछ । यदि इनोकुलेशन गर्ने हो भने १० गुड, सल्वर वा चिनी पानीमा मिसाएर उमाल्नु पर्दछ । उमालेको झोल चिसो भए पछि इनोकुलम मिसाएर लेदो बनाई त्यस लेदोमा बीउ लगाएर राम्रो संग मिसाउनु पर्दछ । इनोकुलेशन गरिसके पछि २ - ३ घण्टा छायामा वा ओझेलमा सुकाउनु पर्दछ । घाममा सुकाउनु हुँदैन । यसरी इनोकुलेशन गरेको २४ घण्टा भित्र बीउलाई बालुवा वा माटोमा मिसाएमा एकनासले बीउ छर्ने सकिन्छ । उक्त बीउलाई तीन तरीकाले छर्ने सकिन्छ । इनोकुलम खुमलटार ललितपुर स्थित चरन तथा आहार विकास शाखा र माटो विज्ञान महाशाखामा पाइन्छ ।

धुलो माटोमा छर्ने: गहुँको लागि नै जग्गा तयार पारी वर्षीमको बीउ छर्नु पर्दछ । छरिएको बीउ माटोले एक इन्च भन्दा बढी पुरिनु हुँदैन ।

धान लगाएको खेतमा लगाउने तरीका: धान लगाएको खेतमा एक पल्ट हल्का सिँचाई गरी असोज - कार्तिक महिनामा बीउ छर्नु पर्दछ र त्यो पानीलाई त्यतिकै सुक्न दिनु पर्दछ ।

हिल्याएको खेतमा छर्ने तरीका: यो तरीका सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ । यस तरीकाबाट बीउ लगाउनाले छिटो घाँस काट्न सकिन्छ । प्याज वा धानको बीउ राख्ने व्याड नै जग्गा तयार पारी त्यसमा २ - ३ इन्च पानी लगाएर बीउ छर्नु पर्दछ । बीउदर प्रति का ७५० ग्राम देखि १ किलो ग्राम सम्म आवश्यक पर्दछ ।

इनोकुलेशन भनेको के हो ?

वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन लिन कोसे घाँसको जग्गामा मिर्चा वा गाँठाहरू हुनु अत्यन्त जरूरी हुन आउँछ । यदि पर्याप्त मात्रामा यी मिर्चा र जराहरू नभएमा विरवाको विकासका लागि पनि मल दिइरहनु पर्दछ । यस कारण यी मिर्चाहरूको लागि अन्य मिर्चाहरूबाट नै जिवाणु झिकी औषधिमाटो तयार गरीन्छ । जसलाई इनोकुलम भनिन्छ । यो बीउ छर्नु भन्दा पहिले बीउमा मिसाउने विधिलाई इनोकुलेशन भनिन्छ ।

सिँचाई: वर्षीम खेतीमा सिँचाईको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ । वर्षीम ३ - ४ इन्चको हुना साथ पहिलो सिँचाई गर्नु पर्दछ । दोश्रो सिँचाई माटोको चिस्यान हेरी १० - २० दिनमा गर्ने । त्यस पछि सिँचाई आवश्यकता हेरी र कटाइ पश्चात दिनु राम्रो मानिन्छ । सिँचाइको मात्रा कम भएमा उत्पादन पनि कम हुन जान्छ ।

घाँस काट्ने समय र तरीका: घाँसको कटाई लगाउने तरीकामा भर पर्दछ । यदि धुलो खेतमा लगाइएको भए ६० देखि ७० दिनमा, धानकै भित्र लगाइएको भए ५० - ६० दिन सम्ममा र हिलो बनाई छरिएको भए ४० - ५० दिन सम्ममा पहिलो कटिङ्ग शुरु गर्नु पर्दछ । अन्य कटाई माटोको किसिम, उर्वरा शक्ति र सिँचाईको आधारमा २५ - ३० दिनको फरकमा गर्नु पर्दछ । यसै गरी पुस देखि चैत्र सम्म यसको उत्पादन लिन सकिन्छ ।

उत्पादन: ४००० किलो ग्राम देखि ५००० किलो ग्राम/का सम्म हुन्छ ।

वर्षीम घासमा पाइने पोषिलो तत्वहरू:

• सुख्खा पदार्थ	२२.२८
• नाइट्रोजन	३.१३
• कच्चा प्रोटीन	१९.५९
• चिन्लो पदार्थ	२.७१
• रेशादार पदार्थ	१४.४२
• कार्बोहाइड्रेट	४८.९८
• खनिज पदार्थ	११.८
• प्राङ्गारिक पदार्थ	८८.८०

जै घास खेती:

- जै घासको खेती गर्मी ठाउँ देखि हिमाली भेग सम्म गर्न सकिन्छ ।
- तराई र पहाडमा यो घास हिउँद महिनामा छर्न सकिन्छ ।
- धान वा मकै भित्र्याई सके पछि असोज देखि मंसिर महिना सम्ममा खेतमा गोबर मल राखी गर्नुको लागि जमिन तयारी गरे जस्तै गरि जमिन तयार पार्ने ।
- बलौटे वा दोमट माटोमा यसको खेती राम्रो हुन्छ ।
- जमिनको तयारी पछि २-२.३ किलो ग्राम प्रति काका दरले बीउ छर्ने ।
- छरेको ३ हप्ता पछि प्रति का २ किलो ग्राम युरिया छर्ने ।
- बीउ छरेको लगभग २ महिनामा हरियो घास खान्न योग्य हुने हुँदा जमिन माथि २ इन्च छाडी काट्ने ।
- काटी सके पछि पुनः युरिया छर्ने र सिँचाई गर्ने ।
- बीउका लागि हो भने पहिलो काटि पछि छाडि दिने ।
- हरियो घासका लागि पहिलो काटि पछि २-३ हप्ताको अन्तरमा ४ पटक सम्म काट्न सकिन्छ । प्रत्येक कटाइ पछि हल्का युरिया छर्ने र सिँचाई दिने काम गर्नु पर्दछ ।
- घास उत्पादन: प्रति का २ टन ।
- बीउ उत्पादन: प्रति का ४० किलो ग्राम ।
- घास उपलब्ध हुने समय: मार्ग-चैत्र ।
- जै घासमा भेच पनि मिसाएर छर्न सकिन्छ । यसरी छर्नु परेमा २ किलो ग्राम भेच र ३ किलो ग्राम जै छर्ने ।

८६. वर्षे घास खेती

टियोसेन्टी (Eucheena mexicana): यो वर्षा ऋतुमा लगाइने एक वर्षीय घास हो । यो घासको डाँठ पात मकैको जस्ता हुने हुनाले यसलाई मकै घास पनि भनिन्छ । यसको डाँठ र पात नरम हुने हुनाले पशु पस्तुले रुचाएर खान्छ ।

- यसको खेती तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा राम्रो सँग गर्न सकिन्छ ।
- यसको खेती सबै प्रकारको माटोमा गर्न सकिन्छ तर पानी जम्ने ठाउँमा गर्न सकिँदैन ।
- जमिन ३/४ पटक खनजोत गरी बुर्बुराउँदो धुलो बनाउनु पर्दछ।
- प्रति का २५-३० डोको कम्पोस्ट मल राख्नु पर्दछ ।
- प्रति का १ किलो ग्राम बीउको आवश्यकता पर्दछ ।
- जेठ र अषाढ महिनामा बीउ लगाउनु (छर्नु) पर्दछ ।
- बीउ छर्नु भन्दा पहिला ५ को नुन पानीको द्रोल बनाएर बीउलाई पानीमा भिजाउनु पर्दछ । पानी माथि तैरिएको बीउलाई फाली अन्य बीउलाई इनोकुलम गर्नु पर्दछ इनोकुलम गर्न नपाइएमा वर्षीम, लुसर्न आदि लगाइएको ठाउँको माटो २ भाग लिई १ भाग बीउ मिसाएर छर्ने । (इनोकुलम वर्षीममा जस्तै) ।
- बीउलाई इनोकुलम गरिसकेपछि २/३ घण्टा राखी, छायाँमा सुकाएर २४ घण्टा भित्र छर्ने ।
- बीउ छर्दा एकनासले छर्ने, लाइन लगाउने हो भने एक लाइन देखि अर्को लाइनको दुरी ५० से.मि. फरक हुनु आवश्यक छ।
- बीउ छरेको ४५-६० दिनमा पहिलो कटाई गर्न सकिन्छ । त्यस पछि दोश्रो कटाई ३५ देखि ४० दिनमा गर्न सकिन्छ ।
- वर्षाभा २-३ पटक सम्म हरियो घास काट्न सकिन्छ ।
- घास उत्पादन ८० मेट्रिक टन/हेक्टर वा २.६७ मेट्रिक टन/का हुन्छ ।
- दाना उत्पादन ८०० - १२०० किलो ग्राम/हेक्टर वा २६.७ - ४० किलो ग्राम/का हुन्छ ।

स्टाइलो बहुवर्षीय घास (Stylosanthes guineensis): यो प्रमुख कोशे घास हो । विभिन्न हावापानीमा विभिन्न जातका बीउ प्रयोग गर्नु सकिन्छ ।

- तराई देखि पहाडको २००० मिटर उचाई सम्म लगाउन सकिन्छ ।
- यसको जरा जमिनमुनी १० फिट सम्म गहिरो जाने भएकाले सुख्खा सिजनमा पनि हरियो रहिरहन्छ।

- यो बलौटे माटो बाहेक अरु सबै माटोमा लगाउन सकिन्छ ।
 - जमिनमा राम्ररी खनजोत गरी जुवुराउशे बनाउनु पर्दछ ।
 - प्रति का २५-३० डोको गोबर मल प्रयोग गर्ने ।
 - प्रति हेक्टर ५ किलो ग्राम बीउ आवश्यक पर्दछ भने प्रति का १७० ग्राम आवश्यक हुन्छ ।
 - जेठ र अषाढमा जमिन तयार गरी बीउ छर्नु पर्दछ ।
 - बीउ छरेको ३ महिनामा घाँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । तत्पश्चात् एक वा डेढ महिनामा हरियो घाँस उत्पादन लिन सकिन्छ ।
 - घाँस काट्दा १० से.मि. जति फेद छोडी काट्नु पर्दछ । यसो गर्दा बाँकी रहेको डोढबाट धेरै हागाहरू फैलन्छन् ।
 - हरियो घाँसको उत्पादन वर्षमा ४ पटक सम्म लिन सकिन्छ ।
 - राम्ररी खेती गरेमा प्रति का १५(२) ताल हरियो घाँस उत्पादन लिन सकिन्छ।
 - बीउ उत्पादन गर्ने भए पहिलो कटाइ पछि छोड्नु पर्दछ ।
 - उन्नत तरीकाबाट खेती गरेमा प्रति का १६५ - २०० किलो ग्राम बीउ उत्पादन हुन सक्छ ।
 - स्टइलोमा प्रशस्त प्रोटिन हुने भएकाले अन्य अकोशे र सुख्खा परालमा मिसाएर खुवाउनु पर्दछ ।
 - स्टइलोलाई वर्षा सिजनमा घाम लागेको समयमा काटेर राम्ररी सुकाएर "हे" बनाई सुख्खा सिजनमा खुवाउन सकिन्छ । यो हरियो घाँस जस्तै पोषिलो हुन्छ ।
- लुसर्न (Medicago sativa): यो कोशे घाँस हो, विभिन्न मौसममा विभिन्न जातको बीउ प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभिन्न २५ जात मध्ये टिफेन्टा, पायोनिपर, सारनाक, हन्टर रिभर, रोसिस आदि पर्दछन् ।
- यो तराई देखि पहाड सम्म खेती गर्न सकिन्छ ।
 - यसको खेती सबै प्रकारको माटोमा गर्नु सकिन्छ । केवल पानी जम्ने जमिनमा हुँदैन ।
 - गर्मी क्षेत्रमा यसको खेती जेठ देखि मंसीर सम्ममा र लेक तर्फ चैत्र र वैशाखमा लगाउन सकिन्छ ।
 - भीर पाखामा पनि लगाउन सकिन्छ । बारीमा लगाउँदा ३/४ पटक खनजोत गरेर लगाउनु पर्दछ ।
 - राम्रो उत्पादन गर्न प्रति का २५-३० डोको गोबर मल प्रयोग गर्नु
 - प्रति का १ किलो ग्राम बीउ आवश्यकता पर्दछ ।

- बीउ छर्नु भन्दा पहिला ५ को नुनपानीको झोलमा बीउ भिजाउने र खास बीउलाई इनोकुलममा मिसाउने (वर्षिममा जस्तै) । इनोकुलेसन नपाइएमा माटोमा मिसाई छर्ने ।
 - इनोकुलम पछि २/३ घण्टा छायामा सुकाई २४ घण्टा सम्ममा बीउ छर्ने ।
 - बीउ छर्दा १ से.मि. भन्दा बढी पुर्नु हुँदैन । अन्यथा बीउ उम्मी माटोमाथि नआई भित्रै कुहिएर मर्दछ । त्यसकारण बीउ छरे पछि हल्का किसिमले दाँते लगाउनु पर्दछ ।
 - बीउ छर्दा सबै तिर एकै नासले छर्नु पर्दछ र यदि लाइनमा लगाउने हो भने लाइनको दुरी २५ देखि ३० से.मि. बनाई बीउ छर्ने ।
 - घाँसको उत्पादन बढी लिनका लागि सुख्खा सिजनमा सिचाई गरिरहनु पर्दछ।
 - पहिलो वर्ष खेती गर्दा स्थानीय घाँसको प्रकोप बढ्ने भएकाले गोडमेलको आवश्यकता पर्दछ ।
 - बीउ छरेको ५० - ६० दिन पछि उत्पादन (हरियो घाँस) लिन सकिन्छ र त्यस पछि ४५ - ६० दिनको फरकमा हरियो घाँसको उत्पादन लिन सकिन्छ।
 - घाँस उत्पादन प्रति का १५० देखि २०० किलो ग्राम हुन्छ ।
- सुडान: यसको वैज्ञानिक नाम Sorghum Sudana हो । यो वर्षातमा लगाइने महत्त्वपूर्ण घाँसे बाली हो । नेपालको तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । यसले सुख्खा सहन सक्दछ तथा रुखो जग्गामा पनि यसको खेती राम्रो हुन्छ ।
- ३/४ पटक खनजोत गरी प्रति का ५०० देखि ७०० ग्राम बीउ लगाउने ।
 - ठाउँ चिसान भएमा फगुन र चैत्रमा तथा सुख्खा भएमा असार र श्रावण महिनामा बीउ लगाउने ।
 - मलखाद प्रति हेक्टर N:P:K = 100:100:40 का दरले प्रयोग गर्ने ।
 - ५० - ६० दिन पछि पहिलो कटाई र त्यस पछि ३० - ४० दिनमा प्रत्येक कटाई गर्न सकिन्छ । सालभरमा ४ पटक सम्म हरियो घाँस काट्न सकिन्छ।
 - प्रति का १३००-१५०० किलो ग्राम हरियो घाँसको उत्पादन हुन्छ ।
 - बीउ उत्पादनका लागि खेती गर्दा हरियो घाँस काट्नु हुँदैन ।
 - सुडान चैत्र - वैशाखमा पाक्दछ र १० देखि १५ किलो ग्राम प्रति का उत्पादन हुन्छ ।
 - सुडान पोषिलो घाँस हो तर कलिलो अवस्थामा विषालु हुने गर्दछ ।
 - कलिलो घाँसलाई ओइलाएर वा पानी परे पछि वा बाला निस्केपछि खुवाउनु पर्दछ ।

जुनेलो/ज्वार (Sorghum bicolor): यो उन्नत तथा घाँसबालीका रूपमा लगाइने महत्त्वपूर्ण बाली हो । यसको खेती तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा

सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । आकाशे खेती गर्दा जेठ - अषाढ र सिचाई हुने ठाउँमा फागुन-चैत्र महिनामा बीउ छर्न सकिन्छ ।

- बीउ दर: १.३ के.जी. - १.७ के.जी./कठ्ठा
- मलखाद: N:P:K = १००:१००:४०/हे. अथवा ३३:३३:१३ के.जी./कठ्ठा
- उत्पादन: बीउ छरेको ६० दिन पछि हरियो घाँस लिन सकिन्छ ।
- हरियो घाँसको उत्पादन १ टन/ कठ्ठा हुन्छ ।
- हरियो अवस्थामा घाँसमा विषालु पन हुन्छ, ओइलाएर खुवाउनु पर्दछ ।
- यसलाई हरियै र साइलेज बनाएर पनि खुवाउन सकिन्छ ।

बाज्रा (*Pennisetum americanum*): वर्षातमा लगाइने यो दोहोरो महत्त्वको घाँस हो । यसको दाना मगिनसहरूले आहाराको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछन् । यो कम पानी भएको ठाउँमा र सुख्खा क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।

- लगाउने समय: सिंचित क्षेत्रमा फागुन-चैत्र महिनामा र असिंचित क्षेत्रमा जेठ - अषाढ महिनामा ।
- बीउ दर: प्रति का. ३५०-४०० ग्राम बीउ ।
- बीउ छर्दा १-२ से.मि. मात्र गहिरो बनाई छर्ने ।
- उत्पादन राम्रो लिनका लागि N:P:K = ३५:२१:३५ के.जी./कठ्ठाका दरले प्रयोग गर्ने ।
- बीउ छरेको ५०-६० दिनमा पहिलो पटक र त्यस पछि ३५-४० दिनमा दोश्रो कटाई लिन सकिन्छ ।
- एक पटक छरेको घाँसबाट कमसेकम ४-५ पटक सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ ।
- हरियो घाँसको उत्पादन प्रति का १.५-२ टन हुन्छ ।
- बीउको लागि घाँस लगाउने हो भने घाँस नकाट्ने ।
- १७-२५ किलो ग्राम दाना (बीउ) प्रति का उत्पादन हुन्छ ।
- यो घाँस हरियै अथवा साइलेज बनाएर पनि खुवाउन सकिन्छ ।

मकै (*Zea mays*):

- बीउ प्रति का १.२५ - २ के.जी.
- लाइनमा छर्दा ५० से.मि. फरकमा छर्ने ।
- मकै वर्षे बैशाख-जेठ तथा हिउँदे असोज-कार्तिक महिनामा छर्ने ।
- मलखाद 120:60:40 Kg = N:P:K per Hectore Or 4.2:1.25 Kg = N:P:K per Kathha.
- उत्पादन: एक पटक मात्र घाँस काट्न सकिन्छ ।
- चमर (धान, चामल) निकाल्दा बाँकी लिने ।
- ६०-८० दिनमा उत्पादन लिन सकिन्छ ।
- प्रति का 1.25-2 Ton हरियो घाँस लिन सकिन्छ ।

८७. बहु वर्षिय घाँस खेती

भूमिका: नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणालीमा खेतीपातीका साथ साथै पशुपालन पेशाले आय आर्जनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । नेपालका कृषकहरूले खेतीपातीको साथ साथै एक हल गोरु, एउटा भैसी अथवा गाई २/४ वटा बाख्रा, स्थान र परम्परा अनुसार भेडा, बंगुर कुखुरा आदि पशुपक्षीहरू पालेको पाइन्छ ।

विगतमा प्राकृतिक चरण, वन पाखा, खोला नाला, आदि ठाउँमा प्रसस्त हरियो घाँस, स्याउला उपलब्ध हुने हुँदा त्यती समस्या रहेको पाइदैन थियो, तर हाल जनसंख्याको वृद्धिको कारणबाट प्राकृतिक चरण तथा घाँसका फाँटहरू नष्ट भई पशु आहारमा समस्या देखिएको पाइन्छ । हुनत हाल केहि वर्ष यता नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट एक वर्ष र बहुवर्षे जातका घाँसको विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन् । तर जब सम्म कृषक स्वयम्ले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी घाँस विकास गर्दैनन् तब सम्म पशु आहारमा पुर्ति हुन सक्दैन । हाल तराई तथा विकसित क्षेत्रका कृषकहरूले आफ्नो निजी जग्गामा एक वर्षे घाँस खेती (जै, वर्षिम, टियोसेन्टी आदि) गर्ने गरेको पाइन्छ, तर गाउँ घर, दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता उन्नत घाँसको पहुँच पुग्न नसकेकोले आहाराको अभावले पशुजन्य उत्पादनमा ह्रास आएको पनि पाइन्छ । अधिराज्यको १२.७% भु-भाग प्राकृतिक चरणले ढाकेको भएता पनि ४१% भाग भिर पाखाले ओगटेको पाइन्छ । वन विनाश तथा अतिवन्धीत आवाहिका कारण बाढी पहिरोले वर्षेनी सयौं हेक्टर जमिन अनुत्पादक भएर गएको पाइन्छ ।

बहु वर्षिय घाँस खेती किन गर्ने ?

- पशु आहारमा पुर्ति गर्न (हालको ४० आहाराको कमीलाई ० मा पुर्‍याउन) ।
- दिनानुदिन बढ्दै गै रहेको बाढी, पहिरो, भु-क्षय, भु-स्खलन नियन्त्रण गर्न ।
- वातावरण स्वच्छ राख्न ।
- आय आर्जन गर्न ।
- अनुत्पादक, बोझो, पर्ति जग्गाहरूमा ।
- आलि, काल्ना, डिल, कुलेसाहरूमा ।
- सडक किनारा, नहर किनार आदि ठाउँमा ।
- समुदायिक वन, निजी वन, कबुलियती वन आदि वन हरूमा ।
- नाझा डाँडा पाखाहरूमा ।

बहु वर्षिय घाँस खेती कहाँ गर्ने ?

- अनुत्पादक, बोझो, पर्ति जग्गाहरूमा ।
- आलि, काल्ना, डिल, कुलेसाहरूमा ।
- सडक किनारा, नहर किनार आदि ठाउँमा ।
- समुदायिक वन, निजी वन, कबुलियती वन आदि वन हरूमा ।
- नाझा डाँडा पाखाहरूमा ।

- प्राकृतिक चरन क्षेत्र, सरक्षित क्षेत्र, फाटहरू ।
- बाढी, पहिरो, भु-क्षय, भु-स्खलन हुने र नदीकिनाराहरूमा ।
- खेत, बारिको सिमाना, बारको रुपमा ।
- सरकारी तथा सामुदायिक (विद्यालय हाता, क्लब, समिति, फार्म आदिले सरक्षण गरेको) जग्गामा ।

बहु वर्षिय घाँस खेती कसरी गर्ने ?

उपभोक्ता व्यक्ति वा समितिले संरक्षण गर्न सक्ने क्षेत्रमा बहु वर्षे घाँसको बीउ तथा जरा, गानो, आँखा रोपी घाँसको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । घाँसको जात अनुसार लगाउने तरीका पनि अलग अलग हुन्छ । घाँस खेती गर्ने ठाउँको अनावश्यक झारपात, झाडी, बुट्यान हटाई घाँसको जात अनुसार लगाउन सकिन्छ । घाँस लगाएको क्षेत्रमा पशु वस्तुको चरिचरावमा नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । उन्नत जातको घाँस स्वादिलो हुने हुँदा उम्रेने बित्तिकै पशुहरूले खाइदिन्छन् । यो गाई, गोसको खुत्ले कुलिचएर पनि नोकसान हुने गर्दछ, साथै बीउबाट विस्तार गरिने घाँसको लागि बीउ उत्पादन हुनु भन्दा पहिले नै पशु वस्तुले नष्ट गरिदिन्छन् । त्यसैले घाँस लगाएको क्षेत्रमा चरिचराव नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

प्राकृतिक चरणहरूको संरक्षण तथा विस्तार गरेर पनि बहु वर्षे घाँसको विकास गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक घाँसको पौष्टिकता परिक्षण गरी उच्च पौष्टिक गुण भएका घाँसको छनौट गरेर विस्तार गरी घाँस विकास गरिन्छ ।

विश्व रोपी र माटो बगनबाट बचाऔं ।

८८. बहु वर्षिय घाँसका जातहरू

स्टाइलो (Stylosanthes): यो बहु वर्षे कोबे घाँस वाली हो । यसलाई उष्ण एवं सुख्खा जलवायु भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । यसको विस्तार बीउबाट गर्न सकिन्छ । यसलाई नयाँ ठाउँमा लगाउँदा इनाकुलेशन गरेर लगाउन सके राम्रो हुन्छ । बीउको बोक्रा कडा हुने हुँदा बोक्रा चर्काउने (Scarification) गर्नु पर्दछ । चिस्यानको व्यवस्था भएमा वर्ष भरि हरियो घाँसको व्यवस्था लिन सकिन्छ । खासगरी गिति घाँस, सेटेरिया, नेपियर आदि घाँस संग मिश्रित खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ । एक रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा १७० ग्राम तथा एक हेक्टरमा ३ देखि ५ किलो ग्राम बीउ आवश्यक पर्दछ । यो घाँस तराई तथा मध्य पहाडमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ । हाल तराई तथा मध्य पहाडका सामुदायिक वन, कबुलियती वन, सडक किनारा तथा खोल्सा खोल्सीहरूमा प्रसस्त मात्रामा लगाइएको पाइन्छ । यसको बीउ वैशाख देखि असाढ सम्म छर्ने सकिन्छ । बीउ उत्पादनका लागि खेती गर्ने हो भने राम्ररी खनजोत गरी लाइनमा लगाइन्छ । पशु वस्तुलाई खुवाउनलाई मात्र हो भने सिधै छरिदिए पुन्छ । यसको बीउ मंशेरमा सकलन गरिन्छ ।

मोलासेस: यो पनि बहु वर्षे घाँस हो । तराई तथा मध्य पहाडी भाग सम्म यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । यसको बीउ जेठ अषाढ महिनामा छरिन्छ । चरन तथा सरक्षित वन क्षेत्रहरूमा यसको खेती गरी पशु आहारमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । प्रति हेक्टर जग्गामा ५ किलो ग्राम बीउको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपियर: यो पनि बहु वर्षे घाँस हो । यसको खेती तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्र सम्म गरिन्छ । पशुहरूले यो घाँसलाई असाध्यै रुचाएर खाने गर्दछन् । यसको जरा चारै तिर फैलिने हुँदा भु-क्षय नियन्त्रणका लागि पनि उपयोगी मानिन्छ । यसको डाँठ नरम हुने हुँदा टुक्रा पारेर भुसा आदिमा मिसाएर खुवाउन उपयुक्त हुन्छ । एकपटक रोप्ने पछि ५ वर्ष सम्म सजिलै उत्पादन लिन सकिन्छ । मल जल तथा सम्भारको आधारमा वर्षमा ५ देखि ८ पटक सम्म कटाई लिन सकिन्छ । यो घाँसको विस्तार आँखाबाट गरिने भएकाले जग्गाको तयारी गरी ३ आँखा भएको सेट (टुक्रा) काटी २ आँखा माटो भित्र र १ आँखा माटो बाहिर पर्ने गरी ६-९ फिटको फरकमा लगाउनु पर्दछ । पहिलो कटाई रोपेको ३ महिनामा र तत् पश्चात प्रत्येक महिना कटाई गर्न सकिन्छ । ४-५ वर्ष पछि डाँठ बढ्न गई उत्पादनमा कीम आउने हुँदा नयाँ ठाउँमा सार्नु पर्ने हुन्छ । भु-क्षय रोक्न पहिरो ग्रस्त क्षेत्र,

खोल्सा खोल्सी आदि ठाउँमा नेपियर लगाउँदा भु-क्षय रोकितुका साथै पशु आहारामा सहयोग पुग्दछ । यसको विस्तार गर्न चैत्र देखि श्रावण सम्म उपयुक्त हुन्छ ।

अग्रीसो: तराई, मध्य पहाड तथा उच्च पहाड सम्म पाइने यो घाँस स्थानीय घाँस भए पनि पोषिलो हुन्छ । यो घाँस कृषकहरू बीच लोकप्रिय रहेको छ । भिर पाखामा प्राकृतिक रूपमा नै विस्तार भइरहने यो घाँसको गानो सारेर खेती गरिन्छ । आली, कान्ता, पाखाहरूमा यसको खेती गर्न सकिन्छ ।

डिस्मोडियम: यो पनि अत्यन्त पोषिलो कोशे घाँस हो । तराई तथा मध्य पहाडमा खेती गरिने यो घाँस उन्नत जातको घाँसमा पर्दछ । एक पटक लगाए पछि वर्षौं सम्म हरियो घाँस उत्पादन गर्न सकिने हुँदा यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । एक रोपनी क्षेत्रफलमा १५० ग्राम बीउको आवश्यकता पर्दछ । एक बोट र अर्को बोटको दूरी १ फिटको हुनु पर्दछ । बारीको कान्ता र भिरालो जंगमामा यो घाँस लगाउन उपयुक्त हुन्छ । बीउ छर्ने समय चैत्र देखि असाढ सम्म हो भने फगुन देखि कार्तिक सम्म हरियो घाँस लिन सकिन्छ ।

सेतो क्लोभर: यो मध्ये तथा उच्च पहाडमा पाइने धेरै पोषिलो बहु वर्षिय कोशे घाँस हो । उच्च पहाड लेकहरूमा चरनका लागि यो घाँसको खेती गरिन्छ । एक पटक लगाए पछि वर्षौं सम्म हरियो घाँस उत्पादन लिन सकिने यो घाँसको बीउ जेठ, अषाढ महिनामा छरिन्छ । प्रति हेक्टर ३ - ५ किलो ग्राम बीउ आवश्यक पर्दछ ।

राई ग्रास: यो पनि उच्च पहाडमा खेती गरिने बहु वर्षिय घाँस हो । यो धेरै पोषिलो घाँस हो । अषाढ महिनामा यसको बीउ छर्ने काम गरिन्छ । १ हेक्टर जंगमामा २० किलो ग्राम बीउको आवश्यकता पर्दछ । यसै अन्य बहु वर्ष घाँसहरूमा तराइमा पाइने गिनी, सेटेरिया आदि र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने कक्फिट, फिस्टुका आदि हुन् । नेपालमा रहेका स्थानीय बहु वर्षे घाँसहरूको अनुसन्धान हुन सकेमा बीउ खरीदका लागि विदेश जाने नेपाली मुद्राको बचत हुन सक्ने देखिन्छ भने स्थानीय घाँसबाट सजिलै बीउ उत्पादन तथा घाँस विकास गर्न सकिने देखिन्छ । तर स्थानीय स्तरमा रहेका पोषिला बहु वर्षे घाँसको विकास तथा संरक्षणतिर ध्यान नगएकोले यस्ता घाँसका सन्तती नष्ट नहोला भन्न सकिन्न ।

८९. घाँस उत्पादन लिने तरिका र वर्षभरि हरियो घाँस खेती

पशुपालन व्यावसायबाट उत्पादन लागत घटाई बढी उत्पादन लिन घाँस खेतीको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पशुका लागि हरियो घाँसबाट पशुलाई आवश्यक पर्ने सबै पौष्टिक पदार्थहरू प्राप्त हुन सक्छन् । प्रशस्त मात्रामा हरियो घाँस खान दिएमा थप सन्तुलित दाना दिनु पर्ने आवश्यकता रहदैन । हामी कहाँ पनि उन्नत पशुपालन व्यावसायको संग सँगै हरियो घाँस खेतीको प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ ।

हिउँदे घाँस:

- जै: लगाउने समय कार्तिक देखि माघ महिना सम्म । बीउको दर १०० देखि १२० किलो ग्राम प्रति हेक्टर । उत्पादन प्रति हेक्टर २५ देखि ५० मेट्रिक टन ।
- बर्षिम: लगाउने समय कार्तिक देखि माघ सम्म । बीउको दर २० देखि २५ किलो ग्राम प्रति हेक्टर । उत्पादन ७० देखि ८० मेट्रिक टन ।
- भेच: लगाउने समय कार्तिक देखि माघ सम्म । बीउको दर प्रति हेक्टर ३५ देखि ४० किलो ग्राम । उत्पादन ६० देखि ७० मेट्रिक टन ।
- लुर्सेन: लगाउने समय: असोज देखि मंसिर सम्म । बीउको दर २० देखि २५ किलो प्रति हेक्टर । उत्पादन ७० देखि ८० मेट्रिक टन/हेक्टर ।

वर्षे घाँस:

- मकै: लगाउने समय फगुन देखि अषाढ सम्म । बीउको दर ३० देखि ३५ किलो ग्राम प्रति हेक्टर । उत्पादन ५० देखि ८० मेट्रिक टन ।
- टियोसेन्टी: लगाउने समय फगुन देखि अषाढा सम्म । बीउको दर ३५ देखि ४० किलो प्रति हेक्टर । उत्पादन ६० देखि ८० मेट्रिक टन ।
- बाजरा: लगाउने समय फगुन देखि अषाढ सम्म । बीउको दर २० देखि ३० किलो प्रति हेक्टर । उत्पादन ५० देखि ६० मेट्रिक टन ।
- सुङना: लगाउने समय फगुन देखि अषाढ सम्म । बीउको दर २० देखि ३० किलो प्रति हेक्टर । उत्पादन ५० देखि ८० मेट्रिक टन ।
- काउपी: कोसेघाँस ।

बहुवर्षे घाँस:

- नेपियर सेट्स: लगाउने समय चैत्र देखि अषाढ सम्म । बीउको दर १ लाख सेट्स प्रति हेक्टर । उत्पादन १०० देखि १५० मेट्रिक टन ।
- डिस्मोडियम: लगाउने समय जेठ र अषाढ महिना । बीउको लागत प्रति हेक्टर २ देखि ३ किलो ग्राम अथवा १०००० सेट्स । उत्पादन ४० देखि ५० मेट्रिक टन ।
- सेन्ट्रो: लगाउने समय: जेठ र अषाढ महिना । बीउको दर १/१ मिटरको फरकमा २/३ गोडा रोप्ने । उत्पादन ४० देखि ५० मेट्रिक टन प्रति हेक्टर ।
- डलोघास: झील झील, यसको उत्पादन प्रति बोट १० किलो ग्राम प्रति वर्ष हुन्छ ।

१०. पशुलाई आवश्यक सन्तुलित आहारा

- कार्बोहाइड्रेट
- प्रोटीन
- चिल्लो पदार्थ
- खनिज लवण
- भिटाभिन
- पानी

पानी प्रति दिन ३० देखि ४० लिटर दिनु पर्दछ भने आहारा दिदा शाशरीरक तौलको २.५ - ३%.

आहारा दिदा: १ किलो ग्राम सुब्बा घासमा ४ किलो ग्राम हरियो घास, २०० ग्राम दाना, १०० मिलिलिटर तोरीको तेल, ५० ग्राम भिनरल मिक्सचर Mineral Mixture दिनु पर्ने हुन्छ । दूध दिने पशुलाई प्रति ३ लिटर दूधमा १ किलो ग्राम घण दाना दिनु पर्दछ ।

१.५ का (१ रोपनी) जग्गामा बाह्र महिना पाइने हरियो घासहरू

डालेघास इपिल इपिल: खेतको चारै तिर बाहिर पट्टी १/१ मिटरको दूरीमा $२५ + २५ + २० + २० = ९०$ बोट डालेघास लगाउन सकिन्छ ।

बहुवर्षेघास नेपियर: डालेघास भन्दा भित्र पट्टी आधा आधा मिटरको फरकमा कभ्रिमा पनि ३ गोटा अखिला भएको सेट्स $५० + ५० + ४० + ४० = १८०$ गोटा सेट्स लगाउन सकिन्छ ।

बहुवर्षे लहरेघास डेस्टोडियम: यो कोसे घास हो । यसलाई इपिल इपिल र नेपियरको बीचको खाली ठाउँमा ३/३ वटा दाना (गोडा)हरू लगाउँदै जर्दा १८० देखि २०० सम्म लहरेघास लगाउन सकिन्छ र यो घासको उत्पादन क्षयामा पनि राम्रो हुन्छ ।

हिउँदे घास र वर्षे घास: अब डालेघास, लहरेघास र नेपियरको सेट्स लगाई सकेपछि बीचको खाली ठाउँमा हिउँदे र वर्षे घास लगाउनु पर्दछ । हिउँदे घास अन्तर्गत जै र भेच क्रमशः ४ किलो ग्राम र १.५ किलो ग्राम तथा वर्षिम १ किलो ग्राम लगाउने एवं वर्षे घास अन्तर्गत मकै र काउपी क्रमशः २ किलो ग्राम र १ किलो ग्राम तथा टियोसेन्टी र काउपी १/१ किलो ग्राम लगाउने ।

११. हरियो घास उत्पादन

इपिल इपिल: तेश्रो वर्ष देखि राम्रो उत्पादन दिन्छ । प्रति वर्ष प्रति बोटबाट हरियो घास ५० किलो ग्राम ८ पटक सम्म काट्न सकिन्छ ।

नेपियर सेट्स: सिचाईको सुविधा भएको ठाउँमा प्रति बोट प्रति वर्ष ५ किलो ग्राम सुब्बा चारा सजिलै पाउन सकिन्छ ।

लहरे घास: यो घास वर्षको २ पटक काट्न सकिन्छ । १०० किलो ग्राम सुब्बा चारा लिन सकिन्छ ।

हिउँदे घास: २५० किलो ग्राम सुब्बा चारा लिन सकिन्छ ।

वर्षे घास: ६०० किलो ग्राम सम्म सुब्बा चारा लिन सकिन्छ ।

यसरी १.५ का (१रोपनी) जग्गामा घास खेती गर्न सकेमा ३०० किलो ग्रामको १ गाई वा बैसीलाई वर्षेभरि हरियो घास पुर्‍याउन सकिन्छ ।

हे (सुकैको घास) र साइलेज बारे जानकारी: हे (सुकैको घास): सामान्यतय हिउँद महिनामा घासको कमी हुने हुँदा वर्षामा पाइने हरियो घासलाई संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि कोशे घास तथा अकोशे घासबालीलाई हरियो अवस्थामा फुल फुलन लाग्दा काटी सुकाएर संरक्षण गरी राख्ने गरिन्छ । त्यसरी राखिएको घासलाई हे भनिन्छ । यो घास सुकाएर राख्ने भनेको घासमा भएको पानीको मात्रा घटाउनु हो । यसो गर्दा धनक्याएर राख्न सजिलो, कुहिने समस्या नहुने हुँदा पोषिलोपन कायम गर्न तथा संरक्षण र घासको समस्या समाधानको यो उत्तम उपाय हो ।

हे बनाउदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- हे राम्रो बनाउन विरवामा पात बढी हुनु पर्दछ किनकी पातमा तागतार पौष्टिक तत्व बढी हुन्छ ।
- फुल फुलन लागेको घास छान्नु पर्दछ । यस्तो बेलामा बढी पौष्टिक पदार्थ जम्मा हुन्छ ।
- फुल फुलनु भन्दा पहिलाको घास काटेमा सो घासमा पानीको मात्रा बढी हुने र कलिलो पनि हुने हुँदा कुहिने डर हुन्छ ।
- यदि बीउ लागि सके पछि घास काटेर हे बनाउने हो भने बीउ खेर जाने र पौष्टिक तत्व कम हुनुका साथै स्तर पनि कम हुन्छ ।

- फुल फुलन लाग्दाको घास काटी मुठा-मुठा बनाई बाँधीको डिलमा, डोरी टापी डोरीमा झुन्ड्याएर वा सुख्खा घाँसे जमिनमा फिन्नाएर सुकाउनु पर्दछ ।
- टिनको छाना भएमा त्यसको माथि सुकाए पनि हुन्छ ।
- सुकाएको घाँसलाई समय-समयमा पल्टाउनु पर्दछ ।
- हे धन्यवाउने बेलामा अलि-अलि हरियो हुनु पर्दछ किनभने धेरै सुकाएर पहेँलो भएको हे त्यति पोथिलो हुँदैन ।
- सुकाएको हे नरम र मुलायम हुनु पर्दछ । तर धेरै सुकेको हुनु हुँदैन ।
- हेमा फोहोर, मैला, धुलो र अन्य द्वारपात भिसिनु हुँदैन ।
- हे राम्रो बन्थो भने वास्ता समेत आउँछ ।
- हे बनाउंदा पानी पन्यो भने त्यसमा भएको पौष्टिक पदार्थ पानीले पखाल्ने हुनाले राम्रो स्तरको बन्त पोउँदैन । त्यस कारण सकेसम्म पानी नपर्ने बेलामा वा पानीबाट जोगाउन मौसमको ख्याल राख्नु पर्दछ । तसर्थ पानी नपर्ने बेलामा मात्र हे बनाउनु पर्दछ ।
- घाँसलाई २-३ दिन सम्म सुकाएमा हे बन्दछ ।
- हे बनिसके पछि परालको धाक/थुप्रो लगाए झै गरी राख्न सकिन्छ ।
- हे धन्यवाउनु भन्दा पहिला सुके नसुकेको हेर्ने । यदि राम्रो नसुकेको भए धन्यवाउंदा सड्ने, कुहिने वा ठुसी पर्ने हुन्छ ।
- हेलाई आगोबाट बचाउनका लागि आगो नलाग्ने ठाउँमा धन्यवाउनु पर्दछ ।
- राम्रो बनाएको हेलाई हिउँदे सिजनमा ५ - ६ महिना सम्म परालसँग मिसाएर वा त्यतिकै खुवाउन सकिन्छ ।
- यसरी समयमै अच्छी नगरी मेहेनत गरेको खण्डमा हिउँदको समयमा हुने घाँसको कमिबाट बच्न सकिन्छ । सधै पशु वसुहरूबाट बाह्रै महिना उत्प्राप्त एकै नासले लिन पाइन्छ ।

साइलेज: कुनै पनि हरियो घाँसपात वा घाँसबालीलाई फुल फुलन लाग्दाको अवस्थामा खाडलमा गुन्द्रुक राख्ने झै राखी संरक्षण गर्ने प्रविधिलाई साइलेज भनिन्छ । यो एक किसिमको गुन्द्रुक हो किनभने प्रविधि मिल्दो जुल्दो छ । साइलेज सामान्यतय घाँसेबालीहरूबाट वा कोशे घाँसेबाली सँग मिश्रण गरी बनाउन सकिन्छ । साइलेज बनाउनका लागि फुल फुलन लागेको मकै, ज्वार, जुनेलो, सुडान, लुसर्न, बोडी, भटमास, क्लोभर आदि घाँसको बनाउन सकिन्छ ।

साइलेज बनाउने तरीका:

- साइलेज बनाउनका लागि २ - ३ मिटर गहिराई, १.५ - २.५ मिटर चौडाई तथा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको खाडल बनाउन सकिन्छ । अग्रेजीमा Silo Pile भनिन्छ ।

- साइलेजको तलबाट पानी आउने तथा हावा नछिर्ने गर्नका लागि खाडलको वरिपरि प्लाष्टिक राख्नु पर्दछ अथवा सडैका लागि हुने गरी खाडलमा सिमेन्टेड गर्न पनि सकिन्छ ।
- फुल फुलन लाग्दा घाँसपात वा अकोशे घाँस र कोशे घाँसबालीलाई काटेर ल्याउनु पर्दछ । यदि ज्यादै कलिलो वा पानीका मात्रा बढी भएमा घाममा ओइलाउनु पर्दछ ।
- त्यसपछि घाँसलाई २ - २.५ इन्चको टुक्रा पारी काट्ने वा Chaffing गर्ने ।
- टुक्रा टुक्रा पारी काटिएको घाँसलाई सफा तयारी खाडलमा राख्दै खुट्टाले थिच्दै सके सम्म कम हावा रहने हिसाबले खर्दनु पर्दछ ।
- यसरी खाडल भरिसके पछि खाडलको मुख देखि माथि ४ - ५ फिट अग्लो घाँसको थुप्रो पारेर प्लाष्टिकले छोपेर त्यस माथि माटो तथा ढुङ्गाले राम्रो सँग मिलाएर छोप्नु पर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य हावा र पानी छिर्न नदिनु हो । हावा र पानी खाल्डो भित्र पस्नो भने साइलेज कुहिन सक्छ ।
- खाडलको मुख सके सम्म प्लाष्टिकले छोप्ने र नभएमा गोबर माटोले राम्ररी लिप्नु पर्दछ । यसरी लिपिएको ठाउँमा सुकेपछि चिरा परी फुटेको ठाउँमा पुनः लिप्नु पर्दछ ।
- यसरी खाडलमा राखिएको साइलेज संरक्षण गरेको २ - ३ महिना पछि खुवाउनका लागि तयार हुन्छ ।
- राम्रो खालको साइलेज गुन्द्रुक जस्तै मिठो वास्ता आउँछ ।
- यसमा एकनासको रङ्ग तथा पानीको प्रतिशत पनि बराबर हुन्छ । यो अलि-अलि हरियो रङ्गको हुन्छ । कुहिएको वा काम नलाग्ने खालको साइलेजको रङ्ग कालो हुनुका साथै गन्ताउने हुन्छ ।
- यसरी तयार भएको साइलेजलाई एक छेउ देखि निकालेर खुवाउनु पर्दछ ।
- साइलेजलाई सामान्यतय १२ - १८ महिना सम्म राम्रो अवस्थामा संरक्षण गरी पशुलाई खुवाउन सकिन्छ ।
- साइलेज तयार भै सकेपछि खाडलबाट निकालेर गुन्द्रुक जस्तै सुकाएर संरक्षित गरी अन्य घाँस पराल सँग मिसाएर पनि खुवाउन सकिन्छ ।

साइलेजबाट हुने फाइदाहरू:

- साइलेज जुनसुकै समयमा बनाएर खुवाउन सकिन्छ ।
- यसलाई सजिलै सँग खाडलमा नै संरक्षित गरी हिउँदे सिजनमा पशुहरूलाई खुवाउन सकिन्छ ।
- यो हे घाँस भन्दा पोथिलो हुन्छ ।
- हे घाँसलाई जस्तो धन्यवाउनका लागि साइलेजलाई धेरै ठाउँको आवश्यकता पर्दैन ।
- साइलेज हरिदै हुने हुनाले पशुहरूले यस्तो किसिमको साइलेज खुब रचाएर (मन पराएर) खान्छन् ।

१२. नल र परालको पौष्टिकता बढाउने तरिका

हरियो घांस नपाईने समयमा पराल पशुहरूको मुख्य र सुख्खा आहारा हो । सुख्खा र पोषण दिने नल परालको साटोमा अरु हरियो केही दिन नसकिने अवस्थामा नल पराल नै गुणस्तर युक्त बनाउन सकिने प्रविधि कृषक समक्ष पुर्याउनु नितान्त जरुरी छ । नल परालको गुणस्तर र पौष्टिकता बढाउने सरल तरिकाहरू निम्न अनुसार छन्:

- सस्तो नलपराल भन्दा टुक्रा टुक्रा पारेर हरियो घांसमा मिसाएर दिएमा बेश हुन्छ । टुक्रा पारेको पराललाई सिधै खुवाउनु भन्दा पानीमा एक रात भिजाएर खुवाएमा अर्भै पचाउन सजिलो र राम्रो खाने हुन्छ ।
- टुक्रा पारेको पराललाई नुन पानीको घोलले भिजाउँदा पौष्टिकता पनि ज्यादा हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो र सजिलो तरिका नल पराललाई उपचार गर्नु हो । युरिया मिसाएको पराल खुवाउँदा पाचन शक्ति बढाउने र शक्ति प्रदान गर्ने सिद्ध भएको छ । दाना बनाउँदा मिसाएको एक प्रतिशत युरियाले दानाको २.८ प्रतिशत प्रोटीन बढाउँछ ।

एक प्रतिशत युरिया घोल बनाएर तुरन्त वा एक रात राखेर खुवाउन सकिन्छ । एउटा सलाईको बट्टा भरी हाल्दा १० ग्राम युरिया हुन्छ । १० ग्राम युरिया १ ली. पानीमा घोलेर १ के.जी. टुक्रा पारेको नल परालमा माथिबाट छर्केर छायामा राखी खुवाउन सकिन्छ । यसरी २ प्रतिशत सम्म सिधै खुवाउन सकिन्छ । चार प्रतिशतसम्म युरियाले उपचार गरेको पराल ३ - ४ हप्ता गुम्स्याएर (कुहाएर) आवश्यकता अनुसार फिक्दै छायामा सुकाएर मात्र पशुहरूलाई दिनु पर्छ ।

ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- यस्तो तरिकाले नल पराल खुवाइएका पशुहरूलाई प्रशस्त पानी दिनु पर्छ ।
- खुवाउनु भन्दा पहिले केही समय नल पराललाई छायामा सुकाएर मात्र दिनु पर्छ ।
- शुल्भा १ र २ के.जी. र बिलारै बढाउँदै लानुपर्छ । युरिया पराल पशुमा गन्ध आउने हुनाले नखाने पनि सक्छ तर बिलार बिलार बानी पर्दै जान्छ र खान घाल्छ । ४ हप्ता लगातार खुवाएपछि मात्र यसको असर देखिन्छ । साथमा भिटामिन भिनरल दिनुपर्छ ।
- युरिया उपचार गर्दा प्राविधिक सरसल्लाह लिनु अति जरुरी छ ।

विष लागेमा के गर्ने ?

ज्यादा युरियाको मात्रा आफैमा विषालु र हानिकारक हुन्छ । युरियाको मात्रा ज्यादा भएमा च्याल काढ्ने, छटपटी हुने, कुर्दने र उफेने, छिटो छिटो सास फेर्ने, एक ठाउँमा खडा रहन नसक्ने, धनुष्टकार भै मर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरायसी उपचार कागती वा निजुवाको अमिलो निचोरेर १-२ मात्रा जति खुवाउन सकिन्छ ।

१३. परालको पौष्टिकता बढाउने तथा युरिया मिश्रण गर्ने तरिका

पराल एक कृषि उप-पदार्थ हो । कृषिबाट प्राप्त उप-पदार्थहरू मध्ये ३७% पराल पशु आहारमा प्रयोग हुन्छ । कृषि उपपदार्थको अधिकांश भाग मध्ये पराल प्रयोग भए तापनि यसमा प्रोटीनको मात्र शुन्य अथवा पाचन योग्य प्रोटीन प्रतिशत पनि शुन्य हुन्छ । तसर्थ पराल खुवाउँदा पशु वसुलाई कुनै प्रकारको प्रोटीन उपलब्ध हुन सक्दैन । यसमा प्रोटीनको मात्रा बढाउन अथवा पौष्टिकता बढाउन युरियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

युरियामा ४२ - ४६ प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ । विभिन्न प्रकारका प्रोटीनहरूको पूर्ण रूप नाइट्रोजन हो भन्ने कुरा अगाडि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । युरियामा पाइने नाइट्रोजनमा नै विभिन्न प्रकारका प्रोटीन एमिनो एसिडहरू पाइन्छन् । पुरा युरियामा पाइने प्रोटीनको हिसाब गर्दा (२६.२५ - २८.५१)% प्रोटीन पाइन्छ । तसर्थ परालको पौष्टिकता बढाउन यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

युरिया परालको पौष्टिकता मात्र बढाउने नभई न्यून पौष्टिकता भएका पदार्थहरू नल, ढोड, गहुँको भुसा, कुनौरो आदिमा समेत यसको प्रयोग गरी पौष्टिकता बढाउन सकिन्छ ।

परालमा युरिया प्रयोग गर्ने तरिका:

परालमा युरियाको घोल छर्केर: पराल कुनै निश्चित तौलमा नापौ । मानौं १०० के.जी. पराल तौलेर छुट्ट्याउने । उक्त पराललाई ४ - ५ से.मी. को टुक्रा बनाउने । जति के.जी. पराल काट्यौ त्यती लिटर पानी लिने । अब, पानीमा २% युरिया घोलने । १०० लिटर पानीको लागि २ के.जी. युरिया, ५० के.जी. पराल र पानीको लागि १ के.जी. युरिया घोलने । पानीमा युरिया राम्ररी घुलाइ सकेपछि उक्त काटेको परालमा ओल्टाई पल्टाई छर्किने । यसरी प्रतिशत मिलाउँदा १ लिटर पानीको लागि २० ग्राम युरियाको हिसाबले राख्ने । यस्तो युरिया छर्किएको परालमा आवश्यकता अनुसार खुदो पनि मिलाउन सकिन्छ ।

परालमा युरिया उपचार गरेर: परालमा युरिया उपचार गर्दा ४% युरियाबाट उपचार गरिन्छ । उपचार गर्दा प्लाष्टिकको ठुलो थैला, खाल्डो, भकारी, काठ, सिमेन्ट आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पराललाई उपचार गर्दा १ लिटर

पानीको लागि ४०० ग्राम युरियाका हिसाबले युरिया घोलने । यो ४छ पनि बन्दछ । १०० लिटर पानीको लागि ४ के.जी. युरिया आवश्यकता पर्दछ । यसरी ४छ को घोल तयार गरिसके पछि जति युरियापानी छ त्यती नै के.जी. पराल लिई उक्त युरिया घोलेको पानी छर्किने । यसरी युरियापानी छर्किएको पराल प्लाष्टिक थैला, भकारी वा खाल्डोमा रामरी किसिलो ढल्नजतण गर्ने । त्यसमा हावा नरहने गरी खाँदुनु पर्दछ । हावा पसेमा वा भित्र रहेमा पराल सड्ने डर हुन्छ । उक्त खाल्डोको मुख प्लाष्टिक, स्याउला, पात आदिले ढाकेर बन्द गर्ने । यो उपचार प्रक्रिया पुरा हुन २ - ३ हप्ता लाग्छ । यसरी २ - ३ हप्ता पछि पराल तयार हुन्छ । पराल तयार भै सकेपछि खाल्डोको एक ठाउँमा सानो प्वाल पोरेर अलि अलि आवश्यकता अनुसार झिकेर खुवाउन सकिन्छ ।

युरिया प्रयोग गरेको आहारा खुवाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु:

- युरिया प्रयोग गरिएका आहारा एक पेट भएका जनावर घोडा, बंगुरलाई दिन हुँदैन । यसको विषाक्तपन पढ्छ ।
- उन र तौ उत्पादनको लागि प्रयोग हुने जनावरलाई पनि यस्तो आहारा दिन हुँदैन । उन र तौ उत्पादन गर्ने जनावरको उन, तौ खल्न सक्छ ।
- साना दुध खाने पाडा बाच्छालाई पनि दिन हुँदैन । विषाक्त भएर मर्न सक्छ ।
- यस्तो आहारमा खुदो या कार्बोहाइड्रेट भएको आहारा मिलाएर दिन उपयुक्त हुन्छ ।
- शुरुमा यस्ता आहाराको प्रयोग शुरु गर्दा १ के.जी., २ के.जी., ३ के.जी. गरेर बिस्तारै बढाउँदै ५/७ के.जी. सम्म दिन पर्छ । एकै पटक दिएमा विष लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।
- यस्तो आहारा दिदा तोकेको मात्रा भन्दा बढी दिन हुँदैन ।
- पशुले नखाएमा अन्य आहारमा अलि अलि मिलाएर खाने बानी पार्नु पर्छ ।

युरियाको विषाक्त (Urea Toxicity): आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा युरिया प्रयोग गरेको पराल खुवाएमा विष लाग्न सक्छ । चाहिने भन्दा बढी खुवाएमा युरियामा भएको न्युमोनिया रगतमा भिसिन्छ र पशु बेहोस हुने, बढी च्याल काढ्ने, शरीर बाउडिने, श्वास लिन कठिन हुने, ओठ मुखमा निलोपना देखा पर्ने, पेट फुल्ने, छिटो छिटो पिसाब गर्ने र बढी भएमा मर्ने पनि गर्छ ।

उपचार:

- पशुलाई प्रशस्त पानी पिउन दिने ।
- एसिटिक अम्ल, अभिलो, भिनेगर खुवाउने ।
- Atropine Sulphate तथा Avil सुईहरू लगाउँदा निको हुन्छ ।

१४. पशु आहारमा कृषि जन्य उप-पदार्थको प्रयोग

पशुहरूलाई सधैं एकै नासले हरियो घाँसहरू खुवाउन नसकिने भएकाले समय-समयमा अन्य चिजहरूबाट पनि काम लिन सकिन्छ । सामान्यतय मानिसले उपयोग गर्ने खाद्य पदार्थहरूको उप-पदार्थलाई पशुको आहाराको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । चामल मानिसले खानको लागि प्रयोग गर्छ भने भुस/बान आदि पशु आहारमा समावेश गराइन्छ । यसरी कुनै उप-पदार्थलाई सोझै र कुनैलाई अरुसँग मिसाएर पशु आहाराको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । तल दिइएका पदार्थहरूलाई पशु आहारमा यस प्रकारले प्रयोग गराइन्छ ।

खुदो (युरिया घोल: १२ भाग खुदो, २.५ भाग युरिया, २.५ भाग सफा पानी, २ भाग मिनरल मिक्सचर र एक भाग नून मिसाई पशुलाई खुवाउन सकिन्छ । १०० किलो ग्रामको यो घोलमा भिटामिन ए भएको कुनै औषधि २५ ग्राम मिसाउँदा अझ उपयोगी बन्दछ । युरिया र खुदोको घोल पशुलाई खुवाउँदा केही पशुहरू लरखराउने, अर्बिच हुने, केहि बढी च्याल काढ्ने, फनफनी घुम्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्दछ । यदि यस्तो भएमा घोल खुवाउन छाडी पुनः घाँसपात खुवाउन शुरु गर्ने र तातो पानीमा साबुन घोलेर ढाडमा लगाई कन्याइ दिनले पशुलाई ठिक हुन्छ । घोल खुवाउँदा अपनाउने नियमहरू यस प्रकार छन्:

- पहिलो ३ दिनमा सधैं खुवाउने दानालाई २५% ले कटौती गरी दाना दिए पछि आधा किलो उक्त घोल खान दिने ।
- त्यस पछि ३ दिनमा दाना ५०% ले र अन्य घाँसलाई २० - ३०% ले कटौती गरी दाना दिए पछि एक किलो ग्राम उक्त घोल खान दिने ।
- त्यस पछि ३ दिनमा दाना पूर्ण रूपले कटौती गरी घाँस पराल दिए पछि घोल चाहिए जति खान दिने ।

पराललाई सोडाले उपचार गर्ने: परालमा पाचन युक्त प्रोटीन नभए पनि सेलुलोज तथा हैमिसेलुलोज जस्ता कडा खाले चिनी जन्य पदार्थ हुन्छन् । परालमा क्याल्सियम पाइने हुन्छ र पराल पचाउन मुस्किल परे पनि ३/३ को कार्बिक सोडाको घोलमा ३ देखि ४ घण्टासम्म राखिदिनाले कडा खाले चिनी जन्य पदार्थहरू टुकिन्छन् र पशुले सजिलै पचाउँछन् । यसरी उपचार गर्दा परालको क्याल्सियम र चिनी जन्य पदार्थको पाच्य क्षमतामा ३० - ३५% ले बृद्धि हुन्छ । यस्तो एक लिटर घोलले एक किलो ग्राम पराल भिजाएर खुवाउन उत्तम हुन्छ ।

पराललाई पानीले भिजाएर: पराललाई पानीले भिजाएर खुवाउने गर्दा पराल टुक्रिएर खेर जाने समस्या हल हुने, नरम भए पछि पशुले मन पराएर खाने हुनाले एक लिटर पानीले एक किलो ग्राम पराल भिजाएर खुवाउँदा परालको पाच्य क्षमता वृद्धि हुन्छ ।

पराललाई युरियाले उपचार गरेर: घाँस नभएको समयमा पराल, गहुँको नल, मासको कुसाउरो खुवाइन्छ तर यसमा चिजहरूमा प्रोटिन प्रायः शुन्य हुने हुँदा यी सुकेका नलहरूलाई प्रोटिन युक्त बनाउन युरियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३-४% युरियाको घोलले पराललाई तह पारी भिजाउने र गुम्याएर १५ दिन सम्म राख्नाले युरियामा हुने नाइट्रोजनबाट प्रोटिन बन्दछ । उक्त प्रोटिन परालमा टाँसिने भएकाले प्रोटिनको मात्रा बढ्न जान्छ । यदि ४% भन्दा बढी युरियाको घोल बन्न गएमा पशुलाई विष लागी मर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रोटिन नशपी खान दिएमा पशुले मन पराएर (२०-२५)% सम्म खाने क्षमतामा वृद्धि हुने हुन्छ वा पराललाई २% को युरियाको घोलले उपचार गरी तुरन्तै खुवाउन सकिन्छ । १ लिटर पानीमा ४० ग्राम (४) युरिया राखी टुक्रा पराललाई छर्कदै तह बनाई १ महिनासम्म राखी गुम्याएर पशुलाई खुवाउँदा पौष्टिकता बढ्दछ ।

पराललाई पशुको पिसाबले उपचार गरेर: पिसाबमा एमोनिया तत्व हुन्छ र एमोनिया भनेको नाइट्रोजन हो, जसबाट प्रोटिन बन्न मद्दत गर्दछ । यसरी बनेको प्रोटिन (युरियामा जस्तै) परालमा सोसिएर बन्दछ । पराललाई पशुको पिसाबले उपचार गर्दा रच्चाएर पनि खाने र १.३६% ले प्रोटिन पनि बढ्ने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

जाँडको छोक्रा: यसमा भिटामिन बी प्रशस्त मात्रामा हुने हुँदा पशुको आहारा बनाउन सकिन्छ र दूध उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ तर ज्यादा खुवाउनु हुँदैन ।

धानको भुस (Husk): सुख्खा सिजनका लागि यो पशु वस्तुका लागि अति आवश्यक खुराक हो । यसले मासको भुसाको भन्दा राम्रो काम गर्दछ ।

बदामको भुसा: यो पशु वस्तुलाई पचाउन गाह्रो हुने पदार्थ हो तर युरियाले उपचार गरेमा पाच्य क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । (२-३)% युरियाको घोलले उपचार गराई खुवाउन सकिन्छ ।

धानको पतैबाट बनेको भुसा: सुख्खा र प्रशस्त मात्रामा पशु आहारा नपाइने बेलामा यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यसलाई प्रयोग गर्दा पराललाई राम्रो संग काटी मिलाएर खुवाउँदा राम्रो हुन्छ । (विशेष धारो पशुलाई मात्र)।

तोरीको गट्टे: पौष्टिकताले हेर्दा यो त्यति राम्रो मानिँदैन । धारा पशुहरूलाई कुनै अन्य चिजमा मिसाएर खुवाएमा हुन्छ ।

उखुको भुत्ता तथा टुप्पा: नेपालमा उखुको टुप्पा खुवाउने चलन भए पनि उखु पेली सकेपछि निस्कने भुत्ता खुवाउने चलन भने देखिँदैन । यो भुत्तालाई मसिनो बनाई टुक्र्याए पछि चोकर तथा खुदोसंग मिसाई खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।

पराल गहुँको भुसा: २% युरिया, १५% भेली र ०.५ - १% मिनरल मिश्रणलाई पानीमा घोली उक्त घोलमा ३ - ४ इन्च लामा परालका टुक्राहरूलाई राम्ररी डुवाई त्यसको चक्का बनाई ओभानो ठाउँमा राखेर लामो समयसम्म पशुलाई खुवाउन सकिन्छ ।

रखका पातहरू:

- पिपलको पात: पिपलका पातहरूमा ५.५% पाचन हुने कोरा प्रोटिन हुन्छ तर पनि अन्य हरियो घाँस नपाउने बेलामा यसको पात प्रयोग गर्नु उपयोगी हुन्छ ।
- बाँसको पात: पौष्टिकताका कारणले यसलाई राम्रो मानिन्छ । यसमा कोरा प्रोटिन लगभग (५-९)% हुन्छ । यसमा Oestrogenic factor हुन्छ भन्ने शंका गरिएको छ र किसानहरू पनि पशु बाली गएको बेला यसलाई खुवाउँदैनन् । त्यसैले यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
- नीमको पात: यो सालभर नै हरियो रहन्छ । यसमा पाचन हुने कोरा प्रोटिन ६ - ९.१९% हुन्छ ।
- आपको कोया: आपको कोयाको बाहिरको साह्रो भागलाई फोरी खुवाउन सकिन्छ । तर यसमा ५ - ७% ट्यानिन पाइने भएकाले प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । ४०% सम्म दानामा कटौती गर्न सकिन्छ ।

१५. पशुपक्षीहरूको सन्तुलित दाना तयार पार्ने

पशुपक्षीहरूको शारीरिक वृद्धि एवं उत्पादनको लागि सन्तुलित दानाको आवश्यकता पर्दछ । शारीरिक वृद्धि एवं अवस्थासँग-सँगै विभिन्न तत्वहरूको आवश्यकतामा समेत फरक पर्ने हुन्छ । खासगरी शरीरलाई चाहिने तत्वहरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, मिनरल र पानी हुन् । यी सबै तत्वहरू दानामा एउटा खास मात्रामा मिसाइएको हुन्छ । त्यस्तो दाना शारीरिक वृद्धि एवं आवश्यकता अनुसार राखिएको हुन्छ । यसलाई सन्तुलित दाना भनिन्छ ।

सन्तुलित दाना बनाउनको लागि निम्न जानकारीको आवश्यकता पर्छ:

- पशुपक्षीलाई आहारमा आवश्यकता पर्ने पोषण तत्वको रचना र त्यसको शुद्धता ।
- आहारा बनाउनको लागि प्रयोग गरिने कच्चा सामग्रीको विश्लेषण गरिएको जानकारी ।
- कच्चा पदार्थको उपलब्धता र तिनको मुल्य ।

उपयुक्त जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको आधारमा दाना बनाउँदा कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा धेरै प्रकारको पोषण तत्वलाई समेटेर दाना बनाउन हिसाब गर्न सकिन्छ । तर हालले वा क्यालकुलेटरले हिसाब गर्दा केहि पोषक तत्वलाई मात्र ध्यानमा राखिन्छ ।

सन्तुलित दाना तयार गर्दा खासगरी तीन किसिमका तत्वहरू हुन्छन्:

- अन्न तथा अन्न उत्पादन (Cereal and its byproducts): जस्तै: मकै, कोदो, गहुँ, चामल, त्यस्तै: Byproducts मा धानको डुटो, गहुँको चोकर आदि पिनीहरू कार्बोहाइड्रेटका स्रोत हुन् ।
- पिना (Oil Cakes): तोरी, सूर्यमुखी, सरसुं, बदाम आदिबाट तेल निकाली रहेका छोक्रोहरू यसमा प्रोटीनको मात्रा बढी भएकोले पशु आहारमा यसको बढी महत्त्व छ ।
- पशु जन्म उत्पादन (Animal Products): उच्च स्तरको प्रोटीन पाइने हुनाले पशु जन्म उत्पादनहरू पशु आहारमा हुनु अती आवश्यक छ । मत्स्य दाना (Fish meal, Meat meal, Blood meal and Bone meal) महत्त्वपूर्ण पशु जन्म उत्पादन हुन् ।

अन्न उत्पादन, पिना र अन्य पशु जन्म उत्पादनका पौष्टिक तत्वहरू:

पशु आहारा	कोरा प्रोटीन %	कोरा रेशा %	मे. शक्ति कि. क्या.
अन्नहरू			
मकै	८.९	२.१	३२७०
गहुँ	१२.५०	२.५	२९५०
चामल	८.४०	१.०	३४४०
अन्न उत्पादन			
धानको डुटो	९.०	८.१	२६२०
डिवाइलड धानको डुटो	१७.८	८.६	१७४०
गहुँको चोकर	१५.८	८.७	२०६०
पिनाको समूह			
तोरीको पिना	३६.०९	२३.१०	१५८०
सूर्यमुखीको पिना	३१.८०	२२.३०	१५९०
बदामको पिना	४७.१०	८.६०	२४१०
कपासको पिना	३५.९०	१३.५०	१८९०
भटमासको पिना	४६.३०	५.०	२३९०
पशुजन्म पदार्थ			
फिस मिल	५२.५०	०.८०	२४७०
भिटामिन	५०.३०	१.१०	२४९०

गाई, भैसीको लागि सन्तुलित दाना बनाउने: पिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सन्तुलित दाना दुई किसिमको हुन्छ ।

१. निर्वाहको लागि आवश्यक दाना (Maintenance Ration): यसले पशुको जीवन धान्न एवं काम नगरी शुपुनक बस्दा शारीरिक प्रक्रिया संचालन गर्न चाहिने दानालाई Maintenance Ration भनिन्छ । गाई, भैसीलाई Maintenance को लागि सामान्यतया अघाउन्जेल घाँसपात दिइन्छ ।

२. उत्पादनको लागि आहारा (Production Ration): हुर्कने अवस्थाको पशुले यसलाई बढ्ने, मोटाउने, मासु उत्पादन, दुध उत्पादन, कुखुरालाई फुल पार्ने, गोरुलाई जोत्न, भालेलाई बीउको लागि प्रयोग गर्न, गभिणी पशुलाई गर्भ पाल्न थप रासनको आवश्यक पर्दछ । उदाहरण: दैनिक १४ लिटर र ८ लिटर दुध दिने गाईलाई कति किलो दाना दिने ?

- यदि अघाउन्जेल घाँसपरात सेन्टेनेसको लागि खाना पाएका छन् भने पहिलो गाई १४ लिटर दुधलाई ७ किलो दाना र दोश्रो गाई ८ लिटर दुधलाई ४ किलो दाना दिए पुग्छ ।
- यदि गाई पराल मात्र खान्छ, घाँस, हे वा साइलेन खान पाउँदैन भने यस अवस्थामा थप २ किलो दाना अर्थात ९ किलो र ६ किलो दाना दिन पर्दछ ।

गार्ड भैसीको दाना तयार गर्दा उपलब्ध चित्रहरूबाट दाना बनाउदा कोरा प्रोटिन बरीब १५ प्रतिशत हुनु आवश्यक छ यसरी हिसाब गर्दा आहारलाई शुष्क पदार्थ (Dry Matter) र कुल पाचनशील पौष्टिक तत्व (Total Digestive Nutrient/TDN) मा हिसाब गरिन्छ ।

गार्ड, भैसीको दाना नमुना:

टाक्ने चित्रहरू	तरिका १	तरिका २	तरिका ३
धानको टुटो	३०	२९	३४
गार्डको चोकर	२२	३०	३०
मकै	३४	२५	२५
पिना	१३	१५	१०
नुन	१	१	१
जम्मा	१००	१००	१००
दानाहरूमा कोरा प्रोटिनको प्रतिशत	१४.९९	१४.९९	१५.०३

कुछुराको दाना बनाउने तरिका: कुछुराको लागि तल दिइए अनुसार १ नं. दाना, २ नं. दाना र ३ नं. दाना गरी तीन किसिमले बनाइन्छ:

टाक्ने चित्रहरू	१ नं. दाना	२ नं. दाना	३ नं. दाना
धानको टुटो	१०.००	२४.००	२४.००
गार्डको चोकर	२४.००	२०.००	१७.००
मकै	३७.००	४०.००	३१.००
भटमास	१०.००	४.००	५.००
पिना	४.००	४.००	७.००
माछाको सिधा	१०.००	४.००	७.००
हृड चूर्ण	१.००	३.००	२.००
सिपी	१.००	१.००	५.००
चुनहुँडा	१.००	१.००	५.००
मिनरल मिक्चर	०.५०	०.५०	०.५०
नुन	०.५०	०.५०	०.५०
जम्मा	१००.००	१००.००	१००.००
कोरा प्रोटिन प्रतिशत	२०.०२	१५.०३	१६.०३

पशुहरू हरियो घासपात चरन गर्दा कहिलेकाहीँ बिषालु झारपात खान पुग्दछन् र त्यसमा रहेको अपाच्य बिषालु पदार्थले पशुलाई रोगी बनाउँदछ । केही प्रोटिन जन्थ घासपात वा बोटविस्वा एउटा खास मात्रामा अति फाइदाजनक भए तापनि धेरै मात्रामा खान पुगेमा बिष लाग्ने हुन्छ । नेपालमा पाइने केहि सामान्य बिष लाग्ने बोटविस्वाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१) नाइट्रेट: सींचत गर्ने जै, कलिलो गहुँ, सुडान, स्वीट क्लोभर, फुल अगावै कलिलो घास धेरै मात्रामा खाएमा पशुलाई ६ घण्टा पछि बिष लाग्न मर्ने समेत हुन्छ ।

लक्षण: चाल काढ्ने, पेट दुल्ने, छटपटाउने, मांशपेसीमा कम्पन हुने, तुहिनै पिसाब थोरै-थोरै तर पटक-पटक गर्ने, दुध उत्पादन घटाउने, पशुको रगा कफी रङ्गको हुने आदि ।

उपचार:

- मिथाइलिन (२-४)% (२०-४०) एम.एल. नशामा दिने ।
- लिक्वीड पाराफिन बुवाउने ।

२) लेकाली बिष (Aconite Poison): उच्च पहाडी चरन क्षेत्रमा यस बोटक पात, फुल आदि घास सित मिसिएर भेडा, बाख्राले खाएमा लेकाली बिष लाग्दछ ।

लक्षण: चर्न छोड्ने, झोक्र्याउने, हिड्न नसक्ने, भुडी फुल्ने, मुखबाट फिँ निकाल्ने र मर्ने ।

उपचार: सोडियम थायोसल्फेट १० ग्राम १०० एम.एल. पानीमा घोली खा दिने वा ३० एम.एल. ५ झोल नशामा दिने ।

३) उल्लुको बिष (Brackenfern Poisoning): यस प्रकारको बिषालु घास मध्य पहाडको चरन क्षेत्रहरूमा पाइन्छ । साधारणतय घासको अभाव भएकामा पशुले खान पुग्दा बिषाक्त भई पशुमा रगत आउँछ ।

उपचार:

- गार्ड, भैसीलाई डाइलुट ब्यूटाइल अल्कोहल १ एम.एल. १०० एम.एल. नर्म सलाइन घोली नशामा ३-४ दिन सम्म दिने ।
- बोट सेक्ट्रम एन्टीबायोटिक दिने ।
- थायमिनको कभि (बिषाक्त भएर) भएमा थायमिन इन्जेक्सन दिने ।

४) हाइड्रोसाइनिक विष: कलिलो अवस्थामा जुनेलो ४५० किलो ग्राम जति पशुलाई खुवाएमा लगभग १ ग्राम हाइड्रोसाइनिक विष उत्पादन हुन्छ । यो पशुलाई मार्न पर्याप्त हुन्छ ।

लक्षण: साइनडडको विषले स्नायुमा र रगतमा अक्सीजनको कमी गराउँदछ । जसले गर्दा एक्कासी लड्ने, श्वास फेर्न कठिनाई हुने, मुखबाट फिंज काढ्ने, आँखाको नानी फैलिने, मांशपेशीमा कम्पन हुने, पेट फुल्ने आदिले पशु तुरन्त मर्दछ ।

उपचार:

- सोडियम नाइट्रेट २ ग्राम, सोडियम थायोसल्फेट १५ ग्राम र २०० एम.एल. नर्मल सलाइन घोली नशामा दिने । सोडियम थायोसल्फेट १ घण्टाको फरकमा खुवाउने ।
- डेक्स्टोज सलाइन, क्याल्सीयम बोरोग्लुकोनेट, भिटामिन च१२ दिन सकिन्छ ।

५) कपासको बीउको विष (Cotton Seed Poison): कपासको बीउमा पाइने विषाक्त गोसीपलले पशुमा विष लाग्दछ । यसले गर्दा पशु मर्ने हुन्छ । कपासको बीउमा ४० प्रतिशत पाइन्छ । त्यसैले यो बंगुर र कुखुराको दानामा मिसाउने गरिन्छ । तर १ भन्दा बढी मिसाइएमा विषाक्त हुन्छ ।

लक्षण: एक्कासी मर्ने, छेर्ने, पेट फुल्ने, झोकाउने, पिसाब बन्द हुने आदि।

उपचार:

- फ्युरोसेमाइड ४ मि.ग्रा./के.जी. प्रयोग गर्ने ।
- आइरन डेक्स्टोज १ मि.ग्रा./के.जी. प्रयोग गर्ने ।
- डेक्सापेथासोन प्रयोग गर्ने ।

६) अङ्ग्रेरी पात खाएर: यो झारपात बुट्यान सित मिसिएर रहने भएकोले पशुले यसलाई खाएमा ४-५ घण्टामै विष लाग्दछ । यसबाट मुखमा च्याल आउने, झोकाउने, श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, पेट फुल्ने र छेर्ने हुन्छ ।

उपचार: सोडियम थायोसल्फेट, नर्मल सलाइन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, रुमेन बोलस आदि प्रयोग गर्ने ।

७) नुनढिकी झारपात: यसको विषाक्त, लक्षण र उपचार अङ्ग्रेरी झारको जस्तै हुन्छ ।

८) दुधे झारबाट पनि विष लाग्छ ।

९) लेन्टाना (बढी फूल)को विष: यसको विषबाट पिसाब बन्द हुने र क्यान्सर समेत हुने गर्दछ ।

१०) सु-बाबुल (ल्युकोना ल्युकोसेफाला): यसबाट पुच्छर झर्ने रोग लाग्दछ ।

१७. माछा पालन

माछाका जातहरू र उत्पादन प्रविधि

तराई, भित्री मधेश तथा न्याने पानी मध्ये पहाडी भागमा माछा पालनवलागि सिफारिस गरिएका साना जातका माछा मध्ये तीन जात स्थानीय छ भने बाँकी अरु चार जात विदेशबाट आयातित हुन् ।

क) स्वदेशी जातका माछा कार्य: नेपालमा पाइने स्वदेशी जातका माछाला भेजर कार्य भनिन्छ । यी माछा तराईका नदीनाला, खोल र रिर्जभ्यारहरूमा पाइन्छन् । नेपालमा पालिने स्वदेशी कार्य जातका माछा क्रमशः रोहु, नैनी मुगल) र भाकुर (कल्ला) हुन् । यी माछाको संक्षिप्त परिचय तल उल्लेख छ ।

१) रोहु: यो माछाको लम्बाई बढीमा १० से.मी. सम्म पाइएको छ शरीरलाई ठुलो ठुलो कल्लाले ढाकेको हुन्छ । टाउको सानो हुन्छ । ओटो मोटो र तल तिर फर्केको हुन्छ । माछाको शरीर करीब गोला, माथिल्ले भाग छैरो कालो, हल्का हरियो रङ्गको हुन्छ भने तल्लो भाग सेतो हुन्छ बिकी योग्य माछाको शरीरको कल्लामा रातो रङ चढेको हुन्छ । यो माछा पोखरीको सबै भागमा चहारेर आहारा खान्छ । पोखरीमा उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका विषाणुहरूका साथै कुहिएका झारपात समेत खान्छ । यसमा माछा मासु र बोसोको परिमाण मिलेकोले खानमा निकै स्वादिलो हुन्छ यो माछा पहिलो वर्षमा ३०० देखि ५०० ग्राम सम्म बढ्छ भने दोश्रो वर्षमा यसको वृद्धि राम्रो हुन्छ । नेपालमा कृत्रिम तरीकाबाट ह्याचरीमा यो माछालाई प्रजनन गराइन्छ ।

२) नैनी: यस माछाको शरीरको सबै भाग ठुलो कल्लाले ढाकेको हुन्छ । माछाको शरीर रोहु माछा जस्तै हुन्छ तर जीउ अलि पातलो, टाउको सानो, ओट पातलो र चुच्चो परेको हुन्छ । जीउ हल्का छैरो चाँदी रङ्गको हुन्छ । पोखरीको तल्लो भागमा यो माछा बस्छ र सडेगलेका वस्तुहरू जस्तै झारपात, अविक प्राणीजन्य जीवाणु आदि खान्छ । यो माछाले दाना पनि खान सक्छ । यसको वृद्धि पहिलो वर्षमा ३०० देखि ७०० ग्राम हुन्छ भने दोश्रो वर्षमा वृद्धि राम्रो पाइन्छ । यो माछाको प्रजनन पनि कृत्रिम तरीकाबाट गरीन्छ ।

३) भाकुर: यो माछाको आकार छोटो तर बीच भाग अगलो र शरीर चेट्टो हुन्छ । शरीरको पुरै भागमा ठुलो खरानी रङ्गको कल्लाले ढाकेको हुन्छ ।

टाउको ठुलो र मोटो ओठ माथि तिर फर्केको हुन्छ । यो माछा पोखरीको माथिको भागमा विचरण गरेर मुख्यतया सुक्ष्म प्राणीजन्य जिवाणु खान्छ । यसको वृद्धि दर रोहु, नैनी भन्दा बढी हुन्छ अर्थात् एक वर्षमा १.५ देखि २ किलो सम्म पाइएको छ । यो माछाको प्रजनन पनि कृत्रिम तरीकाबाट गरिन्छ । प्राकृतिक आहारा उत्पादन हुने पोखरीमा यो माछाको वृद्धि राम्रो पाइन्छ ।

ख) विदेशी जातका कर्प माछा: हाम्रो देशको न्यानो हावामा हुर्कन सक्ने, पोखरी भित्र उत्पादन भएका सबै प्रकारका वस्तु द्वारापात खाएर चाडै बढ्ने, प्राकृतिक रकृत्रिम तरीकाबाट प्रजनन गराई भुरा उत्पादन गर्न सकिने आदि विशेषता भएका कर्प जातका माछा विगतका दशकहरूमा भारत, इजरायल, जापान र हंगेरीबाट भित्र्याइएका हुन् । यी माछाहरूमा जस्तै: कमन कर्पका दुई प्रजाति जस्तै शरीमा कल्ला भएकालाई जर्मन कर्म र थोरै कल्ला भएकालाई इजरायली कर्प भनिन्छ । यसरी नै चाइनिज कर्पका तीन जातका माछा क्रमशः सिलभर कर्प, विगहेड कर्प र ग्रास कर्प हुन् ।

१) कमन कर्प: कमन कर्पको शरीर छोटो, टाउको सानो, ढाडको भाग अलि उच्चो परेको र शरीरको बीच भागमा बढी चौडा भएको हुन्छ । टाउकोमा दुई जोडा जुङ्गा हुन्छ र शरीर सुनौलो पहेँलो कल्लाले ढाकेको हुन्छ । यी माछा पोखरीमा उत्पादन भएका सबै कुरा खान्छन् अथवा सर्वहारी हुन् । पिनीहरू पोखरीको भिंघमा चहार्ने, त्यहाँ हिलो खोतालेर माटो भित्रका किरा, सडेगलेका झारपात, प्राणीजन्य ठुला जिवाणु, शंखे किरा आदि खाने गर्छन् । यि माछाले दाना खान रुचाउँछन् । प्रतिकुल परिस्थितिमा बार्चन सक्ने र एक वर्षमा १ देखि १.५ किलो सम्म बढ्छन् । यी माछाका भुरा उत्पादन प्राकृतिक तरीकाबाट गर्न सकिने र माछा स्वस्थितो भएकोले कमन कर्प माछा संसार भरि नै अति लोकप्रिय माछाको रूपमा गनिन्छन् । कमन कर्पको र उपजाति छन् । माछाको शरीरमा कल्ला कम वा नहुने माछालाई ईजराईली कर्प र कल्ला शरीर भरी हुने कमन कर्प माछालाई जर्मन कर्प भनिन्छ ।

२) सिलभर कर्प: यो माछाको शरीर दायाँ बायाँबाट चेप्टो र पेट र छातिको भाग धारिलो हुन्छ । पुरा जीउमा सानो सानो टालिकेने कल्ला हुन्छ । यो माछा पानीको माथिल्लो सतहमा बस्ने र वनस्पतिजन्य सुक्ष्म जिवाणु लेउ वा अल्गी खान्छ । यसको मुख केहि चुच्चो र माथि तिर फर्केको हुन्छ । यी माछा धेरै चाडै बढ्ने अर्थात् सालमा १ देखि १.५ किलो तौल सम्म पुग्छ । नेपालमा यो माछा ३० देखि ४० किलो तौल सम्म बढेको पाइएको छ । यो माछाको प्रजनन कृत्रिम तरीकाबाट गर्न सकिन्छ । यो माछाको मासु नरम

भएकोले गरिभयाममा चाडै बिग्रिन्छ र साइजका माछामा काँडा अलि बढी नै हुने हुँदा मानिसहरूले त्यति मन पराउँदैनन् । ठुलो साइजको माछा बोसिलो र स्वादिलो हुन्छ ।

३) विगहेड कर्प: यो माछाको टाउको ठुलो र जीउ पातलो, सिलभरकर्प माछा जस्तै देखिन्छ । मुख ठुलो र माथितिर फर्केको हुन्छ । शरीरको सानो माथिको भाग फुस्रो, केहि कालो खरानी रङ्गको र पेटमा सेतो टल्कीने सानो कल्ला शरीर भरी हुन्छ । शरीरमा दायाँबाट चेप्टो र पेट भन्दा छातिको सानो भाग धारिलो हुँदैन । यी जातका माछा पानीको मध्ये भागमा बस्ने र प्राणीजन्य सुक्ष्म जिवाणु खान्छन् भने केहि वनस्पतिजन्य जिवाणु समेत खाएको पाइन्छ । सिलभरकर्प भन्दा कम काँडा हुने र तौलमा ४० देखि ५० किलो सम्मको समेत पाइएको छ । यो माछा भाकुर माछाको आहार सित प्रतिस्यर्धा गर्छन् । यसको प्रजनन कृत्रिम तरीकाबाट गर्न सकिन्छ ।

उत्पादन प्रविधि: पोखरीको सरसफाई गरी सकेपछि पानी भर्नु भन्दा तीन दिन अगावै १० देखि १५ किलो घर पोल्ने चुन प्रति कका दरले चारै तिर फिँजिने गरी छर्नु पर्छ । चुनले पानी वा माटोलाई किटाणु रहित पार्छ, माटोको अभिनय पुन हटाउँछ । हानिकारक अन्य किरा लगायत जङ्गली माछा समेत मर्दछ र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउनमा मद्दत मिल्छ ।

पानी भर्ने: पोखरीमा चुन प्रयोग गरेको २ दिन पछि पानी भर्नु पर्दछ । खोला वा नहरको पानीबाट जंगली माछा पोखरीमा जाने हुँदा बोरीङ्ग, इनार वा मुलको पानीको श्रोत राम्रो हुन्छ । शहर भित्रबाट आउने वा औद्योगिक क्षेत्रका कारखाना वा खानीबाट आएको पानीमा हानिकारक रासायनिक पदार्थ हुने हुँदा माछा पालनको लागि यस्तो प्रदूषित पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्ता पानीमा माछा पाल्दा, सडेगलेका दुषित पदार्थ वा हानिकारक रसायनले गर्दा पानीमा भएको अक्सिजनको कमि हुन गई माछा मर्दछ । पोखरीमा पानी भर्दा, मसिनो जाली सटर राखेर मात्र पानी छाड्नु पर्छ । यसले गर्दा जङ्गली माछा पोखरीमा जानबाट रोकिन्छ ।

माछाको भुरा छाड्ने

भुराको संख्या निर्धारण: माछा भुराको संख्या निर्धारण निम्न कुराहरूमा निर्भर गर्दछ ।

- माछाको जात,
- स्थानीय बजारमा बढी मुख्यमा बिक्री हुने माछाका जात
- माछाको व्यवस्थापन विधि जस्तो सामान्य, उन्नत तथा सघन विधि आदि ।
- माछालाई दाना खुवाएर नयाँ वा पुरानो पोखरीमा मत्स्य पालन गर्ने,
- दाना र मल दुवै राखेर माछा पालन गर्ने,

- एकिकृत मत्स्य पालन विधि अपनाएर माछा पालन गर्ने ।

पोखरीमा पानी भरे पछि, सूर्यको किरण र पानीमा घुलित लवणहरूले गर्दा सर्वप्रथम सुक्ष्म जिवाणु र विभिन्न प्रकारका वनस्पतिजन्य जिवाणु उत्पादन हुन्छ । यसका साथै प्राणी जन्य जिवाणु, शंखे किरा तथा अन्य साना ठुला किराको अलावा पानी भित्र तथा पोखरीको छेउमा झारपात उत्पादन हुन्छन् । पोखरीको विभिन्न भाग वा सतहमा उत्पादन भएका प्राकृतिक आहार विभिन्न कार्प जातिका माछाले सदुपयोग गरी माछा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यस प्रकारको मिश्रित खेतीको निर्मित चाडनिज र मेजर कार्प उत्तम मानिएका छन् ।

माछाको घनत्व वा स्टकिङ्ग दर: पोखरीमा माछाको घनत्व वा संख्या निर्धारण पोखरीको व्यवस्थापनको आधारमा भर पर्दछ । यसको अतिरिक्त बजारमा माछा बिक्री हुने साइजको आधारमा कृषकले निर्णय गर्नु पर्दछ । माछाको घनत्व निकाल्न निम्न सूत्रको सहयोग लिनु पर्दछ:

माछाको अनुमानित उत्पादन (किलो) $\times$ माछा भुराको घनत्व (प्रति बिघा) $\times$ मृत्यु दर $\%$ = अनुमानित औसत (तौल)

जस्तै:

- अनुमानित उत्पादन ३००० किलो/बिघा
- भुराको मृत्यु दर १० प्रतिशत
- अनुमानित औसत तौल १ किलो
- माछाको घनत्व वा स्टकिङ्ग ?

यहाँ:

- $3000/1 \times 10\% = 3000/1 \times 10/100 = 300$
- त्यसैले, माछाको घनत्व वा स्टकिङ्ग = $3000 + 300 = 3300$

सामान्य रूपमा नर्सरी पोखरी, भुरा हुर्काउने र उत्पादन पोखरीमा क्रमशः १०० देखि २०० गोटा, १० देखि १५ गोटा र १ गोटा प्रति वर्ग मिटर पानीको क्षेत्रफलमा माछा भुरा राख्नु पर्दछ ।

माछा भुराको अनुपात (मिश्रित मत्स्य पालन): विभिन्न जातका माछा भुरा एउटै पोखरीमा राखेर पालन गरिने कार्यलाई मिश्रित मत्स्य पालन भनिन्छ । मिश्रित मत्स्य पालन विभिन्न प्रविधि अपनाएर गरिन्छ । माछाको अनुपात निम्न अनुसार निर्णय गर्ने सकिन्छ ।

मिश्रित मत्स्य पालन प्रविधि:

- माछाको घनत्व = ५००० देखि ५५०० गोटा/बिघा
- सरदर तौल = १० देखि २५ ग्राम ।

माछाको जातहरू, भुरा स्टकिङ्ग प्रतिशत र माछाको संख्या:

माछाको जात	प्रतिशत	माछाको संख्या	कैफियत
कमन कार्प	२० - २५	१०००	स्टकिङ्गमा प्रमुख माछा सिलभर कार्प
सिलभर कार्प	३५ - ४०	१५०	
विगहेड कार्प	१० - १५	५००	
ग्रास कार्प	५ - १०	२५०	
रोहु	१० - १५	५००	
नैनी	१०	५००	
भाकुर	१०	५००	
जम्मा	१००	५०००	

उत्पादन पोखरीमा जति सक्दो ठुलो साइजको भुरा राख्नु पर्छ ।

सघन मत्स्य पालन प्रविधि: यस प्रविधिमा माछालाई गुणस्तर युक्त सहायक खाना र आवश्यकतानुसार मल प्रयोग गरिन्छ:

- माछाको घनत्व = ६००० देखि ७००० गोटा/बिघा
- सरदर तौल = १० देखि ४० ग्राम

माछा भुराको संख्या निम्नानुसार अनुसार निकाल्नु पर्दछ ।

माछाको जात	प्रतिशत	माछाको संख्या	कैफियत
कमन कार्प	२० - २५	१०००	स्टकिङ्गमा प्रमुख माछा सिलभर कार्प
सिलभर कार्प	३५ - ४०	१५०	
विगहेड कार्प	१० - १५	५००	
ग्रास कार्प	५ - १०	२५०	
रोहु	१० - १५	५००	
नैनी	१०	५००	
भाकुर	१०	५००	
जम्मा	१००	५०००	

पोखरीमा पानी भरे पछि सबभन्दा पहिले वनस्पतिजन्य सुक्ष्म जिवाणु उत्पादन हुन्छ र यसलाई सिलभर कार्पले खाने हुँदा यो माछाको वृद्धि अरु माछा भन्दा बढी हुन्छ र विगहेड कार्प र भाकुरको खानेबानी एकनास भएकोले यी मध्ये एउटा माछाको स्टकिङ्ग दर अर्को भन्दा आधा मात्र राखिन्छ । त्यसै गरी

कमन र नैनी पोखरीको पिथमा चरन गर्ने हुँदा नैनी माछा ५ देखि १० प्रतिशत सम्म मात्र स्टक गरिन्छ । यस्तै गरी घास जस्तै सभार, जलकुम्भी, पिस्टीया आदि पोखरीमा छ भने ठुलो साइज ५० देखि १०० ग्रामको ग्रास कार्पलाई मुख्य मानेर स्टक गर्नु पर्छ । उत्पादन ३००० देखि ३४०० किलो प्रति बिघा हुन्छ ।

मेजर कार्प माछाबाट मिश्रित माछा पालन:

- माछाको घनत्व = ४००० देखि ६००० गोटा/बिघा
- सरदर तौल = १० देखि ४० ग्राम

अनुपात तलको तालिकानुसार - माछाकोजात, भुरा स्टकिङ्ग प्रतिशत र माछाको संख्या तालिका:

माछाको जात	प्रतिशत	माछाको संख्या	कैफियत
रोहो	४०	१६००	
नैनी	३०	१२००	
भाकुर	२८	११२०	
ग्रास कार्प	२ - ५	८०	बोनसको रुपमा राख्ने ।
जम्मा	१००	४०००	

विभिन्न जातका माछाबाट मिश्रित मत्स्य पालन गर्दा, पोखरीको उत्पादन क्षमता, माछा उत्पादनको व्यवस्थापन पक्षको अलावा कृषकको आफ्नो अनुभवको आधारमा माछाको अनुपात निर्णय गर्ने सकिन्छ । माछापालनको मुख्य उद्देश्य कृषकले बढी आम्दानी पाउनु रहेकोले बजारमा माछाको मागलाई ध्यानमा राखेर माछाको अनुपात राख्नु पर्दछ । साल भरी स्टकिङ्ग र उत्पादन पद्धतिमा ठुलो माछालाई बिक्री गरी सोही जातका ठुला माछाका भुरा पोखरीमा स्टक गर्नु पर्छ । यस पद्धतिबाट बढी माछा उत्पादन गर्नेमा मद्दत मिल्छ र सोही अनुसार आम्दानी पनि बढी प्राप्त हुन्छ । बढी माछा उत्पादन गर्न पोखरीमा फाल्गुण महिनामा ठुलो साइज जस्तै १०० ग्रामको भुरा उपलब्ध छ भने ४००० गोटासम्म स्टक गरे हुन्छ ।

खुरसिको मासु गज्जटा माछा खानु स्वस्थकर हुन्छ ।

१८. माछाका रोगहरू र तिनको रोकथामका उपायहरू

माछा जलिय प्राणीको नाताले समयानुसार विभिन्न कारक तत्वहरूले दुःख दिइरहेका हुन्छन् । जस मध्ये माछाको उत्पादनमा किमि गराउने एक प्रमुख कारण रोग पनि हो । रोग बिना कारण लाग्दैन । यसका लागि माछा, जलिय वातावरण र जिवाणुको एक आपसमा त्रिकोणात्मक मेल हुनु जरुरी छ । यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा जब घटबढ हुन्छ तब रोग लाग्न शुरु हुन्छ । त्यसको सम्बन्ध जब बिग्रन्छ तब माछालाई विभिन्न तरीकाबाट अक्सीजनको महशुस हुन थाल्छ । साधारण अवस्थाबाट असाधारण अवस्थामा बदलिन मद्दत गर्ने कारक तत्वहरू मध्ये मुख्य मुख्य यस प्रकार छन्:

- पानीको गुण
- तापक्रम: क) एक्कासी बढ्ने र घट्ने तथा ख) चारिणको भन्दा बढी हुनु
- बढी घनत्वमा माछा स्टक गर्नु
- पोषण तत्वको किमि
- माछा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा
- खराब वातावरण
- खराब वा रफ ह्यान्डलिंग
- पिडेटरर्स (प्रतिभक्षि तथा किरा)
- दुषित दाना: जस्तै, जङ्गली माछाको सिधा खुवाउँदा पनि रोग लाग्न सक्छ

तसर्थ रोग लागिस्केपछि उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नु अघि रोग लाग्न नसक्ने वातावरण तयार पारी दिनु अति उत्तम हुनेछ । यसका लागि पोखरीमा माछा राख्नु अगावै पोखरीलाई राम्रो संग सरसफाई गर्नु अति जरुरी हुन आउँछ । यस कार्यका लागि पोखरीको पुरानो पानी घटाई केही समय सुकाउने, पोखरीमा अख्तिय तथा क्षारीयपनको आधारमा चुन्ना प्रयोग गर्ने, सफा र स्वस्थ मुहानबाट पानी ल्याई पोखरीमा राख्ने, पोखरीको मुहानमा जाली लगाई पानी घटाउने, समय समयमा पोखरीमा प्रयोग गरिने .सामग्री जस्तै जाल, रासायनिक औषधिले उपचार गरी प्रयोग गर्ने, जङ्गली माछा, किरा तथा प्रतिभक्षित जीव हटाउने, आवश्यक भन्दा बढी माछा भुरा स्टक नगर्नुका साथै चारिने भन्दा बढी खानेकुरा पोखरीमा प्रयोग नगरी पानी दुषित हुनबाट जोगाउने आदि कार्यमा बढी विचार एवं कार्यशैली अपनाउँदा पोखरीको सम्पूर्ण वातावरण एवं पानी स्वस्थकर हुन गई माछामा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोगबाट मुक्त हुनुका साथै अन्यमा बढी उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मत्स्य व्यवसायीहरूलाई आर्थिक लाभ बढाउन थप मद्दत मिल्नेछ ।

माथिका कार्य पुरा गर्दा गर्दै पनि कहिले काही केही घटबढ हुँदा माछामा रोग लाग्न सक्छ । रोगले आक्रमण गरेपछि माछाको बाहिरी लक्षण तथा क्लीनीकल परिक्षणमा निम्न लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ ।

बाहिरी लक्षण:

- खानेकुरामा रुचि कम हुने, रुचि नहुनु
- मृत्यु दरमा बृद्धि हुनु
- बानी व्यहोरामा परिवर्तन आउनु: पौड्दा साधारण अवस्था भन्दा फरक देखिनु, झुण्डमा हिँड्ने बानी नदेखिनु, घसेर हिँड्नु, पोखरीको एक किनारमा जम्मा भएर बस्नु, पखेटामा धेरै जाली देखा पर्नु ,
- साधारण रङ्गमा परिवर्तन (खासगरी कालो हुनु)
- जिउमा रगतका थोप्ला जस्ता दाग देखा पर्नु ।

भित्री लक्षण:

- शरीरको भित्री भागमा रगत देखा पर्नु (दाग)
- शरीरको भित्र पानी जम्मा हुनु
- किड्नी, फियो, आन्त्रा आदि सुनिनु ।

माछामा लाग्ने रोगहरू खास समस्या मध्ये कुसी, ब्याक्टेरीया, प्रोटोजोवा, कस्टेसिया तथा जुका प्रमुख कारक तत्वहरू हुन् । यिनीहरू मध्ये केही रोगका जिवानु मध्येबाट हुने अर्को रोग हो ईपिजुटिक अल्सेरेटिभ सिण्ड्रम । यो रोगले हाल नेपालमा समेत बढी नोक्सान पुर्‍याउन थालेको छ । यसको खोजी पनि व्यापक भैरहेको छ । यसको विस्तृत जानकारी तल उल्लेख गरिएको छ ।

ईपिजुटिक अल्सेरेटिभ सिण्ड्रम रोगबाट प्रभावित जातहरू:

- धेरै जसो माछाका जातहरू
- खासगरी भोटी किसिमका माछाहरू
- हावाबाट श्वास प्रश्वास लिने जातहरू
- टिलापिया र विगहेड कार्य कम प्रभावित
- भारतीय मेजर कार्य बढी प्रभावित ।

रोग ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने तत्वहरू:

- तापक्रम, जमिरहने किसिमको घोल, माछाले खाए फालेको फोहोर मैला(हिसा), दुषित औद्योगिक वातावरण, किटनाशक औषधिको प्रयोग
- वर्षा सिजन र वर्षा पछि धान खेतमा प्रयोग गरिने कृषि रसायनहरू

- पानीमा बढी मात्रामा अल्मिनियम र फलाम जस्ता धातुको मात्रा बढी भएमा यसले माछाको गिललाई नोक्सान पुर्‍याउँछ
- माटोमा बढी मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ भएमा
- पानीको गुणावस्था बिग्रन गएमा:
 - समयानुसार पानीको तापक्रम तथा क्षारीयपन छिटो घट्न गएमा
 - पानीको तापक्रममा अस्थिरता भएमा
 - वार्षिक योगमा दैनिक तापक्रम भन्दा दिन दिनैको योग तापक्रम कम हुन गएमा
 - पि.एच. छिटो छिटो घटबढ भएमा ।

माछाको बानी व्यहोरामा फरकपन:

- माछाको रुचि घट्नु
- पौड्दा माछाको टाउको पानी बाहिर पारेर पौड्नु
- प्यारालाइसिस भएको जस्तै तैरीदै हिँड्नु ।

उपचार:

- पानीको पि.एच.का आधारमा ४० देखि १०० के.जी. प्रति हेक्टरका दरले चुना प्रयोग गर्ने ।
 - १ प्रतिशत नुन वा ३/४ प्रतिशतमा डुबाउने ।
 - पोटासियम परम्यानेट ३ देखि ५ पि.पि.एम.का दरले प्रयोग गर्ने ।
 - क्लीवीड पाउडर ५ देखि १० के.जी./हेक्टर प्रयोग गर्ने ।
 - मालाकाईट ग्रीन १ पि.पि.एम.
 - डिप्टेरक्स, डाईक्लोरोफन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
 - सिफुयाक्स १ के.जी. प्रति हेक्टर प्रति मिटर पानीको गहिराईका लागि (तर यो नेपालमा उपलब्ध छैन) ।
 - लान्टोमाइसिन १०० ग्राम प्रति हेक्टर प्रति मिटर पानीको गहिराईको लागि
 - चेलकोप ५०० ग्राम प्रति हेक्टर प्रति मिटर पानीको गहिराईका लागि ।
- माथि दिइएका उपचारका तरीका बाहेक सब भन्दा राम्रो तरीका पानीको गुणावस्था मिलाई राख्नु हो ।

औषधि उपचार गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- उपचार गर्नु भन्दा २४ घण्टा अगाडि देखि माछा भोको राख्ने ।
- स्टिकङ्ग घनत्व कम गर्ने ।
- औषधि प्रयोग गर्दा विहान तापक्रम कम भएको समयमा गर्ने ।
- पोखरीमा पानीको मात्राको आधारमा औषधिको मात्रा ठीक तत्वले निकली प्रयोग गर्ने ।
- उपचार समयका सम्पूर्ण कार्यहरू रेकर्ड गरी राख्ने ।
- पानीको अक्सीजनको मात्रा जाँच गर्ने ।
- औषधि प्रयोग गर्दा पहिला केहि माछामा प्रयोग गरी हेर्ने ।

१९. तरकारी खेती

उन्नत तरकारी खेतीमा नर्सरी व्यवस्थापनको महत्त्व

परिचय: सानो ठाउँमा विशेष तरीकाद्वारा तरकारीको बीउ रोपेर वेर्ना हुर्काउने व्यवस्थालाई नर्सरी व्यवस्थापन भनिन्छ । तरकारी रोप्ने काम दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ । खेतबारीमा सोझै बीउ रोपेर वा छुट्टै नर्सरीमा वेर्ना तयार गरे पछि मुख्य खेतमा वेर्ना सारेर । सोझै खेतमा रोपिने वा छर्ने तरीकाहरूमा चमसुर, पालुश्रो, बोडी, सिमि, मुला, सलगम, केराउ इत्यादि प्रमुख हुन् । ब्याडमा वेर्ना तयार गरी स्थायी स्थानमा सार्ने पर्ने तरकारीहरूमा काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, ग्याठ, रायो, स्वीसचाई, जिरीको साग, प्याज, कुरिलो, गोलभेंडा, भन्टा, भेडेखुसानी, पिरौखुसानी आदि । विशेष स्थानमा शिष तरिका अनुसार काँक्रो, फर्सी, घेरौला आदिको पनि वेर्ना तयार गरेर खेती गर्न सकिन्छ ।

ब्याडमा वेर्ना उमार्दा हुने फाइदाहरू:

- बीउको बचावदः तरकारी बीउहरू साना र मसिना हुन्छन् । साथै तरकारी बीउ ज्यादै महँगो पनि हुन्छन् । दुर्लभ र महँगो तरकारीको बीउ सोझै खेतमा रोप्दा बीउ धेरै खर्च हुन्छ । ब्याडमा वेर्ना उमार्दा बीउको बचावद हुन्छ
- बीउको उमार राम्रो हुन्छ: साना दाना भएका तरकारीको बीउ सोझै खेतमा रोप्नु भन्दा सानो प्लटमा रोप्दा बीउको उमार राम्रो हुन्छ र राम्रो बिरुवा उत्पादन हुन्छ । सोझै खेतमा रोप्दा ज्यादा पुरिएर वा आवश्यकता अवस्था नभिलेर नउम्रन सक्छ ।
- हेरचाह र सुरक्षा गर्न सजिलो हुन्छ: सानो ब्याडमा बीउ उमार्दा बढी हेरचाह र सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने हुँदा बिरुवा स्वस्थ र निरोगी हुनको साथै छिटो बढ्छन् । पुरै खेतमा यस्तो हेरचाह पुर्‍याउन सकिदैन ।
- प्रतिकूल मौसममा पनि वेर्नाको तयारी: खेतमा उपयुक्त वातावरण तयार नभए सम्म सानो ब्याडमा वेर्ना हुर्काउन सकिन्छ । यसरी ब्याडमा वेर्ना तयार गानले विभिन्न फाइदा लिन सकिन्छ । जस्तै बाली चाँडै लिन सकिन्छ, मुख्य खेतको तयारी राम्रो सँगै गर्न सकिन्छ ।

नर्सरी जग्गाको छनौट तथा तयारी: तरकारीका बीउहरू साना र मसिना हुन्छन् । प्रतिकूल हावापानीको प्रभावबाट यस्ता साना बीउबाट सोझै बाली उत्पादन गर्दा बीउ नउम्रन सक्छ । चिसो तापक्रममा बीउ उम्रन र वेर्ना

बढ्न समेत लामो समय लाग्दछ । बढी घामको प्रभावले वेर्ना ओइलाउँछ वेर्ना हुर्कन तापक्रम, आर्द्रता र प्रकाशले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ ब्याडको छनौट गर्दा प्रशस्त प्राज्ञारिक पदार्थ भएको माटो, सिँचाईको व्यवस्था भएको ठाउँ, साथै प्रकाश र तापक्रम अनुकूल भएको वा पार्न सकिने ठाउँ छनौट गर्नु पर्दछ । राम्रो सँग स्वस्थ वेर्ना उमार्नको लागि खुकुलो, प्रशस्त प्राज्ञारिक पदार्थ भएको, दोमट माटो चाहिन्छ । यस कारण अलि अलि बालुवा मिसाएको छिट्टै पानी सोसेर लिन सक्ने र छिटो थिग्रेर जान सक्ने ठाउँ छान्नु राम्रो हुन्छ । ब्याडको माटोमा सबै प्रकारको पोषक तत्व हुनु अनिवार्य छ चाहे बमोजिमको भौतिक गुण नभएको माटोमा बालुवा र प्राज्ञारिक मल मिसाई माटो खुकुलो पार्नु पर्दछ ।

ब्याडको तयारी: ब्याडको लागि छानिएको जग्गाको माटो राम्रो सँग खनजोत गरी ढुङ्गा, झ्यास हटाई डल्ला फोरेर ब्याडको तयारी शुरु गर्नु पर्दछ ब्याड बनाउँदा आफ्नो सुविधा र आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्दछ वर्षाको मौसममा ब्याडको चौडाई १ मिटर र ब्याड १५ से.मी. उठेको ढ्याड हुनु पर्छ । ब्याडको लम्बाई आफ्नो आवश्यकता अनुरूप ५ मिटर वा घटबढ गर्न सकिन्छ । दुई ब्याडको बीचमा ५० देखि ६० से.मी. चौडा खुलेसो हुनु पर्दछ । सबै ब्याडमा सिँचाई र निकसको सुविधा पुग्ने गरी कुलेसोको निर्माण हुनु पर्दछ । ब्याडको माटो १/२ पटक हलुको सँग खनी खस्रो पदार्थ, डल्ला डल्ली, र झारपातहरू बसै हटाइ दिनु पर्दछ । प्रति वर्ग मिटरमा २५४ के.जी. पाकेको गोबर मलमिलाउनु पर्दछ । रासायनिक मलको प्रयोगको हकमा १ वर्ग मिटरमा ५ ग्राम युरिया, ५ ग्राम डि.ए.पी., ५ ग्राम पोटास ब्याडमा राम्ररी छरेर मिलाई दिनु पर्दछ । गर्मी र सुख्खा मौसममा भने ब्याड बनाउँदा चारैतिर डिल उठेको क्यारी बनाउनु पर्दछ । लम्बाई र चौडाई वर्षे ब्याडको जस्तै हो । केवल कुलेसोको ठाउँमा डिल बनाउनु पर्दछ ।

बीउ रोप्ने तरीका: राम्रो वेर्ना उत्पादनको लागि गुणस्तर युक्त बीउको आवश्यकता पर्दछ । बीउ रोप्नु अघि बीउ उपचार गर्नु लाभदायक हुन्छ । दुई ग्राम डाइशेन एम ४५ अथवा बेभेस्टीनले एक के.जी. तरकारीको बीउको उपचार गर्नु पर्दछ । बीउ छर्नु अघि बीउको उम्रने शक्ति परिक्षण गरेको हुनु पर्दछ । घरमा पनि सरल तरीकाबाट उम्रने शक्तिको जाँच गर्न सकिन्छ । बसको लागि सानो प्लेट वा भडोमा पानीमा भिजाएको अखबार कागज राखी यसैमा १०० दाना बीउ चारै तिर फिँजाएर उत्सै आकार र अनुपातको अर्को चार दिनमा भिजाएको अखबार कागजले छोपेर चार दिन र अर्को चार दिनमा बीउहरूको गन्ती गरी उमार प्रतिशत थाहा पाउन सकिन्छ ।

बीउ छर्ना सानो छेस्कले वा चुच्चे कुटोले १०-१५ से.मी.को फरकमा २-३ से.मी. गहिरो धर्मा बनाई हरेक धर्माको एक नास संग बीउ पर्ने गरी मुठीमा लिएको बीउ बुढी औला, चोर औला र माझी औलाको सहायताले धर्माको खसाल्दै जानु पर्दछ । अक्सर गरी बीउ पातलो पारी खसाल्न बीउमा ४-५ भाग सुख्खा माटो वा धुलो मल मिसाएर छर्नु राम्रो हुन्छ । धर्माको बीउ छरीसके पछि बालुवा, फुको माटो वा खरानी वा धुलो मलले माथिबाट छोपिदिनु पर्दछ । अति हातले हलुका संग थिचिसके पछि पुरै ब्याड पराल वा सुकेको घाँसेले छोपी दिई ब्याड राम्रो भिज्ने गरी फोहोरा र हजारिले एकनास संग पानी दिनु पर्दछ ।

बेर्नाको हेरचाह: बीउबाट अंकुर आउना साथ पराल वा सुकेको घाँस विस्तारै धिक्की दिनु पर्दछ । बीउबाट टुसा नआउन्जेल र उमे पछि पनि निरन्तर ब्याड चिसो चिसो राख्नु पर्दछ । बेर्ना चारपाते भएपछि आवश्यक देखियो भने एक प्रतिशत युरियाको झोलले ब्याडको सिँचाई गर्नले विरवा चाँडै हुर्कन्छ । बाली अनुसार एक दुई महिना पछि बेर्ना खेतमा सार्न लायक हुन्छ । यस अवधिमा झारपात नियन्त्रण गरी विरवालाई ठण्डा र घाम पानीबाट बेर्नाको बचाव गर्नु पर्छ । ब्याडमा झारपात देखिने बित्तिकै उखेली दिने, माटो खुकुलो पार्ने र १/२ पटक कुटो, खुपी वा चुच्चे कुटोले गोडाई गर्नु पर्दछ । बेर्ना ज्यादै बाक्लो भएमा पातलो पार्ने, बेडाउने गर्नु पर्दछ । ठण्डा र घामपानीबाट बेर्नाको बचाव गर्न ब्याडमा छहारी वा छाप्रो दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पारदर्शन पोलिथिनले सुरक्षित आकारमा नर्सरी ब्याड ठाँक दिनले तुषारो र वर्षातको पानीबाट बचाउन सकिन्छ । तर यस्तो पोलिथिनको ढक्कन दिउँसो कडा घाममा धिक्किदिनु पर्दछ । धेरै कडा घाममा बेर्ना बचाउन स्याउला, पराल वा खरको अस्थार्ड छोप्ने बनाउनु पर्दछ ।

रोग किरा: बेर्ना बढ्ने अवस्थामा विभिन्न रोग तथा किराहरूले आक्रमण गर्दछन् । बेर्नामा रोग ३/४ किसिमको जिवाणुबाट लाग्दछ । यी जिवाणुहरू माटो, बीउ तथा बीउको विभिन्न भागबाट फैलिन्छ । यो रोग बेर्नाको विभिन्न अवस्थामा लाग्दछ । उम्नै नपाई बीउ माटोमा कुहिने, अंकुर फुटी माटो बाहिर ननिस्कदै कुहिने, उमे पछि बेर्नाको फेद कुहिएर मर्ने, डाँठमा तारले बन्धे जस्तो घेरा बसी मर्ने लक्षणहरू कुहिने रोगमा देखा पर्दछ । यस रोगको रोकथाम गर्न ब्याडमा माटोको उपचार, बीउ उपचार, ब्याडको सरसफाई तथा असल बीउको प्रयोग गर्नु पर्दछ । ब्याडमा बढी चिसो पना र पानीको निकासको अभावमा कुहिने रोगले उपयुक्त वातावरण पाउँछ । बेर्ना

उमे पछि कुहिने रोगको आक्रमण भएमा डाइथेन एम-४५ दुई ग्राम/लिट पानीमा राखी एक रोपनीमा १६ लिटरको दरले छर्कुनु पर्दछ ।

ब्याडमा बराबर किराहरूको पनि आक्रमण भइरहन्छ । त्यसमा बेर्नाको पा प्वाल पार्ने र रस चुत्ने किरा प्रमुख छन् । यी किरा लागेमा १६ लिट पानीमा ३० - ३२ मिलिलिटर योनागनोरोक्स, डेमोफोन मिसाई एक रोपनीको ब्याड भिज्ने गरी छर्कुनु पर्दछ । पातखाले किराको लागि प्वाइमरमेथ्रिज डेट्रामेथ्रिन, बायोडान छर्नु सकिन्छ । यी बाहेक वकैना, निम र अनस्थितिक विरवाको दाना वा पातको झोल बनाई छर्कुनाले पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बेर्ना जरखन्याउने तथा बेर्ना तयारी: धेरै जसो तरकारी बेर्नाहरू रोपेको ४-६ हप्तामा सार्न लायक हुन्छन् । यसरी बेर्ना तयार भए पछि बेर्ना ब्याडबाट उखेल्नु अगाडि ब्याड भिज्ने गरी पानी दिनु पर्दछ । बेर्ना उखेल्दा धेरै ज नखलबलिन गरी कुटो वा खुपीले माटोसित उखेली सार्न पर्दछ । साधारणतया काउली बाली समुहका तरकारी बाहेक अन्य तरकारी बेर्नाहरू यसरी सहस्र सार्न सकिन्छ । काउली समुहका तरकारीहरू (काउली, बन्दा, ब्रोकाउलर, रायठ, ब्रसेल्स स्याउट) कलिलो अवस्थामा खेतबारीमा सार्दा बेर्ना धेरै नोक्सा हुने हुँदा पहिलो पटक राम्ररी तयार गरेको ब्याडमा पातलो गरी सारेर, २-२ साता राम्ररी हेरचाह गरी बेर्ना ठुलो र दह्रो बनाइन्छ । यस तरीकालाई बेर्ना जरखन्याउने वा जरखन्याउने भनिन्छ । यस्तो बेर्ना जरखन्याउदा १०-२० से.मी.को फरकमा लगाउनु पर्दछ । यसरी सारेको बेर्ना २०-२५ दिनमा स्थायी स्थानम सार्न लायक हुन्छ ।

फलफुल तथा नर्सरीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा तिनको व्यवस्थापन प्रविधि: बेर्ना कुहिने (Damping off): यो Rhizoctonia spp तथा Pythium spp दुवैको तरकारी बालीको बेर्ना माटोको सतह निर पानीले भिजेको जस्तो हुन्छ । बेर्ना बल्ले मर्दछ । बेर्ना उम्रिन अघि पनि मर्न सक्छ ।

रोग लाग्ने बाली: काउली, बन्दा, रायो, गाजर, सलगम, भन्टा इत्यादि

उपचार:

- Ktiloxyl २ ग्राम/लिट पानीमा मिसाई से गर्ने ।
- वैथिस्टीन २ ग्राम/के.जी. बीउमा राखी बीउ उपचार गर्ने ।
- ४ देखि ६ ग्राम प्रति वर्ग मिटरमा माटो उपचार गर्ने ।

Root Rot (जरा कुहिन रोग): यो Pellicularia Filamentosa हुसीले पात डाठको रङ्ग रातो खैरोमा परिवर्तन हुन्छ । विरवा मर्दछ वा सानो कालो हुसीको गोडाहरू काण्ड तिर बाहिर, भित्र र जराको भित्रिमा आक्रमण गरेमा विरवा ओझाउने र पहेलिएर सुख्ने अवस्था मर्दछ । माथि लेखिए बमोजिम उपचार गर्ने ।

रकलेरोटिनिया रोग: यो हुसीले जमिनको सतह नजिकै मुख्य काण्डमा आक्रमण गर्दछ र विरवा एककासी मर्न थाल्दछ । आक्रमण भएको ठाउँमा कुहेर सेतो हुसीको साथै हुसीको कालो गोडा देखिन्छ । उपचारको सम्बन्धमा बेविष्टीन/लिटर् पानीमा मिसाई स्प्रे गर्ने ।

पाउडरी मिल्डु: यो विरवाको पातको तल्लो सतहमा सेतो धुलो जस्तो देखिन्छ । सेतो हुसीले पिठो छरे झैँ पुरै बोटलाई ढाक्छ । पातहरू चाँडै मर्दछन् र बीउ उत्पादन कम हुन्छ । रोकथामको सम्बन्धमा २ मि.लि. काराथेन १ लि. पानीमा मिसाई छर्ने ।

थोप्ने रोग: २ मि.ग्र. Kriox 1 एक लि. पानीमा मिसाई छर्ने ।

जरा कालो हुने हुसी: २ मि.ग्र. Kibestin एक लि. पानीमा मिसाई छर्ने ।

कालो सडन ब्याक्टेरिया: Kisan-M-45 and Plantomycin मिसाएर स्प्रे गर्ने ।

उपचार:

- घुस्ती वाली लगाउने ।
- आश्रय स्थानको झारपात निकाल्ने ।
- समय छल्ने ।
- नाइट्रोजन सन्तुलित मात्रामा मात्र दिने ।
- गहिरो जोताई गर्ने ।
- सफा बीउ र बेर्ना तथा कलमीको प्रयोग गर्ने ।
- अवरोधक जात लगाउने ।

सकेसम्म कलमी विरवा प्रयोग गरौं । चाँडै फल्नुका साथै यसका विभिन्न अन्य फाइदाहरू छन् ।

१००. बेमौसमी तरकारीको महत्त्व र उत्पादन प्रविधि

बेमौसमी तरकारी खेती गर्नलाई मौसम प्रतिकुल भएको अवस्थामा विरवा तयार गर्न विशेष किसिमको ज्ञान, प्रविधि, सीप र जर्गरको आवश्यकता पर्दछ । प्रतिकुल मौसम भन्नाले ज्यादा गर्मी र ओसिलो मौसम, ज्यादा पानी पर्ने मौसम, ज्यादा चिसो र तुषारो पर्ने मौसम र उमार्न खोजिएको विरवालाई नभिल्टो वातावरण भएको मौसम भन्ने बुझिन्छ । सामान्य तरकारी खेती भन्दा बेमौसमी तरकारी खेतीको विशेषता निम्न अनुसार छन्:

- सामान्य समयमा भन्दा फरक समयमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुने भएकोले,
- बेर्ना तथा तरकारी उत्पादनबाट सेवा पुर्‍याउने र बढी फाइदा लिन सकिने भएकोले,
- उत्पादन समयलाई लम्ब्याएर बेमौसमी बजारको फाइदा लिन सकिने भएकोले,
- बाँदै महिना तरकारी उत्पादन गर्न सकिने भएकोले,
- रोजगारीको अवसर सृजना हुने भएकोले,
- नगद आर्जनको साथै तरकारी आयातमा कमी ल्याई स्वदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट बचाउने भएकोले,
- विभिन्न बजारको माग आपूर्ति हुने भएकोले ।

बेमौसमी तरकारी खेती गर्नको लागि विभिन्न अवस्थाहरूको विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा आशातित लाभ हुन सक्दैन । हाल नेपालमा विकसित भएका बेमौसमी तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा धुनिवेशी (धादिङ्ग), दामन (मकवानपुर), पाचखाल (काभ्रे), त्रिशुली, रानी पौवा (नुवाकोट) आदिलाई लिन सकिन्छ । हिजो आज तरकारीको माग बढ्दै गैरहेकोले पनि तरकारीको खेती विस्तारमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

बेमौसमी तरकारी खेतीका तरीकाहरू: परम्परागत खेती तरीकामा अनुकूल मौसममा खेती गर्ने र कृषकको ध्यान बढी उत्पादन गर्नुमा रहन्छ । बेमौसमी तरकारी खेतीमा कृषकको ध्यान तरकारी उत्पादन गर्न आवश्यकत वातावरण पुर्‍याउन र वाली चाँडो परिचालन गरी अधिकतम फाइदा लिनेमा केन्द्रित रहन्छ । प्रतिकुल मौसम रहेको अवस्थामा तरकारी खेती वा बेर्ना उत्पादनको लागि वातावरण अनुकूल पार्न प्रयास गरिन्छ । यस बाहेक निम्न बमोजिमको विधि अपनाएर पनि बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

१) भौगोलिक उपयोग: भौगोलिक विविधताको कारण पहाड, उपत्यका, तराई, फाँट, बेसी आदि क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका हावापानी पाइन्छ । विविध हावापानी भएका विशेष उत्पादन क्षेत्रहरू नजिकका शहरका लागि बेमौसमी तरकारी उत्पादन क्षेत्र हुन सक्छन् । जस्तै: धादिङ्ग, नुवाकोट, काभ्रे आदि जिल्लाको केही गा.वि.स.हरू काठमाडौँ उपत्यकाको लागि बेमौसमी तरकारी उत्पादन क्षेत्र हुन् । त्यस्तै कतिपय पहाडी जिल्लाहरू तराईका शहरहरूका लागि बेमौसमी तरकारी उत्पादन क्षेत्र हुन सक्छन् । जस्तै: विराटनगर र झापाको लागि धनकुटा, इलाम, धनगढीको लागि डडेल्धुरा आदि । हावापानीको उपयोगले तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा भने मौसमी उत्पादन र उपभोग गर्ने ठाउँमा भने बेमौसमी हुन गर्दै कृषकहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ । समयको फरक पारी खुल्ला वातावरणमै केही तरकारीहरू बेमौसममा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी रोप्ने समयमा १०/१५ दिन फरक पारेमा तरकारी उत्पादन अबधि लम्ब्याउन सकिन्छ । फलस्वरूप अगाडि वा पछाडिका तरकारी बालीहरू मौसमीको रूपमा उत्पादन हुन सक्छ र बढी मुल्य पाइन्छ ।

२) जातिय विविधता: हरेक तरकारी बालीको अगौटे, मध्यम र पछ्यौटे जातको विकास गरिएको हुन्छ । यसरी विभिन्न जातका छनौटबाट तरकारीहरू बेमौसममा पनि उब्जाउन सकिन्छ । जस्तै: काउलीको अगौटे-अलि स्तोवल, पुसा दिपावली, मध्यम-काठमाडौँ स्थानिय, पछ्यौटे -स्तोवल-१६, किबो-जायन्ट आदि ।

३) अनुकुल वातावरणको सृजना: विहवालाई आवश्यक हावापानीको अनुकुल वातावरण पुर्‍याउन सके चाहिएको समयमा माग बमोजिमको ताजा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी बाह्य वातावरणलाई पुर्ण वा आंशिक रूपमा नियन्त्रण गरी तरकारी बाली सुहाउँदो पार्न सकिन्छ।

बेमौसमी तरकारीको बेर्ना उत्पादन प्रविधि:

- प्लाष्टिक टनेलद्वारा
- ट्रे/प्लाष्टिक शैलीद्वारा
- हटवेडद्वारा

प्लाष्टिक टनेल: बाँसको भाटा र प्लाष्टिकको सहयोगले बनाइएको सुरङ्गलाई प्लाष्टिक टनेल भनिन्छ । यसमा पनि नर्सरीमा जस्तै जमीनको तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । नर्सरी तयारी गर्दा ४-५ किलो ग्राम गोबर मल, ५/५ ग्राम युरिया, डि.ए.पी. र पोटास प्रति वर्ग मिटर मल राख्नु पर्ने हुन्छ । टनेल

बनाउन सजिलो छ । १ मिटर चौडा, १० मिटर लामो प्लाष्टिक टनेल बनाउन २/२ मिटर लामो एक नासको निगालो वा बाँसको भाटा, ०. मिटरको २ वटा काठको किला १.७५ मिटर चौडा प्लाष्टिक १२ मिटर आवश्यक पर्दछ । प्लाष्टिक टनेल बनाउन सब भन्दा पहिले १ मिटर चौडा १० मिटर लामो, १५ से.मि. उठेको वा चारैतिर डील भएको क्यारी ब्या तयार गरेर त्यसमा बीउ रोपिसके पछि १/१ मिटरको फरकमा भाटालाई अ चन्द्राकार रूपमा गाडेर त्यसमा प्लाष्टिकले छोपी २ तर्फको छेउमा किल ठोकी डोरीले बाँधिदिनु पर्दछ ।

प्लाष्टिक टनेलबाट हुने फाइदा:

- जाडोमा ब्याडको तापक्रम बढाउन, तुषारोबाट बचाउन र वर्षातमा पानीबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ ।
- गर्मी बढी भएमा ढुबै साइडबाट प्लाष्टिक खोलेर हावा संचार गराउन सकिन्छ ।
- जाडोको मौसममा चारै तिरबाट बन्द गरी प्लाष्टिक छटलाई न्याने पान सकिन्छ र ब्याडको तापक्रम बढ्छ ।
- विहवाको हेरचाह गर्न, गोडमेल गर्न सजिलो हुन्छ ।
- विभिन्न तरकारीको बीउलाई उम्रनको भित्रित आवश्यक पर्ने तापक्रमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गरी ट्रे वा प्लाष्टिकको शैलीमा पनि बेमौसमी बेर्नाहरू तयार गर्न सकिन्छ । शैला वा ट्रेमा माटो भर्दा तलका अनुपातमा मिश्रण बनाई भर्नु पर्छ:

- इमट माटो २ भाग
- पाकेको गोबर मल २ भाग
- बालुवा १ भाग
- खरानी १ भाग

उपरोक्त अनुपातमा सामग्रीहरू एक आपसमा राम्ररी मिसाई त्यस मिश्रणमा केहि मात्रामा बकैनाको गोडा वा पातको धुलो वा निमको गोडाको धुलो वा प्रति १० किलो ग्राम मिश्रणमा ५-१० ग्राम, ५ को किरा मार्ने हलुका सुरक्षित बिषादी मिसाउनु पर्दछ । त्यस पछि शैली वा ट्रे भरी बीउ रोप्नु पर्दछ । राम्ररी तयार भएको विहवालाई मुख्य खेतमा मौसमी तरकारी जस्तै बेती गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१०१. विभिन्न बालीको बीउको प्रकार, लेवल र वर्णशंकर बीउ

बीउको उत्पादन प्रक्रिया लामो र कठोर प्रक्रिया पुरा गरे पश्चात मात्र हुन सक्दछ । कठोर परिश्रमबाट विकास गरिएका बीउहरू कृषकका लागि खेती गर्ने सिफारिस गरिन्छ र प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने बीउहरूको संरक्षण देशको बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रमले वा नीजि बीउ कम्पनीहरूले गर्दछन् ।

बीउ उत्पादनका खुड्किलाहरू:

- प्रजनन विज्ञको सामाग्री,
- प्रजनन वा न्युक्लियस बीउ,
- मूल बीउ,
- प्रमाणित बीउ १,
- प्रमाणित बीउ २ र
- उन्नत बीउ ।

१) प्रजनन विज्ञको सामाग्री: उत्पादन गर्ने, प्रजनन/अनुसन्धान कर्ता (विज्ञ) लाई आवश्यक पर्ने बीउ तथा अन्य सामाग्री भन्ने बुझिन्छ ।

२) प्रजनन/बीडर/न्युक्लियस बीउ: अनुसन्धान कर्ताको सक्रिय संलग्नतामा कृषि केन्द्र/अनुसन्धान फार्महरूमा प्रजनन बीउ उत्पादन गरिन्छ । बीउको परिमाण ज्यादै सिमित हुन्छ (बजारमा बिक्रीका लागि राखिदैन) र यो बीउ मूल बीउ उत्पादनका लागि श्रोतको रूपमा लिइन्छ ।

३) मूल बीउ: प्रजनन बीउको दोश्रो रूप मूल बीउ हो यो पनि विशेषज्ञको रेखदेखमा उत्पादन गरिन्छ । यसमा निश्चित आनुवंशिक शुद्धता र गुणहरू कायम राखिन्छ । यो बीउलाई सरकारी फार्ममा वा मान्यता प्राप्त संस्थाहरूमा उत्पादन गरिन्छ । यो बीउ प्रमाणित बीउ उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

४) प्रमाणित प्रथम: यो मूल बीउबाट उत्पादन गराइन्छ । यसमा बीउको जातिय शुद्धता, गुणस्तर कायम गरिन्छ । प्रमाणिकरण निकायबाट निरीक्षण, नियन्त्रण तथा अनुगमन नियमित रूपमा गरी प्रमाणित गरिन्छ । यो बीउ सरकारी, फार्म, केन्द्र, व्यक्ति, संघ संस्थाद्वारा उत्पादन गरिन्छ ।

५) प्रमाणित दोश्रो: प्रथम पुस्ताको श्रोतबाट आवश्यकिय गुणहरू कायम राखी उत्पादन गरिन्छ । गुणहरू कायम राख्न नियमित रूपमा उत्पादन क्षेत्र, भण्डारण क्षेत्र निरीक्षण, नियन्त्रण र सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ ।

६) उन्नत बीउ: प्रमाणित प्रथम र दोश्रोबाट प्राविधिज्ञहरूको रेखदेखमा उत्पादित बीउमा न्यूनतम स्तर पुरा गरेको हुनु पर्दछ । प्रमाणित बीउ प्रशस्त नभएको अवस्थामा यो बीउलाई कृषक स्तरमा परिचालन गरिन्छ र यसबाट खान्दान उत्पादन गर्न लगाइन्छ । बीउ प्रमाणिकरणका लागि निश्चित मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ । जस्तै: शुद्ध बीउ ९९ प्रतिशत, निस्कृय पदार्थ २ प्रतिशत, अरु बालीको बीउ ०.२ प्रतिशत, उम्रने शक्ति ८० देखि ८५ प्रतिशत, चिस्यान १२ देखि १३ प्रतिशत ।

उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू:

- ठीक समयमा बाली लगाउने र ठीक समयमा काट्ने ।
- सही तरीकाबाट बाली लगाउने ।
- माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुनु पर्ने ।
- मलखाद, सिचाई, रोग तथा किटा नियन्त्रण ।
- पुष्पकता हुरी, बेजातको बीउ हटाउने र झारपात नियन्त्रण ।

बाली वेडाउंदा (R oguing) गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू: फरक बालीको बोट, फरक जातको बोट, झारपातको बोट, बोटको उचाई(धेरै अग्लो र होचो), पाक्ने समय (छिटो र ढीलो), रोग र किटाले क्षति पुर्‍याएको बोट, पात, फल, डाँठ र बालाका किसिमका आधारमा । जब बीउ उत्पादन हुन्छ तब बीउमा विविध परीक्षण आवश्यक हुन्छन् । जस्तै: नमुना परीक्षण, भौतिक शुद्धता परीक्षण, उमार शक्ति परीक्षण, रोगी, निरोगी पहिचान ।

बीउ उत्पादन:

- विविध खाले निरीक्षण: गुणस्तर नियन्त्रण,
- बीउ चुटाई: सुकाइ, पकाई,
- सबै खाले परीक्षण: प्रमाणिकरण, नामाङ्कन, लेबलिङ,
- मूल्य निर्धारण,
- भण्डारण,
- डुबानी,
- खरिद बिक्री आदि ।

बीउको उत्पादन पश्चात कुन खालको बीउ उत्पादन भएको हो सो को पहिचानका लागि पहिचान पत्र लेबलिङ काई प्रत्येक बीउका पोका (थैला, बोरा)मा राख्ने गर्नु पर्दछ ।

वर्णशंकरः दुई भिन्न स्वभावको सजातिय बालीहरूका बीच संसर्ग गराई उत्पादन गराउने प्रक्रियालाई वर्णशंकर भनिन्छ । जस्तै:

- बाहिरी स्वाभावका आधारमा ।
- स्थानिय वातावरण सहन् गर्ने आधारमा ।
- धेरै उत्पादन दिने आधारमा ।
- फलको आकार ठुलो हुने(उत्पादन) दिन आधारमा ।
- मिठा र राम्रा आकारका फल दिने ।
- सजातिय गुण भएका आदि ।

विशेषतः धेरै उत्पादन दिने, राम्रा दाना दिने, मिठा । सजातिय गुण कायम भएका जातलाई स्थानिय हावापानी सहने का बीचमा क्रसिङ । हतौद्वारा, किराहरूद्वारा, हावाद्वारा गराइन्छ । यी सारा सम्पूर्ण काम विज्ञहरूबाट मात्र हुन सक्ने भएकाले सबै काम, जात र प्रक्रिया सावधानी र गोप्य तरीकाबाट गरिन्छ ।

अनुसन्धानबाट सिफारीस भएका उन्नत बालीहरूको खेती गरौं ।

१०२. विरवाका खाद्य तत्वहरू

बाली उत्पादनमा असर पार्ने तत्वहरूमा माटो, मल, सिंचाई, विरवा, उत्पादन प्रविधि र बाली संरक्षणका पक्षहरू पर्दछन् । राम्रो बाली उत्पादनको लागि यी आवश्यक पर्ने खाद्य तत्वहरूको उचित व्यवस्थापन पनि एक हो । स्वस्थ बाली बढी उत्पादन लिन विरवालाई विभिन्न मुख्य तथा सहायक खाद्य तत्व गरी जम्मा १६ शरीका खाद्य तत्वको आवश्यक पर्दछ । तिनीहरूमा कार्बन (C), अक्सीजन (O), हाइड्रोजन (H), नाइट्रोजन (N), फस्फोरस (P), पोटास (K), क्याल्सीयम (Ca), म्याग्नेसियम (Mg), जिंक (Zn), आइरन (Fe), म्याङ्गानिज (Mn), मोलिब्डेनम (Mo), बोरोन (B), कपर (Cu), क्लोरीन (Cl), सल्फर (S) छन् । यस मध्ये C, O र H विरवाले हावा, पानीबाट प्राप्त गर्दछ।

विरवालाई अत्यावश्यक मुख्य तत्वहरू: नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास विरवाको लागि अत्यावश्यक खाद्य तत्व हो भने सहायक तत्वहरूमा जिंक, म्याग्नेसियम, आइरन, म्याङ्गानिज, मोलिब्डेनम, बोरोन सहायक खाद्य तत्वहरू हुन् । हाम्रो देशमा विभिन्न क्षेत्रको माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको अलावा जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम जस्ता तत्वको कमीको लक्षण देखा परेको पाइएको छ । धान बालीमा जिंक तत्वको कमी देशव्यापी रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ भने बोरोन तत्वको कमी तरकारी बालीमा प्रायः सबै ठाउँमा देखा पर्दछ । त्यसै गरी तेलबाली लगाइने ठाउँमा गन्धक युक्त मलको उपयोगले उत्पादन बढेको देखिन्छ । यी तत्वहरू प्रायः दुई प्रकारका मलबाट प्राप्त हुन्छन्।

प्राङ्गारिक मल:

- गोठे मल,
- जैविक मल,
- कम्पोस्ट मल, कादोबालीको प्रयोग,
- हरियो मल
- वायोग्यास ।

रासायनिक मल

नाइट्रोजन युक्त मल: माटोमा नाइट्रोजन युक्त तत्वको कमीलाई सुधार गर्न नाइट्रोजन युक्त मल प्रयोग गर्नु पर्दछ । विरवाले नाइट्रोजन एमोनियम (NH₄)

र नाइट्रेट (NO_3) को रूपमा लिन्छ । यो मल जमिनको अन्तिम तयारीको बेलामा सिफारिस मात्राको आधा भाग र बाँकी भागलाई दुई खण्ड गरी एक भाग २५-३० दिन पिछ्छि र अर्को भाग बाला पोटाउने बेलामा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

फस्फोरस युक्त मल: माटोमा फस्फोरस तत्वको कमि भएमा फस्फोरस युक्त मल प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो मुख्य खाद्य तत्व भएकोले यसको मात्रा अधिक चाहिन्छ । यसलाई जमिनको अन्तिम तयारीमा प्रयोग गर्नु पर्छ । केही फस्फोरस युक्त मलहरूमा Single Super Phosphate (SSP), डबल सुपर फस्फेट (DSP), Triple Super Phosphate (TSP) र एमोनियम सल्फेट तथा डाइ एमोनियम फस्फेट (DAP) हुन् ।

पोटास युक्त मल: पोटासियम क्लोराइड, फोटासियम सल्फेट र पोटासियम नाइट्रेटको रूपमा पाइन्छ । पोटासियम क्लोराइडमा ४४ प्रतिशत पोटास र १३ प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ ।

मिश्रित तथा यौगीक मलहरू: मिश्रित तथा यौगीक मलहरूमा एक भन्दा बढी मुख्य खाद्य तत्वहरू एउटै मलमा पाइन्छ । एउटा मात्र खाद्य तत्व प्राप्त हुने मललाई सरल मल भनिन्छ । जस्तै: युरिया, म्युटेड अफ पोटास आदि । तर यौगीक मलमा एक भन्दा बढी खाद्य तत्व पाइन्छ । जस्तै: डाइ एमोनियम फस्फेट । यसमा १८ प्रतिशत नाइट्रोजन र ४६ प्रतिशत फस्फोरस पाइन्छ ।

सहायक खाद्य तत्व युक्त मलहरू: क्याल्सीयम, म्याग्नेसियम र सल्फरलाई ती सहायक खाद्य तत्वको रूपमा लिइन्छ । यो मुख्य श्रोतको रूपमा क्याल्सीयम नाइट्रेट, क्याल्सीयम एमोनियम नाइट्रेट, चुनढुङ्गा, जिप्सम आदि पर्दछन् । तर म्याग्नेसियम हाल सम्म नेपालमा सिफारिस गरिएको छैन ।

सुक्ष्म तत्व युक्त मल: यी मलहरू विरवालाई अति कम भए पनि पुग्दछ । तर विरवाको जीवन चक्र यिनको आवश्यकता पर्दछ । हामी कहाँ बोरोन, मोलिब्डेनम र जिंक तत्वको कमिको कारणले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको देखिएको छ । हरेक विरवाको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सुक्ष्म तत्वहरूको तह बेग्ला बेग्लै हुन्छ । कुनै विरवालाई एउटा तत्व बढी चाहिन्छ भने अर्को विरवालाई त्यही तत्व कम भए पुग्छ । सुक्ष्म तत्व युक्त मलहरू माटोमा प्रयोग गर्ने र पातमा हुर्कने गरी दुई विधिबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । मलको

प्रयोग गर्दा धान्य तत्वको जानकारी लिएर

विभिन्न खाद्य तत्वको काम तथा क्रम

१) Nitrogen (N) को काम:

- बोट विरवाको वृद्धि छिटो र मज्जाले
- पराग, डाँठ तथा उत्पादन बढी
- नाइट्रोजन पातको हरियोपना बढ्छ
- उत्पादनमा वृद्धि गराउँछ । पातको
- फलमा प्रोटीनको मात्रा बढाउँछ ।
- दाना राम्रो, पुष्ट र उत्पादनमा बृद्धि

कमिको लक्षण:

- विरवा पुइको र होचो भई धानमा
- पातहरू भसिनो, छोटो, ठाडो परेर
- पहिले पहेलिनै चैरो भई मर्दछन् ।

२) Phosphorus (P) को काम:

- विरवाको जरा र डाँठ बढ्न र
- छिटो बढ्ने र डाँठलाई कडा बना
- विरवामा छिटो फुल फुल्न र फल
- विरवामा छिटो फल फल्न र धान
- फल राम्रो नचाउरीएको लाग्छ
- बढाउँछ ।
- माटोबाट नाइट्रोजन लिन विरवाला

कमिको लक्षण:

- फस्फोरस कमि भएमा बोट बढ्न
- विरवा राम्रो सित हुन सक्दैन ।
- पातहरू साना, मसिना, ठाडो परेर
- मर्छ ।
- पातहरू चैरो तथा Purple हुन्छ ।
- विरवाले नाइट्रोजन राम्रो सित ।
- फलको उत्पादन कम हुन्छ ।

३) पोटासियम (K_2O) को काम:

- विरवालाई मज्जाले र योग सित

- विरवाले प्रोटीन उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
- बोट विरवालाई छिटो बढाउने र छिटो फल लागी बढी उत्पादन गराउँछ ।
- विरवाको गांज बढाउँछ, फलको आकारमा वृद्धि ल्याउँछ र फलको गुणस्तर बढाई उत्पादन दिन्छ ।
- धानको दानामा एपिण्ड को विकास छिटो गराउँछ ।
- विरवाको जरा र बोटको वृद्धि गर्नमा ऋबतबधिकत को काम गर्छ ।
- विरवामा हुने विभिन्न Physiological Process जस्तै: Starch, Sugar, Oils बन्ने प्रक्यामा मद्दत पुर्‍याउँछ । साथै यसलाई एक भागबाट अर्को भागमा पुर्‍याउन पनि मद्दत गर्दछ ।
- यसले नाइट्रोजन र फस्फोरस विरवाले छिटो र सजिलो संग लिन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

कमिको लक्षण:

- माटोमा पोटासको कमि भएमा विरवा बढ्न सक्दैन ।
- जराको वृद्धि हुदैन ।
- पातहरू साना र बढी हरियो रङ्गको हुन्छ । तल्लो पातहरूमा पातको नशाको बीच बीचमा पहेलो देखिन्छ । यसरी पहेलिटा पातको टुप्पाबाट शुरु हुन्छ । पात सुकेर मर्दछ ।
- कहिले काहीँ खैरो दागहरू बढी हरियो भएको पातहरूमा देखिन्छ ।
- धानमा लामो र पातले बाला देखिन्छ ।
- विरवामा Physiological Process कम भई फलको गुणस्तर कम हुन गई उत्पादन पनि घट्दछ ।
- बोट विरवा कमजोर भई रोग र किराको प्रकोप बढ्छ ।

४) Zinc (Zn) को कमिको लक्षण:

- पातमा खैरो किसिमको दाग देखिन्छ । पछि पुरै पात खिया जस्तो रङ्गमा बदलिन्छ ।
- यो क्षारिय माटोमा बढी देखिन्छ ।
- पातको तल पट्टिको भाग खैरो भई माथिको भाग साधारण किसिमको हुन्छ । पछि बढी भएमा पुरै पात खैरो भई मर्दछ ।
- विरवा बढ्न नसकी छ्यास परेको गांज देखा पर्दछ ।

५) Other Micro-nutrients (B, Fe, Mo):

- खासगरी नेपालमा तरकारी बालीमा सबै ठाउँमा बोरोनको कमि देखिन्छ ।

- खास गरी Citric Acid समूहको तरकारी जस्तै: काउली, बन्दा आदिमा डाँठ भित्र खोक्रो परेको र खैरो रङ्गको कुहिएको देखिन्छ ।
- ती तरकारीहरूमा मोलीबडेनमको कमि भएमा पातहरू च्यालिएको जस्तो देखिन्छ र यसलाई Whip tip भनिन्छ ।
- मलको सही प्रयोगकालगि केही सुझावहरू
- रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा फस्फोरस र पोटासको पुरै मात्रा र नाइट्रोजनको आधा मात्रा जमिनको अन्तिम तयारीको बेला प्रयोग गर्ने र बाँकी नाइट्रोजनको मात्रा मध्ये बाली लगाएको ३० देखि ३५ दिन पछि आधा मात्र र बाली पोटाउने बेलामा बाँकी भाग प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- कम्पोस्ट/गोबर मललाई कुहाएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । खेतबारीमा शुग्रो पारेर वा छिरोलेर सुकाउनु हुँदैन, जोतेर पुरिदिनु पर्दछ ।
- कृषि जुन माटोमा विरवा भएको जुनसुकै समयमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन राम्ररी माटोमा मिलाउनु पर्दछ र १० देखि १५ दिन पछि मात्र बाली लगाउनु पर्दछ । बाली भित्र कृषि जुन प्रयोग गर्नु हुँदैन । बाली लगाउनु भन्दा कम्तीमा २ हप्ताको फरक पारी कृषि जुन प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
- तिलेपानी बनमार, छिरि, ढैचा र कोसेबालीहरूलाई हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरी माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सकिन्छ । माटोमा वायुमण्डलीय नाइट्रोजन ध्वन कोसेबालीको बाली चक्र अपनाउनु पर्दछ ।
- सुन्तला जातका फलफुलमा जस्ताको कमि देखिएको हुँदा १०० देखि २०० ग्राम लिंक फस्फेट/बोटका दरले विरवा रोप्दा माटोमा मिसाइ दिने ।
- फलफुल बगैचामा सके वर्षको २ पटक नसके १ पटक पुस माघमा अनिवार्य रूपले प्राश्नरिक मलहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- कोसेबाली, तोरीबाली र सुतीबालीहरूमा धेरै नाइट्रोजन मलको प्रयोग गर्नु हुँदैन । सिफरिस मात्रा बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- कोसेबालीको बीउलाई सुक्ष्म जैविक मलले उपचार गरेर रोप्ने गर्नु पर्दछ ।
- तेलबालीमा क्याल्सीयम, म्याग्नेसियम र गन्धक धेरै चाहिन्छ ।

नता: यसै श्रोत भएको मलहरू प्रयोग गर्दा उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

१०३. सागापात जातका तरकारी बालीहरू

रायो, स्वीसचाई, चम्सुर, पालुङ्गो, मेथी, लहुरे आदि सागापात तरकारी बालीहरू हुन् । यी तरकारीहरू बढी पोसिलो र हाम्रो दैनिक उपयोगमा ३० जति प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

१) रायो: तरकारीमा विशेष पाते सागा मध्ये यो १ नम्बरमा पर्दछ । तराई देखि पहाड सम्म सबै ठाउँमा यो खेती गर्न सकिन्छ र यसमा भिटाभिन ए, बी, सी, र ई तथा फलाम, प्रोटिन, र क्याल्सीयम प्रशस्त पाइन्छ ।

हावापानी: चिसो ठाउँ उच्च पहाड देखि तराई सम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । यसले तुषारो र हिउँ खप्न सक्छ । चिसोमा पातको गुणस्तर राम्रो हुन्छ तर गर्मीमा डुकु पलाई पातको गुणस्तर घट्छ ।

माटो: सबै किसिमको माटोमा खेती गर्न सकिने तर प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त भएको र पानी अड्याउने बढी क्षमता भएको दुमट माटो राम्रो मानिन्छ ।

जातहरू:

- खुमल चौडा पात
- खुमल रातो पात
- मार्फा चौडा पात - बढ्दैन बानी (अर्ध ठाडो) ।

पात गाढा हरियो, कच्चाक कुचुक परेको सतह, बाक्लो पात, पातमा झुस तर डाँठमा हुँदैन । पातहरू ४०-५० से.मी. लामा र २५-३० से.मी. चौडा थोप्ने रोग नसहने । अर्ध ठाडो देखि ठाडो, हल्का रातो थोप्ना, सतह चिल्लो र नरम हुन्छ । पात र डाँठ झुस विहिन, च्याप्टो र बाक्लो पात हुन्छ । २५-३० से.मी. लामा, १५-२० से.मी. चौडा र बटारिएको लामो समय सम्म डुकु नआउने स्वादिलो एवं तराईका लागि महत्वपूर्ण भनिन्छ । अर्ध ठाडो, हल्का हरियो, सतह चिल्लो, पात र डाँठमा झुस नभएको बाक्लो पात । ४०-५० से.मी. लामा, २०-३० से.मी. चौडा, पातहरू च्याप्टो हुने, ढिलो डुकु आउने, स्वादिलो एवं पहाडमा राम्रो हुने ।

बेर्ना उमाने: एक मिटर सतहबाट उठेको व्याड तयार गर्ने । ६/६ से.मी. को फरकमा ३ से.मी. गहिरो सियो बनाउने । पातलो तरीकाले बीउ रोपी माटोले छोप्ने । बेर्ना ठीक तरीकाले बेडाउने । २/३ पाते विरवा दोश्रो व्याडमा लगी

६ से.मी.को दुरीमा सारीदिने । ५/६ पाते विरवा सार्न लायक बन्दछन् ।
C १० से.मी.को दुरीमा बेर्ना सार्ने।

बीउ दर: २० ग्राम/का ।

जग्गाको तयारी: २-३ पटक जोत्ने, डल्ला फोर्ने र सम्पाएर सतहबाट उठे
इयाडमा विरवा सार्न सकिन्छ ।

बाली लगाउने तथा लिने समय:

क्षेत्र	बाली लगाउने समय	बाली लिने समय
उच्च पहाड	फगुन(बैशाख	जेठ(भदौ
मध्य पहाड	भदौ(मंसिर	कार्तिक(फागुन
तराई	असोज(पुस	कार्तिक(फागुन

दुरी: ३० C १० से.मी. ।

मलखाद प्रति का:

- गोठेमल ६५० कि.ग्रा.
- नाइरोजन ३ कि.ग्रा.
- डि.ए.पी. १.५ कि.ग्रा.
- पोटास १.५ कि.ग्रा.

सबै मल एकै पटक र युरियालाई ३ भाग लगाई टपट्रेस गर्नु पर्दछ । गोबर
मल (कम्पोष्ट) राख्नु आवश्यक पर्दछ ।

सिंचाई: बेर्ना सारे पछि सिंचाई गर्ने र पछि आवश्यकतानुसार सिंचाई गर्ने ।

गोडमेल: झारपात र जमिनको अवस्थानुसार ।

बाली (पात) टिप्ने:

- बेर्ना सारेको २५-३० दिनमा ।
- पात टिप्ना बोटलाई असर नपर्ने गरी टिप्नु पर्दछ ।
- पातको डाँठको अन्तमा चक्कुले काटेर पात टिप्नु पर्दछ ।
- बढी उत्पादन लिन कलिला तर राम्रो हुर्केका पातहरू लगातार टिप्नु पर्दछ ।
- छिप्पाएर टिप्नेमा उत्पादन कम हुन सक्छ ।

उत्पादन: जातअनुसार १००० देखि २००० किलो ग्राम प्रति का ।

२) चमसुर: पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा यसको खेती राम्रो हुन्छ । यसमा भिटामिन ए र सी, क्याल्सीयम, फस्फोरस तथा प्रोटीन पाइन्छ । बीउ लगाएबाट ३० - ३५ दिन देखि बाली उत्पादन लिन सकिन्छ ।

हावापानी: चिसो ठाउँमा यसको खेती गरिन्छ । उच्च पहाडमा गर्मीको समयमा र तराई तथा पहाडमा चिसो समयमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा बाह्रै महिना खेती गर्न सकिन्छ ।

माटो: प्राञ्चारिक पदार्थ भएको माटो, उचित गोडमेल र मलखादको व्यवस्था भएमा राम्रो खेती गर्न सकिन्छ ।

जातहरू: काठमाडौं स्थानीय ।

- बोट ठाडो बढ्ने, हागा नलाग्ने ।
- पातहरू हरिया, किनारा काटिएको, फैलिने ।
- काँचै खादा पिसो लाग्ने ।
- फुल गुलाबी सेतो हुनु ।

बीउ दर: ३२५ ग्राम प्रति का ।

जग्गाको तयारी: खनजोत गरी १५ - २० से.मी. उठेको १ मिटर चौडा ड्याडहरू बनाउने । दुई ड्याडका बीच ३० से.मी. चौडा माटो बनाउने । वर्षे खेतीका लागि पानी निकासको व्यवस्था गर्ने ।

लगाउने तरीका: सोझै ड्याडमा बीउ छर्ने ।

बाली लगाउने तथा लिने समय:

क्षेत्र	बाली लगाउने समय	बाली लिने समय
उच्च पहाड	तुषारो र हिउँ पर्ने समय बाहेक सधैं	तुषारो बाहेक बाह्रै महिना
मध्य पहाड	भदौ - पुस	असोज - फागुन
तराई	कार्तिक - माघ	मंसिर - फागुन

दुरी: लाइनको दुरी २०-३० से.मी. र बोटको दुरी २-३ से.मी. ।

मलखाद:

- गोबर ६५० कि.ग्रा.
- युरिया ३ कि.ग्रा. ३ पटक प्रयोग (१कि.ग्रा./पटक)
- डि.ए.पी. १.५ कि.ग्रा.
- पोटास १.५ कि.ग्रा.

सिंचाई: आवश्यकतानुसार ।

गोडमेल: माटो र झारपातको अवस्थानुसार ।

बाली काट्ने:

- डुकु पलाउनु भन्दा पहिले बोटको फेदमा काट्ने ।
- बीउ उमेरको २० - २५ दिनमा बाली लिन सकिन्छ ।
- मलखाद र पानीको राम्रो व्यवस्था भएमा २३ पटक फसल लिन सकिन्छ । दोश्रो पटक ४०-४५ दिनमा र तेस्रो पटक ६०-६५ दिनमा बाली लिन सकिन्छ ।

उत्पादन: २०० - ३०० कि.ग्रा. प्रति का ।

१) पालुङ्गो: यो तराईको हिउँदे तरकारी बाली हो र उच्च पहाडमा गर्मी थाममा लगाइन्छ । यसमा भिटामिन ए, बी र सी, फलाम र क्याल्सीयम प्रचुरमा मात्रामा पाइन्छ ।

हावापानी: तुषारो र हिउँ पर्ने समय बाहेक सधैं यसको खेती गर्न सकिन्छ । (१५-२०)°C को तापक्रम यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

माटो: प्रशस्त प्राञ्चारिक तत्त्व भएको बलौटे दोमन माटो उपयुक्त मानिन्छ ।

जातहरू: पाटने (पहाडी) र अलग्रीन र बेलायती ।

पहाडी (पाटने) दुशी (अलग्रीन): ठाडो र छिटो बढ्ने बानी भएको, पातहरू नरम, बाक्लो, हरियो तथा गाढा हरियो, पातको डाँठको फेदमा गुलाबी रङ्ग भएको हुन्छ । भाले र पोथी फुल अलग अलग बोटमा फुल्छ । बीउ झोडदार, तीनकुने हुन्छ । ठाडो र छिटो बढ्ने बानी भएको, पातहरू एकनासको, नरम, गाढा, हरियो हुन्छ । भाले पोथी फुल अलग अलग फुल्ने,

बोट अगला हुन्छन् । लामो समय सम्म नफुल्ने र बीउ काडा नभएका, गोली आकारका हुन्छन् ।

बीउ दर:

- पहाडी- ३२५ ग्राम प्रति का ।
- देशी- ६५० ग्राम देखि १ किलो ग्राम प्रति का ।

जरगाको तयारी: चमसुरमा जस्तै गर्नु पर्दछ ।

दुरी: ३० C ५ से.मी. ।

बाली लगाउने तथा लिने समय:

क्षेत्र	बाली लगाउने समय	बाली लिने समय
उच्च पहाड	फागुन - बैशाख	तुषारो बाहेक बाहेँ महिना
मध्य पहाड	भदौ - माघ	कार्तिक - बैशाख
तराई	कार्तिक - पुस	पुस - फागुन

मलखाद: चमसुरमा जतिकै तर अलग्गिन (देशी)का लागि नाइट्रोजन बढी प्रयोग गर्ने । गोबर मलमा प्राथमिकता दिने ।

सिंचाई तथा गोडमेल: आवश्यकतानुसार गर्नु पर्दछ ।

बाली टिप्ने: समान्यतया बीउ छरेको १ महिनामा बाली टिप्न सकिन्छ । जात अनुसार २-७ पटक सम्म बाली टिप्न सकिन्छ । पहाडी ३-४ पटक र देशी ६-७ पटक सम्म ।

उत्पादन: ५०० - ८०० किलो ग्राम प्रति का ।

४) स्वीसचाई: यो बाली नेपालका लागि नयाँ र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । एक पटक लगाएपछि लामो समय सम्म बाली लिन पाइने भएकाले ग्रामिण क्षेत्रका लागि अत्यन्तै प्रख्यात भएको छ । यसमा फलाम, भिटामिनमा ए र बी तथा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । हावापानी र माटो पालुझोको जस्तै आवश्यक हुन्छ ।

जात: फोर्डहुक ज्वाइन्ट ।

विशेषताहरू:

- ठाडो, अग्लो (७०-७५से.मी) र छिटो बढ्ने बानी भएको ।
- बीउ गोली, देशी पालक भन्दा ठुलो हुन्छ ।
- धेरै समय पछि जुकु फलाउने हुँदा हरियो पात प्रशस्त उत्पादन लिन सकिन्छ ।
- पातहरू ठुला, गाढा हरियो, कय्याक कुचुक परेको, पातको डाँठ र प मध्य नशा क्रिम रङको हुन्छ ।

बीउ दर: ३२५ ग्राम/का ।

बेर्ना उत्पादन: नर्सरीमा बेर्ना उत्पादन गरे पछि विरवा सार्नु पर्दछ ।

जरगाको तयारी: २-३ पटक जोती मसिनो बनाई सय्याउने । हिउँदे सम्मो (Leveling) गरामा लगाउन सकिन्छ । बर्षे बाली ड्याड बनाई लगाउन

बाली लगाउने तथा लिने समय:

क्षेत्र	बाली लगाउने समय	बाली लिने समय
उच्च पहाड	हिउँ र तुषारो पर्ने महिना बाहेक	सधैँ लगाउने र टिप्ने
मध्य पहाड	वर्ष भरि	वर्ष भरि
तराई	असोज - पुस	मंसिर - चैत्र - बैशाख

दुरी: ३० C २० से.मी. ।

मलखाद: पालुझोमा जस्तै ६५०, ३५, १.५, १.५/का क्रमशः गोबर पुरिया, डि.ए.पी. र पोटास प्रयोग गर्ने ।

सिंचाई र गोडमेल: अन्य हरियो सागपातमा जस्तै ।

बाली लिने:

- बेर्ना सारेको १.५ महिना पछिबाट ।
- रायोको पात टिप्ने जस्तै चोट नपर्ने गरी ।
- मध्य पहाडमा सधैँ जसो र अन्य ठाउँमा ६(८ महिना सम्म फसल सकिन्छ ।

उत्पादन: ६५० - १००० किलो ग्राम प्रति का ।

१) रायोको मोज्याक: यो भाइरसबाट लाग्ने रोग हो । यसले मुला तथा सलगममा मोज्याक रोग उत्पन्न गर्दछ । यस भाइरसको नाम Turnip mosaic virus हो ।

लक्षण: पुरै खेतबारीमा प्रभावित पातहरू टाटपाटे हुँदै नशाहरू पहेलिन्छन् र पछि पुरै बारी भरिका पात पहेलिन्छन् । नशाहरूका बीचमा निश्चित आकार नभएका गाढा हरिया उठेका भागहरू देखिन्छन्।

श्रोत: लाही किराबाट यो रोग सर्दछ ।

नियन्त्रण:

- रोग मुक्त बीउको प्रयोग गर्ने ।
- लाही किरा विरुद्ध किटनाशक विषादी Cypermethrin 2ml/liter पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) रायो र पालुङ्गेमा लाग्ने सेतो सिन्दुरे रोग: यो रोग Alternaria Sp. भन्ने हुसीद्वारा उत्पादन हुन्छ ।

लक्षण: पातमा छैरा थोप्लाहरू देखिन्छन् र शित लाग्ने वा चिस्यान बढी भएमा निलो खालका हुसीहरूको वृद्धि भएको देखिन्छन् । पछि पातमा, डाँठमा पनि थोप्लाहरू देखिन्छन् ।

नियन्त्रण:

- घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने ।
- कपर अक्सीक्लोराइड- २ ग्राम/लिट्र पानीमा राखी से गर्ने ।
- Krinovy Gold/Krinovy- २ ग्राम/लिट्र पानीमा राखेर से गर्ने । से मौसम अनुसार १५/१५ दिनको फरकमा गर्ने ।

परिचय: काउली बाली भन्नाले फुलगोभी, बन्दगोभी, गाठगोभी, चाइनिज बन्द र ब्रोकाउली भन्ने वृक्षानु पर्दछ । काउली जातका बालीहरूको वंश क्रुसिफेरी र अनुवंश ब्रासिका हो । यी बालीहरूको उपयोग गर्ने भाग फरक-फरक भए तापनि खेती प्रविधि प्रायः एकै किसिमका छन् । यी बालीहरूको उत्पत्ति युरोप महादेश मानिन्छ । यसको उपयोग पकाएर, कच्चे तथा अचार बनाएर उपरसी गरिन्छ । पौष्टिक महत्त्व अन्तर्गत यी बालीहरूमा भिटामिन ए र सी क्याल्सीयम, फस्फोरस, पोटासियम, सोडियम र फलाम जस्ता खनिज तत्वहरू पनि पाइन्छन् । यी तरकारी खानाले पखाला, वायु, शूल तथा टाउको दुल्ने रोगमा फाइदा गर्दछ ।

१) काउली: हावापानीका दृष्टिकोणले सबै काउली जातका तरकारीहरू जाडो याममा लगाउन सकिन्छ । तर वानस्पतिक अवस्थाबाट काउलीमा परिवर्तन हुँदा, वृद्धि हुँदा र काउलीबाट डुकु पलाउँदा हावापानीको असर धेरै पर्दछ । यो ५-३०°C को तापक्रम भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । अगोटे जालाई २०-३०°C, मध्ये याममा लगाउने जालाई १५-१९°C र पछौटे याममा लगाउने जालाई १०-१५°C को तापक्रम राम्रो मानिन्छ । ०°C भन्दा केहि माथिको तापक्रममा बेर्नाको वृद्धि रोकिन्छ ।

वानस्पतिक विवरण: काउलीको जुन भाग हामी खान्छौं त्यो फुल भनएर फुल (डुकु निस्केपछि तोरीको जस्तो) फुल्ने शिर्षस्थ भाग हो । यसैबाट डुकु निस्की फुल फुल्दछ र पछि तोरीमा जस्तै दाना लाग्दछ।

भगौटे जातहरू मध्य यामका जातहरू पछौटे जातहरू: फस्ट अर्ली, कुंवारी, क्रांतिकी, अघनी, सिलभरकप, स्लोकिङ्ग पुसी, माथी, काठमाडौँ स्थानिय, स्मोक्राउन स्लोवल-१६, किवोजेन्ट, स्मोक्राउन

भाट साना, लामो डाँठ भएका, फल लाग्ने, पात छरिएका, पातले फुल शोभिँदैन । बोट अग्लो, पात ठुला, चौडा र फुल च्याप्टो, खुकुलो, पातले माथोपेको हुन्छ । बोट छोटो, पात छोटो ठाडो भएका र पातले फुल ढाकिने हुन्छ ।

माटो: सिंचाई र मलको राम्रो व्यवस्था भएमा सबै किसिमको माटोमा काउली लगाउन सकिन्छ । बलौटे, दोमट र प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त भएको, पानी नजम्ने, पानीको निकास भएको जमिनमा काउली खेती राम्रो मानिन्छ ।

मलखार: यसको खेतीका लागि प्रशस्त मलखादको आवश्यकता पर्दछ । विशेष तरिकाले पाकेको गोबर मल वा प्राङ्गारिक मल २०-३० डेको प्रति का माटोमा खनजोत गर्ने बखतमा नै र ना.फ.पो=३:२:५:१.५ के.जी. प्रति का प्रयोग गर्ने । साथै आजकल माटोमा बोरोन तत्वको कमि देखिन थालेकाले ५०० ग्राम प्रति का बोरोन पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

बीउ दर र रोप्ने तरिका:

- बालीको किसिम बीउको मात्रा/का
- रोप्ने दुरी
- अगौटे जातहरू १०-१५ ग्राम लाइनको फरक ४५ से.मी.
- बोटको फरक ४५ से.मी.
- मध्य तथा पछाँटे जातहरू १० ग्राम लाइनको फरक ६० से.मी.
- बोटको फरक ४५ से.मी.

बेर्ना तयारी: काउलीको खेती नर्सरीमा विरवा तयार गरी खेतबारीमा सारेर गरिन्छ । जात अनुसार काउलीका बेर्नाहरू अगौटे भए ३-४ पातमा, पछाँटेका लागि ५-६ पात भएपछि सार्न लायक मानिन्छ । सामान्यतय २५-३० दिनमा विरवा सार्न लायक बन्दछ र यदि दोश्रो नर्सरीमा लगाई त्यस पछि खेतबारीमा सार्ने हो भने ३५-४५ दिनमा सार्न लायक बन्दछ । यसरी दोश्रो नर्सरीमा बेर्ना हुर्काउँदा विरवा स्वस्थ, मोटा र दरिला हुनुको साथै १०-१५ दिन पछि सम्म खास जमिन भन्दा अन्यत्र हुर्काउन सकिन्छ । १ काका लागि बेर्ना बनाउन २ वर्ग मिटर नर्सरी आवश्यक हुन्छ । ३-४ पटक खनजोत गरी नर्सरी बनाई १० से.मी.को फरकमा लाइन बनाएर बीउलाई राम्ररी रोप्ने र माटोले वा हल्का बालुवाले बीउ छोपी पराल वा सुकेको झारपातले ढाकिदिने । यसरी छोपीसकेपछि हजारीले हल्का सिंचाई गर्ने ।

ब्याडलाई धेरै चिसो र धेरै सुख्खा नबनाउने, ठीक चिसो बनाउने । यसो गर्दा डाँठ कुहिने रोग लाग्दैन । बीउ उमी सकेपछि पराल त्यहाँबाट हटाउने, सिंचाई गर्ने र आवश्यकतानुसार गोडमेल गर्ने । बेर्ना सार्न लायक बनेपछि उखेलु अथि राम्ररी सिंचाई गर्ने । यसो गर्दा बेर्ना जरा सहित राम्ररी उखेल्न सकिन्छ र सारी सकेपछि हजारीद्वारा सिंचाई गर्ने । बेर्ना बेलुकी पख रोपण गर्नु पर्दछ ।

जमिनको तयारी: काउली खेती गर्ने जमिन ४-६ पटक खनजोत गरी, पानीका निकास बनाई, सिंचाईको व्यवस्था गरी, प्राङ्गारिक मल ३०-४० डेको/का जोत्ने समयमै प्रयोग गर्ने । सिजन अनुसार ड्याड बनाउने । अगौटेका लागि धेरै अग्लो ड्याड बनाउने र पछि हिउँदमा लगाउने भए अलि होचो बनाए पनि हुन्छ ।

बेर्ना रोपण, गोडमेल तथा सिंचाई: बेर्नाहरू सामान्यतया ४-६ पातको भएपछि सार्ने गर्नु पर्दछ । ब्याडबाट जरा नबुडालिकन बेर्नालाई ट्रे वा नाड्तीमा राखी विरवा सार्ने जमिनमा लैजाने जुन काम बेलुकी पख गर्नु पर्दछ र सारेपछि हजारीले हल्का सिंचाई गर्नु पर्दछ । विरवा राम्ररी नसरन्जेल लगातार र सारिसकेपछि आवश्यकतानुसार सिंचाई गर्नु पर्दछ । १५-२० दिन पछि गोडमेल गर्ने र ४-५ ग्राम युरिया प्रति बोट जरामा नछुने गरी टपड्रेस गर्ने । मरेको विरवा हेरी पुनः रोमण गर्ने तर धेरै समय पछि यो कार्य गर्नु हुँदैन ।

काउली खेती बिग्रने कारण:

बटनिङ: समय नपुग्दै गुच्चा जत्रै फुल देखा पर्ने प्रक्रियालाई बटनिङ भनिन्छ । यसको कारणहरूमा हुर्किसकेका बेर्ना सार्नाले, नाइट्रोजन युक्त मलको कमि हुनाले तथा जात अनुसार रोप्ने समय नमिल्नाले ।

राइसीनेस: काउलीको फुलमा एक किसिमको झुस जस्तो निस्की गुणस्तरमा हास आउन सक्छ । समय र तापक्रमको आधारमा काउली खेती गर्नु पर्दछ ।

सुक्ष्म तत्वको कमि:

क) बोरोन- यसलाई बोरेक्स वा सहाग पनि भनिन्छ । यो माटोको सुक्ष्म मात्रामा पाइने भएकाले आजकल धेरै ठाउँमा यसको कमि भएको पाइन्छ । यो तत्वको कमिका कारणले काउलीको बीचको डाँठ खोक्रो भई खैरो रङ्ग देखिन्छ र पछि काउलीको भुजामा बैजनी रङ्गको विकास भई स्वाद पनि नमिठो (तिर्याईदो) हुने र पछि फल पुरै खैरो भई खान, बेच्न अयोग्य हुन्छ।

ख) मोलिबडेनम- यसको कमिले काउलीको बोट पहुँलो हुँदै सेतो हुन्छ र यसलाई द्विपटेल भनिन्छ । अस्थीय माटोमा मोलिबडेनम उपलब्ध नहुने हुनाले

माटोको पि.एच. ६.५ मा ल्याउनु पर्दछ । ३०ग्राम प्रति का सोडियम र एमोनियम मोलिवडेट रसायनिक मलका साथ प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

औषत उत्पादन: अगौटे ३२५ कि.ग्रा./का, र पछौटे ५२० कि.ग्रा./का।

२) बन्दा: यो पनि काउली जस्तै महत्वपूर्ण तरकारी हो । यसको खेती पहाड देखि तराई सम्म सबै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । पौष्टिकताका दृष्टिकोणले यसमा भिटामिन ए प्रशस्त पाइन्छ । यसको खेती दोमट माटोमा र प्राञ्चारिक पदार्थ प्रशस्त भएको ठाउँमा गर्न सकिन्छ । साधारणतया बन्दालाई पनि काउलीकै जस्तो हावापानी तथा माटोको आवश्यकता पर्दछ ।

जातहरू:

- अगौटे: प्राइड अफ इन्डिया र गोल्डन एकरा अर्ध खडा, गोलो चुच्चो आकार, वजन १(२ कि.ग्रा. र नेपाल अधिराज्य भर लगाउन सकिन्छ ।
- मध्य सिजन: अर्ध खडा, गोलो तथा चुच्चो आकार, २-३ कि.ग्रा. वजन हुने, सबै ठाउँमा लगाउन सकिने अर्लो डूमहेड, ग्रीन क्रोजन, ग्रीन कोरोनेट, ग्रीन स्टोन, दशैभरी ।
- पछौटे सिजन: फैलिने, चेप्टो दमाहा आकारका हुने, ४-५ कि.ग्रा. वजन हुने, सबै ठाउँमा लगाउन सकिने (लेट लार्ज डूम हेड), कोपन हेगन मार्केट ।

समय, रोप्ने दुरी र बीउ दर:

- मौसम- अगौटे, दुरी ४५ x C ४५ से मी., बीउ दर/कट्टा १०-१५ ग्राम।
- मौसम- पछौटे, दुरी ७५ x C ६० से.मी., बीउ दर/कट्टा १० ग्राम ।

मलखाद: काउलीमा जस्तै ।

उत्पादन: ३०० - ५०० कि.ग्रा./कट्टा ।

हिलो बेर्ना सार्ना शुद्धा बन्ने समस्या हुने भएकाले PGR प्रयोग गर्ने ।

३) बोकाउली:

जातहरू: ग्रीन स्पाउटीड, डेसिको, कालाब्रेस ।

बीउ दर: २० ग्रा./का ।

उत्पादन: २५० - ४०० कि.ग्रा./कट्टा ।

१०६. काउली, बन्दा बालीमा लाग्ने मुख्य भाउहरू र तिनीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू

१) बन्दाको पुतली: यसका चार अवस्था हुन्छन् । लार्भाले पातमा च्वाल पारेर खान्छ र ज्यादै भयो भने विरवाका पात सबै खाएर डाँठ मात्र बाँकी रहन्छ।

- यसका फुल, लार्भा र अचल अवस्था सबै नाश गर्ने ।
- पुतलीलाई हत जालीले पकेर नष्ट गर्ने ।
- Apantels जातका बारलाले किराहरू खाई दिने भएकोले त्यसको विकास गर्ने

२) पीठमा ईटको आकार भएका पुतली: यसले कलिला पात खान्छन् । धेरै किराको प्रकोप भएमा पातको सबै भाग खाई बोट नाङ्गो र जालिदार बनेको हुन्छ ।

- तरकारी टिपेपछि पात र डाँठ हटाउने ।
- रासायनिक विषादी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने (Decis, Nuwan, Cypermethrin etc.).
- प्राकृतिक शत्रु Apantels जातको बारलाको विकास गर्ने ।
- गोलभेंडाले यो किराको प्रतिकार गर्ने भएकाले काउली र गोलभेंडको मिश्रीत खेती गर्ने (गोलभेंडा १ महिना पहिला रोप्ने) ।

३) सुतीका पात खाने किरा (Tobacco Cater Pillars): लार्भाहरूले पात खाने, सानो अवस्थामा पातको तल झुण्ड बनाई बस्छन् र क्षति पुऱ्याउँछन् । बढे पछि तितर वितर हुँदै पात पुरै खाई डाँठमात्र बाँकी रहन्छ ।

- फुल र लार्भाहरू नष्ट गर्ने ।
- यी किरा जमिन मुनी बस्ने भएकाले सिँचाई गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।
- कम खतरा विषादी प्रयोग गर्ने नभए मालाथिन, रोगर र मिलिलिट/लिटार पानीका दरले प्रयोग गर्ने ।

४) बन्दाको पातमा जालो बनाउने किरा: लार्भाहरूले पातमा जालो बनाई त्यसै भित्र बसी पात खान्छन् । ज्यादा भएमा पातहरूमा प्रशस्त जालो मात्र देखिन्छन् ।

- लार्भा तथा जालो हटाउने ।
- किटनाशक विषादी थायोडान, रोगर, मालाथिन आदि प्रयोग गर्ने ।

५) फेद काट्ने किराहरू: लार्भाले जमिन मुनि बसी विरवाका जरा र फेद काट्ने काम गर्दछ । डर्सवान - ५०० ग्राम/काका दरले प्रयोग गर्ने ।

६) पात वेरवा: लार्भाले पात वेरेर बस्छ र त्यही पसेर खाने गर्दछ । रोगर/मालाथिन विषादीको प्रयोग गर्ने ।

७) तोरी र बन्दाको लाही: यो किरा विरवाको विभिन्न भागमा बसी रस चुसेर कमजोर बनाउँछ । यसले गुलियो दिसा गर्छ जो विरवाको सतहमा टसिर्सि त्यही एक प्रकारको हुसी लागेर सतहलाई कालो बनाउँछ । यी किराका शत्रुहरू: Lady Bird Beetle, घुमककड झिझाहरू, जालिदार र पखेटादार किराहरू, साना बारलाहरूले लाही नाश गर्दछन् । त्यसैले उपरोक्त बमोजिमका किरा खेतबारीमा भए विषादी प्रयोग नगर्ने । किराको प्रकोप बढी भए विषादी प्रयोग गर्ने: रोगर १.५ देखि २ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले ।

८) फट्याङ्गा: यसले विरवाका पात विशेष छेउ तिरबाट खाई नोक्सान पुर्‍याउँछन् ।

- जालीमा पक्नेर नष्ट गर्ने ।
- प्रकोप ज्यादा भएमा Decis/Nuraph/Cypermethrin प्रयोग गर्ने ।

काउली बालीमा लाग्ने रोगहरू

समस्याहरू समाधानहरू

१) बेर्ना कुहिने रोग (Damping off): यो विशेषत जरा भन्दा माथि जमिनको सतहमा हुसीले आक्रमण गरी डटिमा कालो दाग देखिने र बोटलाई यो रोगले सताए पछि विरवा लड्दछ । यो रोग माटोमै बस्छ र जब उचित मौसम प्राप्त हुन्छ तब पुनः बढ्दछ ।

- ब्याडमा बीउ फरक फरक पारी लगाउने ।
- ब्याडमा ज्यादा सिंचाई नगर्ने ।
- लगाउनु भन्दा पहिला थिरम/साफ/बैबिस्टिन २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाइ जमिनको उपचार गर्ने ।
- बीउ, किलोक्सील २ ग्राम/किलो ग्रामका दरले उपचार गरी रोपण गर्ने ।
- पछि बेर्नामा किलोक्सील २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई स्ने गर्ने ।

२) काले थोप्ने रोग: अल्टरनेरिया हुसीद्वारा यो रोग लाग्दछ । साना खैरा थोप्लाबाट बढ्दै हुसीको विकास भै हावा, किरा र औजार समेतबाट पथि सर्न सक्दछ ।

- बीउलाई ५०°C तातो पानीमा १० मिनेट सम्म डुबाएर उपचार गर्ने र २. ग्रा. थिरम वा साफले बीउ उपचार गर्ने ।
- बाली चक्र अपनाउने ।
- रोमी बोट संकलन गरी जलाउने ।
- हुसी नाशक विषादीले नियमित स्ने गर्ने ।

४) शिते हुसी (Downy Mildew): चिसो र ओसिलो ठाउँमा यो रोग बढ्छ। खैरा दागबाट बढ्दै पछि सेतो हुसीमा रुपान्तरण हुन्छ:

- बीउ स्वस्थ प्रयोग गर्ने ।
- मनतातो पानी/विषादीले बीउको उपचार गरी रोप्ने ।
- बारीको वरीपरी झारपात नाश गर्ने ।
- बाली चक्र अपनाउने ।
- रोग देखिएमा किलोक्सील प्रयोग गर्ने ।
- रोग अवरोधक जात प्रयोग गर्ने ।

५) कालो सड्ने (Black Rot): पातको किनाराबाट पहेंलो रङ्गबाट शुरू भै बीचमा 'V' आकारको पहेंला दाग बन्दै अगाडि बढ्दछन् । यो रोग बीउबागमा भर्ना हुँदै भित्र पस्छन् । सिंचाई, वर्षा तथा हावाले पनि यो रोग सान्ने काममा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

- Streptocycline/Plantomycin-१ ग्राम / ५ लिटर पानीमा राखी स्ने गर्ने ।
- बाली चक्र अपनाउने ।
- विरवा रोपण गर्दा Kibestian र पानीको घोलमा डुबाई उपचार गर्ने ।
- ५०°C को तातो पानीमा बीउ लाई ५ मिनेट सम्म डुबाई बीउ छर्ने गर्नु पर्दछ ।

कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रबाट
प्रकाशित हुने कृषि सामाग्री पढ्ने गरौं ।

१०७. जरे तरकारी मुला, गाजर, सलगमको उत्पादन प्रविधि

जरे बाली अन्तर्गत मुला (Radish) *Raphanus sativus*, गाजर (Carrot) *Daucus carota* (Umbelliferae Family), सलगम (Turnip) *Brassica campestris var. rapa* (Cruciferae Family) र चुकन्दर (Sugar Beet) *Beta vulgaris* (Chenopodiaceae Family) पर्दछन् । यस मध्येमा मुला महत्वपूर्ण जरे तरकारीमा पर्दछ । उत्पादन र क्षेत्रफलका आधारमा मुलाले नेपालमा प्रथम स्थान ओगट्दछ ।

चुकन्दर: (Sugar Beet) *Beta vulgaris* (Chenopodiaceae Family): मुलामा भिटाभिन सी, गाजरमा भिटाभिन सी, ए पाइन्छ । मुला र सलगम काँचै, तरकारी, अचार र सुकाएर खाने गरिन्छ । गाजर काँचै र कनै हलुवा पनि बनाएर खाइन्छ । चुकन्दर भने हाम्रो देशमा भर्खर मात्रै कही कही खेती गर्न थालिएको छ ।

मुला: (Radish) *Raphanus sativus*

हावापानी: बिसौ हावापानी १८ - २४°C औषत तापक्रम र उचित प्रकाश भएको ठाउँमा खेती गर्न सकिन्छ । मुला गर्मी याममा पिलो र कडा हुनु तथा चाडै डुकु पलाउने हुन्छ (डुकु- फुल फुल्ने) ।

माटो: मुला सबै किसिमको माटोमा लगाउन सकिन्छ तापनि हल्का बुरबुराउँदो, दुमट देखि बलौटे दुमट र कम्पोष्ट मल प्रशस्त भएको माटोमा गरिन्छ, कडा माटोमा खेती गर्दा जरा बिग्रन्छ ।

जातहरू: ह्वाइट नेक, भिनो अर्लि, प्युठाने रातो, ४० दिने, चेतकी, टोकिनासे आदि ।

जमिनको तयारी: जरा राम्ररी बढ्नका लागि हलुङ्गो र बुरबुराउँदो माटो चाहिने भएकोले ३-४ पटक खनजोत गरी झारपात सफा गर्नु पर्दछ ।

मलखाद: प्राङ्गारिक वा गोबर मल ७०० कि.ग्रा., युरिया २ कि.ग्रा., डि.ए.पी. २.५ कि.ग्रा. र पोटास २ कि.ग्रा. प्रति का प्रयोग गर्ने ।

Borax: (बोरोन) तत्त्वको कीम भएर मुलाका जराहरू फुट्ने समस्या भएको देखिन्छ । यदि यस्तो समस्या हुने भएमा १० किलो ग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टरका दरले शुरुमै अन्य मल राख्ने बेलामा नै माटोमा मिलाई मुला लगाउनु पर्दछ ।

सिंचाई: मौसम, माटोको किसिम, मल (प्राङ्गारिक पदार्थ) को मात्रा र उमेरका आधारमा सिंचाई गर्नु पर्दछ ।

बीड दर र लगाउने विधि: २५०-३०० ग्राम प्रति का र दूरी ३० स.मी. को फरकमा लगाउन सकिन्छ ।

गोडमेल: झारपात नियन्त्रण गर्न समय समयमा गोडमेल गर्ने, वर्षा जार आउने भएकोले २ पटक गोडी माटो चढाउने (ड्याड उठाउने), ग्रामक झार नाशन विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

लगाउने समय: ह्वाइटनेक, भिनो अर्लि र प्युठाने रातो असोज देखि चैत लगाउने । ४० दिने र चेतकी भदौ देखि कार्तिक र चैत्र देखि टोकिनासे लगभग सधैं लगाउन सकिन्छ ।

पाली लिने: जात अनुसार अगोटे जातहरू ३५-४५ दिनमा र पछौटे ४०-७० दिनमा बाली लिन सकिन्छ ।

उत्पादन: अगोटे २५० किलो ग्राम प्रति का र पछौटे जात ४०० किलो ग्राम प्रति का ।

१) सलगम (Turnip) *Brassica campestris var. rapa* (Cruciferae Family) जस्तै हावापानी मन पराउने, गर्मीमा छिटो डुकु आउने, हाड भिलो हुने हुन्छ ।

माटो: प्राङ्गारिक तत्त्व प्रशस्त भएको, बुरबुराउँदो र गहिरो माटो, पानी र भिकासको राम्रो व्यवस्था भएको माटो हुनु पर्दछ ।

जातहरू: पर्पलटप ह्वाइट ग्लोव- पृथ्वीको जस्तो गोलाकार, माथिल्लो भाग प्याजी रङ्गको र तल्लो भाग आधा सेतो रङ्गको हुन्छ । भित्री जराको टुप्पो मुसाको पुच्छर जस्तो देखिन्छ ।

माथी तयारी हुने समय: ४० देखि ७० दिनसम्म ।

मलखाद: मुला खेती जस्तै ।

सिंचाई: आवश्यकतानुसार साधारणतया १०-१५ दिनको फरकमा सिंचाई आवश्यक हुन्छ ।

गोडमेल: आवश्यकतानुसार गोडमेल गर्दा बाक्लो भए उखेल्ने काम गर्नु पर्दछ ।

दर: १५० ग्रा./का ।

दुरी: ७५ C ३० से.मी.

बाली लिनो: ६० - ७० दिन ।

उत्पादन: ५०० - १००० किलो ग्राम प्रति कांटा ।

३) गाजर (Carrot) *Daucus carota* (Umbelliferae Family): नेपालमा गाजर २० वर्ष देखि लगाउन थालिएको वा प्रचलित भएको मानिन्छ ।

हावापानी: चिसो हावापानी मन पराउने बाली हो । १८ - २०°C तापक्रममा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

माटो: सबै किसिमको माटोमा लगाउँदा हुन्छ । निकासको व्यवस्था भएको, प्राङ्गारिक मल भएको, हलुङ्गो माटोमा जराको राम्रो विकास हुन्छ ।

जातहरू: न्यूकुरोदा (ठूलो र लामो), नान्टीस (सानो र छोटो) आदि । जन्माको तयारी: मुलाको जस्तै ।

मलखाद: ७०० कि.ग्रा. गोबर मल, युरिया २ कि.ग्रा., डि.ए.पी. १.५ कि.ग्रा. र पोटास १.५ कि.ग्रा. प्रति का प्रयोग गर्ने ।

बीउ दर: २०० - २५० ग्राम/कांटा ।

लगाउने दुरी: ४५ C ५ - १० से.मी. ।

लगाउने समय: असोज - मंसिर ।

सिंचाई: गाजर रोपेको १० - १५ दिन सम्ममा उम्रन्छ । त्यसैले शुक्र देखि नै सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्दछ । (भिजाएर बीउ छर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।) पछि पनि ८ - १० दिनको फरकमा सिंचाई गर्नु पर्दछ ।

गोडमेल: बीउ उम्रेको २ हप्तामा वेडाएर पातलो बनाउने, विरवा हुर्कने समय सम्म २ - ३ पटक झारपात निकाली, गोडमेल गरी जराभा माटो चढाउने ।

बाली लिनो: गाजर खान योग्य भएपछि उखेल्ने, जरा हिलो सम्म नउखेलेमा छिप्पीएर फोक्सो बन्ने हुन्छ । उखेलुनु भन्दा पहिले सिंचाई गर्नाले राम्ररी जरा उखेल्न सकिन्छ र जरा सफा गरी बजार लैजाने ।

उत्पादन: ३५० - ५०० किलो ग्राम/ कांटा ।

१०८. जरे तरकारी बाली समुहको विनाशकारी रोग तथा किराहरू र तिनको नियन्त्रणका उपायहरू

जरे समुहमा पर्ने २ मुख्य विनाशकारी किरा तोरीको करैते झिन्ना र एथालिया प्रोक्सिमा (Apthalia Proximalis) हुन् । यी किराहरूले जरे बाली बाहेक काउली, रायो, र कुसिकेरी समुहका तरकारीमा आक्रमण गर्छन् ।

करैते

पहिचान: वयस्क झिन्नाहरू साना हुन्छन् । शरीर मोटो र कालो तथा सुन्तला रङ्गका हुन्छन् । पछेटा ध्वासे रङ्गको हुन्छ । जसमा काला नशाहरू हुन्छन् । पूर्ण विकसित लाभे २० मिलिमिटर लामो, कालो र चिल्लो हुन्छ । ढाड पट्टि काला धर्साहरू हुन्छन् । यो लाभेलाई छोटो भन्ने बटारिएर भुईँमा झर्छ र गछटपट्टाई मरेको जस्तो बहाना गर्दछ ।

अति: लाभार्हक पातमा सानो सानो प्वाल पारेर खान्छन् र पुरै पात खाएर नश्वी बनाइ दिन्छन् । नशाहरू समेत देखिन्छ र पातहरू झर्दछन् ।

जीवनचक्र: फुलबाट लाभार्हक करीब १ हप्ता समयमा निस्कन्छन् । लाभार्हक पातको किनाराबाट भित्र पट्टि खान थाल्दछन् । तिनीहरू २ हप्ता सम्म खान्छन् । लाभार्ह पूर्ण विकसित भए पछि भुईँमा झर्दछन् र माटो भित्र पसी बोल भित्र बस्छन् । यो अचल अवस्था १० - १२ दिनको हुन्छ । यी किरा भाद्र देखि माघसम्म क्रियाशील रहन्छन् ।

नियन्त्रण:

- हातले टिपेर फाल्ने ।
- सानो क्षेत्रमा प्रभावित विरवालाई मट्टी तेल र पानी भएको किस्तीमा हल्लाउने पनि व्यवहारिक उपाय हो ।
- मालथियन ०.१% अथवा फोस्फायथान ०.०५% को खाह विष भएको २ - ३ मिलिलिटर/लिटर पानीमा भिसाएर छर्ने ।

फडके किरा (Lipaphis erysimi)

यो साना साना मसिना किराहरू पातको किनाराको कलिलो भागमा रस चुसेर खाइ दिनले पात डढेको जस्तो देखिन्छ । अन्तमा कालो भएर जान्छ । यो मुला, गाजर, सलगम, चुकन्दरमा अधिक मात्रामा देखिन्छ ।

नियन्त्रण: Dicis १-२ M/Lt या पानी छेप्ने (water spray) ।

फेद कटुवा/खुम्मे किरा: यो किरा जमिनको सतहमा काट्दछ र डाँठ खान्छ । फुहल गोलो, हल्का पहेलो रङ्गको हुन्छ । यसको जीवनचक्र पुरा हुन ५ - ९ हप्ता सम्म लाग्छ ।

खपटे किरा (थोप्ले खपटे): वयस्क किराहरू स्त्री स्थाभावका हुन्छन् । खपटेहरू १३ ओटा थोप्ला, २८ ओटा थोप्ला हुन्छन् । लार्वाको शारीरिक रङ पहेलो हुन्छ । शरीर भरि नै काँडा हुन्छन् । फुल १२० - १८० ओटा हिन्छ ।

रोकथाम: सेविन ५० पानीमा मिसिने झोल २-३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर छर्नु पर्दछ ।

रातो कमिला: K-Chloro अर्थात् Chloropyriphos group को १-२ एम.एल./लिटर या पानीमा छे गर्ने ।

रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रम सुन्ने गरौं ।

१०९. जरे तरकारी बाली समूह (मुला, गाजर, सलगम, चुकन्दर)का रोगहरू

१) मुलाको सेतो पोके रोग: यो रोग *Albugo conidia* Lev. नामक दुसीबाट उत्पन्न हुन्छ । दुसिले अनेकौं फ्रुसिफेरस विरवाहरूलाई आक्रमण गर्दछ ।

लक्षण: पातको तल्लो सतहमा सेतो फोका बनाउँछ । पछि गएर डाँठ पातका फोकाहरू एक आपसमा मिली ठुला दाग बन्न सक्छ । पछि विरवा पहेलिनै र बढ्न नसक्ने हुन सक्छ । जरे भाग (मिठा) को उत्पादन पनि कम हुन्छ । दुसीको प्रारीम्भक जड माटोमा अवशेष टुक्रा टुक्रामा रहेको र बीउको क्षति मिसिएको स्पष्टरह हुन् । यो बहु वर्षिय झारमा बस्छ । यो रोगको विकासका लागि ओसिलो र ठण्डा मौसम बढी उपयोगी हुन्छ, तसर्थ सो क्षेत्रमा बढी रोग देखिन्छ ।

नियन्त्रण: झार नियन्त्रण, घुम्ती बाली र खेतीबारी स्वच्छ राख्ने गर्नु पर्दछ । *Karathian @ 2ml/l* या *water and Bavistin @ 2gr/l* या *water at soon the disease noticed.*

२) *Alternaria* (पातको थोप्ले रोग): *Pythium spp* *sclerotium spp.*

रोकथाम: *Bavistine* (वेवस्टिन)/डेरोसाल २- ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

Root rot: यो चुकन्दरको जरा कुहिन्छ । माटोको सतह वा तल डाँठमा भालो चिन्ह हुन्छ र मास्तिर फैलिन्छ ।

भिर्पोट (ट्राइकोडर्मा):

- ५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा नर्सरी ब्याडमा ४० वर्गमिटर क्षेत्रलाई उपचार गर्नु पर्दछ । (*Pellicularia filamentosa*).
- बीउ छर्नु अगावै सुख्खा बीउको उपचार गर्दा ४-६ ग्राम/के.जी.का दरले प्रयोग गर्ने । पहिला धुलोलाई १० एम.एल./लिटर पानीमा मिसाउने र प्रति के.जी. बीउको उपचार गर्ने ।
- २०० ग्राम निर्योटाई १५ - २० लिटर पानीमा मिसाई ।
- २.५ के.जी. निर्पोट पुनः २५० के.जी. पाकेको मल प्रति हेक्टरका दरले प्रयोग गर्ने ।

३) गाजर कुहिने रोग (Soft Rot): *Erwinia Carotovar* pv. *Carotovar* *atrosepida*. यो ब्याक्टिरियाले जगार, मुला बाहेक आलु, काउली र बन्दा समेतमा रोग उत्पन्न गर्दछ ।

लक्षण: जराको केहि वा पुरै भाग नरम र कुहिएको गुदी पिण्डमा परिवर्तन हुन्छ ।

रोगको श्रोत: माटोमा कुहिएको विरवाको अवशेषहरू तथा खेतीबारीमा घाउ भएको अववा खोसिएका जराभा अक्रमण गर्दछ । यो रोग बढी चिस्यान भएको माटोमा उच्च तापक्रमले सङ्गनमा सघाउँछ ।

नियन्त्रण: बीउ उपचार गरेर तथा बेक्स्टिन १ - २ ग्राम/लिट्र पानीमा स्ने गर्ने ।

४) सलगम कालो भएर कुहिने रोग (*Xanthomonas sampestris*): यो रोग सलगमको अति खतरनाक रोग हो । यो ब्याक्टिरियाबाट उत्पन्न हुन्छ । यो रोग लागेमा सलगम सङ्गे, कुहिने भएर जान्छ ।

रोकथाम: *Copier*, नागरस, *Blix-५०*: २ ग्राम/लिट्र पानीमा बोट र माटो भिजे गरी स्ने गर्ने ।

५) चुकन्दरको पात थोप्ने रोग: *Cercospora beticola* *cacc* (सरकोसपोरा बोटिकोलोआ काक) बाट उत्पन्न हुने थोप्ने चुकन्दरको सबभन्दा मुख्य रोग हो । यो गाजरमा पनि लाग्छ ।

लक्षण: पातमा ससाना खैरा थोप्पाहरू देखिन्छ । थोप्पाको बीचमा खरानी र किनारामा गाढा खैरो रङ्ग हुन्छ ।

श्रोत: विरवाको अवशेष बाँच्छ, प्रारम्भिक जडका रुपमा काम गर्छ । पातको सतहको दागहरूमा दुसीका जीवाणुहरूलाई हवाले उडाएर लगे गर्दछ । जीवाणुहरू बीउबाट पनि सर्दछ ।

रोकथाम: शाहरस २.५ ग्राम/के.जी.मा बीउ उपचार गर्नु पर्दछ । यो रोगको दुसी लट्टे, वेधे जातको बालीमा बाँचिरहने हुनाले यी विरवाहरूलाई खेतबाट हटाइयो भने फाइदा नै हुन्छ ।

६) गाजर पहेँलिन *MLO* रोग: यो रोग माइकोप्लाजमा क्लोरोजिनस कलिसटेफी होल्मस बाट उत्पन्न हुन्छ । यो *MLO* वयस्क फडके किराहरूको शरीर र बहुवर्षीय आश्रयदाताहरू (बालीहरूमा) निश्चल हुन्छ । यो रोग लागेका विरवाका पातहरू फडके किराहरूले खान्छन् भने १० दिन पछि तिनीहरूले अर्को विरवाको पातमा रोग सार्न सक्ने हुन्छन् । यो किराले आक्रमण गरेपछि १० दिन वा सो भन्दा बढी समयमा लक्षण देखिन्छ ।

नियन्त्रण: नियमित खेतबारी निरीक्षण, झारपात गोडभेल, मालथिन ०.५%, मेटासिस्टक ०.०२५% घोल/लिट्र पानीले प्रत्येक हप्तामा स्ने गर्ने ।

७) गाजरको मोज्याक: यो रोगको लक्षण अन्तर्गत विरवा गुलाफको फुल आकारको जस्तो हुने, एकदमै नबढ्ने, रङ्ग विरङ्गको हुने तथा पहेँलिन हुन्छ ।

श्रोत: यो रोग जंगली गाजरमा रहिरहन्छ र यसलाई लाही किराहरूले सार्ने गर्दछ ।

नियन्त्रण: साइपरमेथ्रिन २ एम.एल./लिट्र वा पानी प्रत्येक १५ दिनमा स्ने गर्ने ।

**घर/भान्साको खेर जाने पानी
करेसा वारीमा लगाऔँ ।**

११०. गोलभेंडा तथा भन्दा खेती

गोलभेंडा खेती: यो व्यावसायिक तरीकाले खेती गरिन्छ । यसलाई रचिकर, स्वरिष्ट र आयुमुलक बाली मानिन्छ । यो तराई देखि पहाड सम्म लगाइन्छ । यो अचार, सस, सलादका रुपमा र यसमा भिटाभिन बी र सी पाइन्छ । गोलभेंडा झोग नजाने (होचो), हल्का झोग जाने र प्रशस्त लहरा जाने गरी ३ किसिमका छन् ।

हावापानी: यो बाली न्यानो हावापानी भएको ठाउँमा लगाइन्छ । तुषारो खान सक्दैन । यो १८ - २७°C को तापक्रममा सफलतापूर्वक खेती गर्न सकिन्छ । ४२°C भन्दा माथि फुल झर्ने र १०°C भन्दा कममा पनि वृद्धि विकास रोकिन्छ ।

माटो: बलौटे देखि चिन्ट्याइलो माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । पानी नजान्ने, चिस्यान रहने, प्राञ्जरिक पदार्थ प्रसस्त भएको हलुङ्गो माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ ।

बाली लगाउने समय:

- तराईमा असाढ - श्रावण र पौष/साघमा टनेल भित्र ।
- पहाडमा माघमा टनेल भित्र र फागुन-चैत्रमा बाहिर ।

जातहरू:

- रोमा: बढ्ने, पात धेरै हुने, अगोटे जात, फल लामा र राता, धेरै फल सख्या र तराई देखि पहाड सम्म लगाइने ।
- रुपाली: होचो, चाडै पाक्ने, फल गोला र राता रङ्गका हुने, ओइलाउने रोग सहने, सुख्खा मौसममा लगाउन सकिने ।
- वैशाली: हाडब्रीड, चाडो पाक्ने, ओइलाउने रोग सहने, ३५°C सम्ममा खेती गर्न सकिने, अर्लि र लेट दुवै समयमा हुने ।
- पुसास्वी: लहरे, अगोटे, ६०-६५ दिनबाट उत्पादन शुरु हुने, चेन्टो फल, अभिलो स्वाद आदि ।
- मन प्रेकश: अग्लो लहरे, पाकेपछि फल रातो, ८०-९० दिनमा फल्ने, गोली र अभिलो स्वाद, उत्पादन ज्यादा दिने ।
- नविन: अर्ली जात, मध्यम बोट, फल गोलाकार, ओइलाउने रोग सहने, गर्मीमा पनि लगाउन सकिने साथै अन्य जातहरू रश्मी, मनिषा, अविनाश-१, बी.एस.एस.-२०, नविन-२०००, एन.सी.एल.-१ आदि ।

नर्सरी व्यवस्थापन: पानी नजान्ने, पुराना बोट विरुवा नभएको, खुकुलो दोमट, प्राञ्जरिक पदार्थ प्रशस्त भएको, माटो मसिनो बनाई १५ से.मी. उचो ड्याड बनाउने । आवश्यकतानुसार विरुवाको सुरक्षाका लागि नर्सरी घरको व्यवस्था गर्ने । नर्सरी जमिन तयार गरिसकेपछि थिरम, क्यारटान, मेन्कोजेव फिलोक्सील आदिले माटो उपचार गरी लाइनमा पातलो किसिमले बीउ रोपण गर्ने । आवश्यकतानुसार सिंचाई दिने, रोग तथा किरा लागे विषादीहरूको प्रयोग गर्ने ।

बीउ दर: १० - १५ ग्राम/का हाडब्रीड भए सो भन्दा पनि कम ।

रोप्ने दुरी: विरुवा जर्बराएर रोप्दा राम्रो हुन्छ ।

- पुसा स्वी ६०x६०Cm
- पुसा अर्लि डवार्फ ६०x६०Cm
- रोमा ६०x४५Cm
- मन प्रेकस ७५x६०Cm
- अविनाश-२ ९०x७५Cm वा सो भन्दा पनि बढी गर्न सकिन्छ ।
- नविन-२००० ९०x७५Cm वा सो भन्दा पनि बढी गर्न सकिन्छ ।

मालखाद: प्रशस्त गोबर मल, प्राञ्जरिक मल ७००-८०० किलो ग्राम सम्म गरिया ५ कि.ग्रा., डि.ए.पी. ५ कि.ग्रा. र पोटास ४ कि.ग्रा./का ।

भिचार्य: माटोको चिस्यानका आधारमा सिंचाई गर्ने । १०-१५ दिनको फरकम र आवश्यकता अनुसार माटोको आधारमा सिंचाई गर्ने ।

गोडमेल: आवश्यकता अनुसार र सामान्यतया १-१.५ महिनामा गोडमेल गर्ने माटो खुकुलो बनाउने, झारपात आएमा, निकाल्ने काम नियमित गर्नु पर्दछ ।

पाका (टेका) दिने: अग्लो जातका गोलभेंडालाई थोक्रा दिनु पर्दछ । बो भन्ने मुना नियन्त्रण गरी फल लाग्ने मुनालाई थोक्रो दिने । थोक्रामा चढाउ थोरी वा अन्य काठको सहायता लिनु पर्दछ ।

बाली टिप्ने उत्पादन: नजिकको बजारमा बेच्नु छ भने राम्ररी पाके परि टिप्ने र अलिक टाढा पुर्‍याउनु पर्ने भए राम्ररी छिप्पीएको र अलि अलि रात हुँदा बाले पछि टिप्नु पर्दछ ।

उत्पादन: प्रति का ७००-१२०० कि.ग्रा. उत्पादन लिन सकिन्छ ।

१११. गोलभेंडाको रोग तथा किरा र तिनको नियन्त्रणका उपायहरू

गोलभेंडाको फलमा लाग्ने गबारो (Tomato Fruit Borer): यसले टमाटरका गोहोरूमा बाहिरबाट छेडेर खान्छ र यस्ता फलहरू कुहिन थाल्छन् । यस प्रकारको चार अवस्था हुन्छ: फुल, लार्वा, अवल अवस्था र वयस्क ।

विशाम:

- गोलकार जातहरूमा यो किरा कम लाग्छ ।
- Sex Hormones को प्रयोग गरेर भाले किराहरू समात्ने । फुल वा मसिना लार्वाहरू देखिनासाथ निम्न पदार्थको प्रयोग गर्ने: NPV १०० LE १ एम.एल. वा थायलेड (Bacillus thuringiensis) १ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।
- निम्मा आधारित किटनाशक पदार्थहरू जस्तै: निमको डिजलको झोल, मारगोसोम (Margosom), नीमारिन (Nemarin), नीमाकल (Nemacol) आदि १.५ml प्रति लिटर पानीमा राखेर छर्ने ।
- निम र पाइरेथ्रोइड समुहका विषादी (साइपरमेथीन, डेल्टामेथीन) र एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

रातो पछैटे डडुवा रोग (Late Blight): यो रोग धेरै जसो आलु, गोलभेंडामा पर्छ । यो रोग *Phytophthora infestans* भन्ने दुसीबाट हुन्छ । यो रोगको लक्षण चिसो मौसम र ८० प्रतिशत भन्दा बढी सापेक्षिक आर्द्रता भएको बेला लक्ष्य उपयुक्त वातावरण मानिन्छ । खास गरी डडुवा रोगको प्रकोप बढ्नुको साथै ४ वटा मुख्य अवस्थाको आवश्यकता पर्दछ:

- कमसेकम चार घण्टा सम्म रातमा शित परेको
- कमसेकम १००°C वा सो भन्दा अलिकति माथिको न्यूनतम तापक्रम भएको
- भोली पल्ट बाढल लागेमा
- २४ घण्टा भित्र अलिखलि वर्षा भएमा । यस्तो प्रकारको वातावरणले रोगलाई महामारीको रूपमा फैलाउँछ । २४ घण्टा भित्रै जम्दै बाली सखाप हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।

विशाम: तथाकथक अनुसार गोलभेंडाको डडुवा रोग नियन्त्रणको लागि डाइजेन ५० र ब्लाइटक्स-५० को संयुक्त मिश्रण ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा १० दिनको फरकमा बोट भिजे गरी छर्नुपर्ने रोग नियन्त्रण गर्न सिद्ध भएको छ ।

२) ओइलाउने रोग (Bacterial Wilt): यो रोग *Pseudomonas solanacearum* भन्ने ब्याक्टेरियाबाट लाग्दछ । यो रोग लागेको बीउ साना र चाउरी परेको हुन्छ । यो रोग लागेको बोटहरू पुरै आइलाउँछ । शुरुमा बोट सानो, पातहरू तल तिर फर्कने हुन्छन् । यो रोगको मुख्य लक्षण नै रोग लाग्ने बित्तिकै बोटहरू ओइलाउने र छिट्टै मर्ने हुन्छन् ।

रोकथाम: घुम्दै बाली लगाउने । यो रोग लागेको ठाउँमा २/३ वर्ष सम्म यस समुहका तरकारी बाली नलगाउने । यसको सट्टा अन्न बाली, दाल बाली लगाएमा यो रोगको ब्याक्टेरिया निर्मूल हुँदै जान्छ:

- रोगी बेर्ना सार्नु हुँदैन र यस्तो रोग लागेको बालीबाट बीउ उत्पादन गर्नु हुँदैन ।
- १/२ वटा बोटहरू ओइलाएको देखिने बित्तिकै बोटलाई उखेलेर जलाइ दिने र १० इन्च गहिरो माटो सहित निकालेर तातो पानीमा राखी फ्याक्ने ।
- रोगी जग्गाबाट निरोगी जग्गामा सिँचाई गर्नु हुँदैन ।
- बीउको उपचार: एग्रोमाइसिन १ ग्राम प्रति १० लिटर पानीमा राखेर बीउलाई रोप्नु भन्दा पहिले भिजाउने ।

३) गोलभेंडाको गुजमुजे विषाणु रोग (Tomato Mosaic Virus Disease): यो रोगको जीवाणु Tomato Mosaic Virus हो । जमिन माथिको आकार बिग्रिएको वा ऐठिदै नराप्नो भएको देखिन्छ । पातहरू बढी टाटेपाङ्ग्रे वा हरियो र हल्का खिरबिरे हुन्छन् । पातहरू गुजमुजिन्छ । डाँठमा काला काला धर्साहरू देखिन्छ । यस्ता डाँठहरू सजिलै सँग पिटमिट भिँचिन्छ । रोगी बोटमा फल कम लाग्छ ।

रोकथाम: यस्तो रोग देखिने ठाउँमा गोलभेंडा तथा सुती नलगाउने:

- विषाणु रहित बीउ छर्नु पर्दछ ।
- झारपात उखेलेर जलाइ दिने ।
- रोगी बोट देखिने बित्तिकै उखेलेर जलाइ दिनु पर्दछ ।
- यो रोग लागेको बोटबाट बीउ उत्पादन गर्नु हुँदैन ।
- किराले पनि सार्ने हुनाले किरा देखिएमा किटनाशक विषादी छर्ने ।

भन्टा खेती: भन्टाको खेती तरकारीका लागि गरिन्छ । यसको उत्पत्ति एशिया महादेशमा विशेषत चीन, नेपाल र भारतको गर्मी क्षेत्र मानिन्छ । यसमा भिटाभिन ए, बी, सी तथा क्याल्सीयम, फस्फोरस र फलाम जस्ता खनिज तत्व एवं प्रोटीन समेत पाइन्छ । तरकारी तथा भर्ता खाइने गरिन्छ ।

हावापानी: तराई देखि पहाड सम्म खेती गर्न सकिने, हिउँ र तुषारो सहन नसक्ने, सामान्य तापक्रम १०°C भन्दा तल र ३५°C भन्दा माथिको तापक्रममा यसको वृद्धि रोकिन्छ । बोटको वृद्धि राम्ररी हुन २३-३२°C र बीउ उम्रन २३-२८°C को तापक्रम चाहिन्छ । १७°C भन्दा तल र ३५°C भन्दा माथिको तापक्रममा फल लाग्न सक्दैन ।

माटो:

- सबै माटोमा लगाउन सकिन्छ ।
- दोमट र चिम्ट्याइलो दोमट माटोमा राम्रो हुन्छ ।
- अगौटलाई हलुङ्गो र अरु बखतमा पानी अडिने खालको चिम्ट्याइलो दोमट माटोमा उत्पादन बढि हुन्छ ।
- माटो गहिरो, मलिलो, पानी नजम्ने, निकासको व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ ।

जातहरू

क) पुसा पर्पल लड्ड: अगौटे जात, ५०-६० दिनमा फल्ने, उचाई मध्यम, पात र डाँठमा काँडा नभएको हल्का हरियो, फल प्याजी रङ्गको, लाम्चीलो २०-२५ से.मी. लामो र ४ से.मी. गोलाई ।

ख) नुकी:

- मध्य सिजन, ६०-७० दिनमा फल तयार हुने ।
- बोट मध्यम, लामो(अरलो) हुने ।
- पात, डाँठ र फलको रङ्ग गाढा प्याजी हुने ।
- झुप्यामा फल्ने, फलको लम्बाई १५-२५ से.मी. हुने ।
- उत्पादन ज्यादा दिने ।

ग) पुसा क्रान्ती: अगौटे जात, ६० दिनमा फल टिप्न सकिने, पात र डाँठको रङ्ग हरियो, फल गाढा प्याजी र १५-२० से.मी. लामो र एकनासको हुन्छ ।

घ) पुसा कलस्टर:

- मध्य यामको जात, ६०-७० दिनमा फल दिने ।
- पातको तल र डाँठमा काँडा हुने ।
- फल १० से.मी. लामो र ३-४ से.मी. गोलाई ।
- फलको रङ्ग प्याजी र झुप्यामा फल्ने ।

ङ) सर्लाही गीन: पछौटे जात, ८०-९० दिनमा फल तयार हुने । फल, पात, डाँठ हल्का हरियो, बोट अरलो, ज्यादा उत्पादन, फल ठुला र लामा २५-३५ से.मी. लामा र ६-१० से.मी. मोटा ।

बेर्ना उत्पादन:

- जमिनको तथ्यी: ४-५ पटक खनजोत गर्ने, सम्पाउने ।
- बीउ दर: १०-२० ग्राम/का (२ वर्ग मिटरको बीउ/काका लागि)

बेर्ना सार्ने: ४ - ६ हप्ते बेर्नाहरू सार्ने सकिन्छ ।

सम्पाउने दुरी:

जात	स्थान	दुरी
सर्लाही गीन, नुकी, पुसा क्रान्ती	अरलो जात	७५ x ४५ से.मी.
पुसा पर्पल लड्ड, पुसा कलस्टर, सौरभ	मध्यम र होचो	६० x ४५ से.मी.

लगाउने समय:

बीउ रोप्ने	बाली टिप्ने
भाद्र - असोज	मंसिर - फागुन
माघ - फागुन	वैशाख - फागुन

मलबाद: गोबर मल ८०० कि.ग्रा., युरिया ३ कि.ग्रा., डि.ए.पी. ३ कि.ग्रा., पोटास २ कि.ग्रा./का ।

सिंचाई: हिउँदमा १०-१५ दिनमा, गर्मीमा ७-१० दिनको फरकमा र माटो मौसमका आधारमा सिंचाई गर्नु पर्दछ । सिंचाईको राम्रो व्यवस्था हुन नसके फल फुल्दैन र वृद्धि विकास बन्द हुन्छ ।

गोडमेल: बोटको वृद्धि दरका लागि माटो नरम हुनु पर्दछ । २०-२५ दिनमा पहिलो पटक, ४०-५० दिनमा दोश्रो पटक गोडमेल गरी झारपात पन्छाउने र अरु बेलायामा पनि आवश्यकता अनुसार गोडमेल गर्ने ।

फल टिप्ने:

- फलको वृद्धि राम्ररी भैसके पछि कलिलै अवस्थामा टिपी, बजारमा बिक्रीका लागि नैजाने ।
- फल टिप्दा डाँठ (भेट्ने) र डाँठ संग रहेको क्यालिक्स समेत सँगै टिप्ने
- फल टिप्दा, बोट हागाहरू नभीचिने गरी कैचीले काटेर टिप्नु पर्दछ ।

उत्पादन: १००० - १५००० कि.ग्रा./का तर समय र जात अनुसार फरक हुन्छ ।

११३. भन्टाभा लागने रोग तथा किरा र तिनको नियन्त्रणका उपायहरू

किराहरू

क) भन्टाको मुना तथा फलको गबारो (Brinjal shoot and fruit borer): यसको चार अवस्था हुन्छ । वयस्क, फुल, लार्भा र अचल अवस्था ।

क्षतिको प्रकार: लार्भाले भन्टाको कलिला मुना र कलिला फलमा आक्रमण गर्दछन् । कलिला फल भित्र पसेर धिनले गुदी खान्छन् । यसरी धिनले क्षति पुऱ्याएका फलहरू खन लायक हुँदैनन् । कलिला डाँठको बोक्रा भित्र पसेर धिनले खान थाल्दछन् र परिणाममा आक्रमण भएका मुना ओइलाउँदै गएर मर्दछन् ।

रोकथाम:

- यो किरा लागेर ओइलाएका मुनाहरू हातले चिमोटेर नष्ट गरिदिने ।
- यो किरा लागेका कलिला फलहरू तुरन्तै नष्ट गरि दिने ताकि लार्भारूले अरु फल नोक्सान गर्न नपाउन् ।
- भन्टाको निम्न जातहरूमा यो गबारो कम लाग्छ: पुसा पर्यल लइ ।
- कुनै पनि किटनाशक पदार्थहरूले यस किराको राम्रो नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । अतः अरु बालीमा विषादीको प्रयोग नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
- यो किराले भाले पुतलीलाई आकर्षण गर्ने यौन जन्य पदार्थ (Sex Pheromone) वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाई त्यसमा काम भैरहेको छ ।

ख) भन्टाभा पात बेल्वा (Brinjal Leaf Roller): यसका चार अवस्थाहरू हुन्छन्: वयस्क, फुल, लार्भा र अचल अवस्था ।

क्षतिको प्रकार: लार्भारूले भन्टाको कलिला पातहरू रेशमी धागोले बेरेर त्यस भित्र बसी खान्छन् । यसले धेरै जसो कलिलो मुनाका पात बेर्दछन् ।

रोकथाम: बेरेका पातहरू उधारी तिनमा रहेका लार्भारू नष्ट गर्ने ।

ग) भन्टाको पातमा जालो बनाउने किरा: यसका चार अवस्था हुन्छन्: फुल, लार्भा, अचल अवस्था र वयस्क ।

क्षतिको प्रकार: यस किराका लार्भारू समुहमा बसेर भन्टाका एक भन्टा पातहरू बेरेर तिनी भित्र बसी खान्छन् ।

रोकथाम: देखिए जति जालोहरू हटाई तिनमा रहेका लार्भारू नष्ट गर्ने ।

रोग

क) भन्टाभा लागने डडुवा र फल सड्ने रोग (Phomosis Blight and Fruit Euphlant): यो रोग हुसीजनक जीवाणु Phomosis Vexans बाट हुन्छ या Euphlant): यो रोग हुसीजनक जीवाणु Phomosis Vexans बाट हुन्छ । यो जीवाणु भन्टा खेतीको लागि ज्यादै नै खतरनाक भएको देखिन्छ ।

लक्षण: शुरुमा जमिनको माथितिर रहेको डाँठको वरपर रोगको हुसीह घेरेको हुन्छ । बेर्ना अवस्था देखि नै रोगको लक्षण देखा पर्छ । बेर्नामा साना काला खैरा दागहरू देखिन्छन् । विस्तारै विस्तारै यी बेर्नाहरू कम हुँदै सुक्दछ । पातमा मसिना खैरा धब्बाहरू देखिन्छन् र पछि धिनीहरू बन्दै गएर एक आपसमा जोडिएर पुरै पात झर्दछ । जमिन सतह माथि रहेको भण्डारहरूमा यस रोग द्वारा आक्रमण गर्दछ । डाँठमा पनि काला धोस्वाहरू देखिन थाल्छन् । अन्तमा भन्टाको ठुला ठुला फलहरूमा यस रोगको धोस्वाहरू प्रशस्त देखिन्छन् । रोग प्रष्ट जग्गाहरूमा बोटहरू कालो डाँठ र फलहरू फटाफट कुहिन थाल्दछन् ।

रोकथाम:

- खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार
- रोगी बीउ रोप्नु हुँदैन ।
- रोगी बोटहरू, क्षारपातहरू उखेलेर खाडलमा राखी जलाई दिनु पर्दछ ।
- भन्टा लगाउने जग्गा गहिरो गरी खनेर २/३ दिन घाममा सुक्न दिनुपर्दछ ।
- घुम्ती बाली प्रविधि अपनाउने ।

रासायनिक विषादीको प्रयोग: रोगनाशक विषादी जस्तै: डाइथेन एम-४५ हाईट्रस-५० - २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखी १०/१२ दिनको फाट्ट पटक सम्म छर्ने ।

ख) जुकाद्वारा जरामा गाँठा बनाउने रोग (Root Knot Nematode Disease): यो रोगको जुका सोलानेसी परिवार, क्रुसीफेरी र फसी तरकारी समुहमा तरकारी बालीमा लाग्दछ । यो मेलोइडोग्ने इन्कोग्नाटा (Meloidogyne Incognita) जुकाबाट लाग्दछ । साधारणतया जुकाको आक्रमणद्वारा जरामा गाँठा

देखा पर्दछन् । ती गाढाहरूले गर्दा विरवाले आवश्यक खाद्यान्न, पानी सोसेर लिन नसकी विरवा पहेलिएर ओइलाउँछ । विरवा छोटा र पुड्का देखिन्छन् । जसमा विभिन्न गाढाहरू देखिन्छन् र विरवा कमजोर भै मर्दछ ।

रोकथाम:

- खेती प्रणालीमा सुधार
- यो जुका लाग्ने ठाउँमा गोलभेडा वा सोलानेसी परिवारको कुनै पनि तरकारी नलगाउने । कभिसमा २/३ वर्ष अरु वाली मर्कै, जुनेलो, गुह्रु जस्ता वाली लगाउनु पर्दछ । यसले गर्दा जुकालाई खानाको अभाव भई मर्दछ ।
- सुयमुखी, सयपत्री जस्ता कडा बास आउने फुलको बोटहरू रोप्नाले जुकाहरू निखिदै जान्छ ।

रासायनिक विषादीको प्रयोग: जुका नाशक विषादीहरू प्रयोगमा ल्याउनको लागि हल्लेका स्थितिमा महशुस र कठिनाईले गर्दा कुनै किसिमको जुका नाशक विषादीहरू सिफरिस गरिएको छैन । ५ फार्मालडीहाइड द्वारा १५ से.मी. सम्म गहिरो माटोमा भिजाउन सकेमा पनि जुका नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

मल्लार्ड शुपारेर घामको रापले नष्ट हुन नदिऔं ।

खुर्सानी

किरा:

१) खुर्सानीको थिप्स (Chilli Thrips): यो किरा निकै सानो हुन्छ । यसको रङ हल्ला पहेलो हुन्छ । वयस्कको पछेटा धेरै ठाउँमा च्याटिएको केराको पात जस्तो हुन्छ । थिनले विरवाको पातमा पहिले कोतर्दछन् र त्यही जम्मा भएको विरवाको रस चुस्छन् । यसरी कोत्रेको ठाउँमा खैरा धब्बाहरू देखिन्छन् । विरवाको पातहरू धेरै कोत्रेमा खुस्छन् ।

रोकथाम:

- निम्मा आधारित किटनाशक पदार्थ प्रयोग गर्ने ।
- Jhiodan र मिलिलिटर/लिट्र पानीमा मिसाएर छर्ने ।

रोग: फल कुहिले रोग (Fruit Rot या Chilli/Anthracnose या Chilli and Dieback): यो रोग Colletotrichum capsici भन्ने कुसीबाट हुन्छ । यस कुसीले पात, हागा, डाँठमा आक्रमण गरी शुरुमा काला देखिन्छ र पछि धब्बा बढ्दै गण्पछि पुरै बोट सुक्छ । यसले शुरुमा माथिको पात, डाँठ मर्दै आउँछ । कहिले काहीँ यो कुसीले फल लागेपछि आक्रमण गर्दछ । यस अवस्थामा साना दाग फलमा देखिन्छ । उक्त खैरो दाग बढ्दै गई पुरै फललाई कुह्याउँछ ।

रोकथाम:

- रोग मुक्त बीउ लगाउनु पर्दछ ।
- बेनी अवस्थामा दागहरू देखिएमा डाइथेन एम-४५, ब्लाइटक्स-४० र देखि ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्नु पर्दछ ।
- जग्गा बढी चिसो राख्नु हुँदैन ।

भिन्डी (Lady's Finger) वा रामतोरिया

किरा

क) रामतोरियाको मुना र फलको गबारे (Okra Shoot and Fruit Borer): यसका चार अवस्था हुन्छन्: फुल, लार्वा, अचल अवस्था र वयस्क । लार्वाहरू

विरवाको मुना, कोपिला र फुल छेडेर भित्र पसे पछि खान थान्छन् । यसले गर्दा कलिला डाँठहरू ओइलाएर मर्दछन् ।

रोकथाम: गबारी लागेको रामतोरियाको मुना र फलहरू जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।

ख) कपासको पात बेरवा (Cotton Leaf Roller): यसका चार अवस्था हुन्छन्: फल, लार्भा, अचल अवस्था र वयस्क । लार्भाहरूले रामतोरियाको पातहरू बेरेर भित्र बसी खान्छन् । यो किराको संख्या धेरै भएमा विरवाहरू नाई देखिन्छन् ।

रोकथाम:

- यो किरा लागेको पातहरू जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
- निममा आधारित किटनाशक पदार्थको प्रयोग गर्ने ।

ग) कपासको रातो चुसाहा ढुङ्गम ऋयततयल द्दानन: यसका तीन अवस्था हुन्छन्: फुल, बच्चा र वयस्क । यस किराको माउ र बच्चा दुवैले छिपिएका फलहरूमा खास गरी बीउबाट रस चुस्छ । यसरी यो किराले आक्रमण गरेको बीउहरू काम नलाग्ने हुन सक्छन् ।

रोकथाम:

- यो किराको माउ र बच्चालाई जम्मा गरी मार्ने ।
- निमहरूबाट बनेको विषादी प्रयोग गर्ने ।

घ) कपासको फडके (Cotton Jassid): यसका तीन अवस्था हुन्छन्: फुल, बच्चा र वयस्क । बच्चा र वयस्क दुवैले पातबाट रस चुस्ने क्रममा आफ्नो च्याल पनि विरवाको रसमा छाड्छ । यसले विरवामा विषको काम गर्दछ, जसले रामतोरियाका पातहरू पहेँलिन्छ र तल तिर फर्कन्छ । यो किरा अति लागेको अवस्थामा खेतबारीका सम्पूर्ण विरवाहरू डढेको जस्तो देखिन्छ ।

रोकथाम: निममा आधारित किटनाशक विषादीहरू प्रयोग गर्ने ।

रोग:

- जरामा गाँठा बनाउने जुका (Root Knot of Okra),
- Yellow Vein Mosaic of Okra,

- ओइलाउने रोग (Fusarium wilt of Okra): यो रोग *Fusarium oxysporium* भन्ने ठुसीबाट हुन्छ । विरवा बढ्न थाले पछि यो ठुसिले आक्रमण गर्दछ । यो रोग लागेपछि बोट पहेँलिने, नबढ्ने र ओइलाउने हुन्छ । अन्तमा विरवा मर्दछ ।

रोकथाम:

- २ ग्राम बेभिन्टीनले प्रति के.जी. बीउ उपचार गर्ने ।
- घुस्ने बाली अपनाउने ।
- झारपात र रोगी बोटहरू हटाई जलाउने ।

क्रोफर्सी समुहका तरकारी

किरा

१) फल कुहाउने झिझा (Pumpkin Fruit Fly): यस किराको चार अवस्था हुन्छन्: फुल, लार्भा, अचल अवस्था र वयस्क । पोथी झिझाले आफ्नो तिखो फुल पार्ने अङ्गले विरवाको कलिला भागहरू डाँठ, फुल वा फलमा छेडेर तिन भित्र फुल पार्दछ । यी फलहरूबाट मसिना औँसा निस्की भित्र भित्रै खान थान्छ र कुहिन्छ ।

रोकथाम:

- यो झिझा लागेर सडेका विरवा, त्यसका भागहरू वा फलफुल जम्मा गरी खाल्डोमा गहिरा गरी पुरिदिने ।
- यो झिझाको भालेलाई क्यु-लियर नामक पदार्थको पासोमा थापी तिनको गतिविधि अध्ययन गर्ने ।
- भाले झिझाहरू गुलियो पदार्थ मन पराउँछन्: पानीमा अलिकति चिनी, महु, सक्कर राखी त्यसमा मालशिन झोल १ मि.ली./लिटर पानीमा भिसाईदिने र यो बाली लगाएको ठाउँमा छर्ने । अब गुलियो झोल चाट्न थाल्छ र किरा मर्दछ ।
- यी झिझा काँक्रा, फर्सीका फलको गन्धले आकर्षित हुन्छ ।

भाले: काँक्रा, फर्सी समुहका बालीहरूमा बीच/बीचमा १ मिटर अग्लो टाँडमा माटोको कटारीमा पार्केका फर्सी, तर्बुजाको टुक्रा राख्ने र अलिकति पानी राखी ५-७ थोपा मालशिन झोल विषादी भिसाई दिने र ठाउँ-ठाउँमा राख्ने । यसको गन्धले त्यस ठाउँमा बरिपरि झिझाहरू आउँछन्, फलका टुक्रा खान्छन् ।

र किराहरू मर्दछन् । यसरी राखिएका फलका टुक्राहरू ३/४ दिनमा फेरिरहनु पर्दछ ।

२) कौका फर्सीको रातो खपटे (Red Pumpkin Beetle): यसको चार अवस्था छन्: फुल, लार्वा, अचल अवस्था र वयस्क । लार्वाले विरवाको जरा भित्र पसेर खान्छ । साथै जमिनको सतह छोएको पातको डोठ र फलमा पनि भित्र पसेर खान्छ । वयस्क खपटेले पातको हरियो पदार्थ कोत्रेर खान्छ । पिनले पात अर्ध गोलाकार बनाएर खान्छन् ।

रोकथाम:

- वयस्कलाई हते जालीले समातेर मार्ने ।
- निम्मा आधारित किटनाशक पदार्थले यसको नियन्त्रण गर्दछ ।
- यसको प्रकोप अति भएमा मालाशिन र मि.ली./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

३) थोप्ने खपटेहरू (Spotted Beetles): पिनका चार अवस्था हुन्छन्: फुल, लार्वा, अचल अवस्था र वयस्क । लार्वा र वयस्क दुवैले विरवाको पातको हरियो भाग कोत्रेर खान्छ । पिनको संख्या बढी भएमा विरवालाई नाशो पार्दछ ।

रोकथाम:

- यी किराका लार्वा र वयस्क जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
- निम्मा आधारित किटनाशक पदार्थको प्रयोग गर्ने ।

रोगहरू:

क) डाउनी मिलड्यु रोग (Downy Mildew Disease): यो रोग *Pseudoperonospora cubensis* नामक दुसीबाट हुन्छ । शुरुमा रोगले आक्रमण गरेको पातको माथिल्लो भागमा पहेलो थोप्पाहरू देखिन्छ । पातको उल्टो पट्टी कैलो कालो रङ्गको दुसी देखिन्छ । रोग लागेका पातहरू सुक्न थाल्छन् ।

रोकथाम:

- घुम्ती बाली प्रणाली अपनाई फर्सी तरकारी बालीको ठाउँमा अरु बाली लगाउने ।
- खेतबारी सफा सुगहर राख्ने, झारपात र पुराना बोट उखेली नष्ट गर्ने ।
- बेभिस्टिन २ ग्राम/के.जी. बीउ उपचार गर्ने ।
- डाइथेन एम-४५, २ ग्राम/लिटर पानीमा वा बेभिस्टिन २ ग्राम लिटर पानीमा मिसाई १० - १२ दिनको फरकमा ३ पटक सम्म छर्ने ।

ख) सेतो धुले दुसी रोग (Powdery Mildew Disease): यो *Erysiphe cichoracearum* नामक दुसीबाट हुन्छ । शुरुमा पातको माथिल्लो सतहलाई सेतो वा खैरो रङ्गको थोप्पा देखिन्छ । पछि रोग बढी लागेमा पात तल पट्टी सतह र डाठमा खरागी जस्तो धुलो देखिन्छ । पातहरू पहेलि घुमिरिन्छ र मर्दछ ।

रोकथाम: झारपात र पुराना बोट बटुलेर जलाउने तथा खेती बारी स राख्ने । क्याराथेन झोल १ मिलि लिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई १०/१२ दिनको फरकमा छर्ने ।

ग) गुजमुज्जे रोग: यो रोग *Cucumber mosaic virus* नामक विषाणुव हुन्छ । ६ हप्ता पछि बोटमा पहेलो रङ्ग भइसकेको धब्बाहरू देखिन्छ । पातहरू घुमेका र तल माथि उठेका हुन् । साधारणतया पातहरू तल फर्किन्छ । बोट नबढ्ने, डाठ छोटो हुने र फुल तथा फल सानो हुने हुन्छ ।

रोकथाम: स्वस्थ बीउ लगाउने र खेती बारी सफा राख्ने । रोगी बोट देखि भित्तिकै उखेलेर फाल्ने ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,
कृषि सेवा केन्द्र, कृषि सेवा उपकेन्द्रमा
गार्ड आफना कृषि सम्बन्धी
समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस् ।

११४. गानो तरकारी समुहको खेती प्रविधि

प्याज

मुख्य यामको प्याज खेती

परिचय: प्याज गानोको लागि खेती गरिने तरकारी हो । यो सबै जसो तरकारीमा मिसाएर पकाउन सकिन्छ । अनादीकाल देखि प्याजको प्रयोग औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । प्याज श्वास फेर्ने गाह्रो भएमा, वाधमा, पाचन प्रक्रियामा, रघाबोकीमा, घाउ लागेमा र पोलेको ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा स्टाव, क्यालोरी, भिटामिन बी र सी पाइन्छ । प्याजको पिरापना यसमा पाइने अलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइ भन्ने इधर तेल हुनाले भएको हो । प्याजलाई तरकारी र मसला दुवै रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

हावापानी: प्याज चिसो मौसममा खेती गरिने तरकारी बाली हो । यसको बीउ $3-5^{\circ}\text{C}$ को तापक्रममा पनि उम्रन थाल्छ । तर राम्रो उमारको लागि $9-12^{\circ}\text{C}$ को तापक्रम राम्रो हुन्छ । शुन्य भन्दा तलको तापक्रममा यो पहुँचिन्छ र मर्दछ । प्याजको खेती $90-95^{\circ}\text{C}$ मा राम्रो हुन्छ । गानो लाग्न $9-12^{\circ}\text{C}$ को तापक्रम राम्रो हुन्छ । युरोपेली जातहरू लामो दिनमा र दक्षिणी जातहरू छोटो दिनमा मात्र प्रकाश अवधि पुरा गरी गानो लाग्दछ । प्याजको गानो लाग्ने समयमा प्रशस्त पानीको आवश्यकता पर्दछ ।

माटो: यसको खेतीका लागि प्रशस्त प्राज्ञारिक पदार्थ भएको खुकुलो माटो आवश्यक पर्छ । पि.एच. 5.5 देखि 6.5 सम्म हुनु जरुरी छ ।

वानस्पतिक विवरण: प्याजको बीउ रोपेको $90-95$ दिनमा उम्रन थाल्छ । उम्रदा बागिएर “??” जस्तो र पछि सोझो पर्छ । नयाँ पातहरू अधिलो पात भित्रबाट आउँछ । पातको फेदहरू आपसमा करिसेर डाँठ बन्दछ । डाँठको तल गानो लाग्दछ ।

जात: प्रचलित जातहरू रेड क्रियोल, पुसारेड, नासिक-५३, एग फाउण्ड डाक रेड, एग फाउण्ड लाइट रेड, नेपाली आदि हुन् ।

रोप्ने समय: प्याजको खेती गर्न तराई र पहाडी क्षेत्र ज्यादै उपयुक्त पाइएको छ । मसीरको अन्तिम साता देखि माघको पहिलो साता सम्ममा प्याजको बेना

सारी सक्नु पर्दछ । बेना तयार हुन झण्डै २ महिना लाग्ने भएकोले कार्तिकको शुरुमा बीउ रोप्नु पर्दछ ।

जमिनको तयारी: पानी नजम्ने, मलिलो, हल्का दोमट माटो प्याज खेतीको लागि उपयोगी हुन्छ । प्याज रोप्ने ज्याङ्ग एक/डेढ मिटर चौडा, 90 मिटर सम्म लामो, करीब 95 से.मी. अग्लो ढिलले घेरेको, पानी राम्ररी निच्चेर जाने क्यारी तयार गर्नु पर्दछ । २-३ पटक खनेर झार, ढुङ्गा आदि केलाई राम्रो पार्नु पर्दछ ।

मलखाद: प्रति रोपनी $80-90$ भारी वा $200-9000$ के.जी. राम्ररी पाकेको गोबर मल, 8.5 के.जी युरिया, 8.5 के.जी. डि.ए.पी. र 8 के.जी. पोटास जमिन तयार गर्दा राम्ररी मिलाउनु पर्दछ । प्रति रोपनी 8 के.जी. युरिया बेना सारेको 30 र 60 दिन पछि २ पटक गरी टपड्केस गर्नु पर्दछ ।

बेना तयारी र बीउ दर: ब्याडको लागि जोतीएको जमिनलाई २ पटक सम्म राम्ररी खनेर डल्ला फोर्नु पर्दछ । झार पातपतिङ्गर सबैलाई राम्ररी केलिएर पोलिदिनु राम्रो हुन्छ । बीउ उम्रनको निमित्त धुलो खुकुलो माटो हुनु पर्दछ । र्याङ्ग बनाउद 9 मिटर चौडाई र सुविधा अनुसारको लम्बाई बनाउनु पर्दछ । र्याङ्ग बढी चिसो रहने माटोमा 95 से.मी. उठेको र सुख्खा माटोमा बीचमा दबेको चारै तिर ढिल भएको हुनु पर्दछ । एक रोपनीको लागि 20 देखि 30 हजार बेनाको तयार गर्नु पर्दछ । यसको लागि 500 ग्राम राम्रो उमार शक्ति भएको बीउको आवश्यकता पर्दछ ।

ब्याडमा मलखादको प्रयोग: 9 मिटर चौडा, 5 मिटर लामो ब्याडमा करीब 90 के.जी. राम्ररी पाकेको गोबर मल जमिनको तयारी गर्दा राम्ररी माटोमा मिसिने गरी हाल्नु पर्दछ । प्रति 5 वर्ग मिटर ब्याडमा 50 ग्राम युरिया, 50 ग्राम डि.ए.पी. र 25 ग्राम प्युरेट अफ पोटास हाल्नु पर्दछ ।

बीउको रोपाई: बीउ रोप्नु भन्दा पहिले प्रति 9 के.जी. बीउलाई $2/3$ ग्राम बिषादी मिसाई बीउ र बिषादीलाई कुनै बटुमा टम्म बिको बन्द गरी राम्रोसँग हल्लाएर केही बेर राखी दिनु पर्दछ ।

बीउ छर्दा एक सानो छेस्कोले $90-95$ से.मी.को फरकमा धर्सा तानी २-३ से.मी. गहिरो सोझो कुलेसाहरू बनाउनु पर्दछ । हरेक धर्साहरू एक नास संग बीउ पर्ने गरी ढुढी आँला, माउ आँला र चारी आँलाले बीउ खसाल्नु पर्छ ।

बीउ रोपी सकेपछि बालुवा, धुलो, खुकुलो माटो र खरानी वा कम्पोष्ट मल १:१:१ भाग मिसाई बीउलाई छोपी दिनु पर्छ । १०-१५ दिन पछि जब बीउ टुसाउँछ, यी छोप्रो हटाइ दिनु पर्दछ । छोप्रो हटाएको २ दिन सम्म पानी दिनु हुदैन । मौसम र माटोको चिस्यान हेरी प्रत्येक दिन वा एक दिन बिराएर साँझ पख वा विहानै हजारिले पानी दिनु पर्दछ । उमेरको ५ देखि ७ हप्ता पछि बेर्ना सिसाकलमको आकारको हुन्छन् अनि खेतबारीमा सार्न लायक हुन्छ ।

बेर्ना रोपाई: लाइन देखि लाइनको दुरी २० से.मी. र बोट देखि बोटको दुरी १०-१५ से.मी. को फरकमा रोपाई गर्नु पर्दछ । यसरी बेर्ना सारे पछि नसरन्जेल सम्म माटोको चिस्यान हेरी दिनको २ पटक सम्म पानी दिइन्छ वा हलुका सिचाई गरिन्छ ।

गोडमेल र सिचाई: प्याजको जरा माथिल्लो सतहमा फिनिने हुँदा गहिरो गोडमेल गरेमा यो जरा नष्ट भई बातीमा असर पर्ने सम्भावना हुन्छ । प्याज खेतीमा सिचाईको प्रबन्ध गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसलाई खेतीको अवधि भर जलवायु र माटोको अवस्था हेरी ६-७ पटक सम्म सिचाई गर्नु पर्दछ ।

बाली संरक्षण

क) किरा

प्याजको श्विप्स: यो प्याजको सबै भन्दा विनाशकारी किरा हो । यसले गोलभेंडा, बन्दा, बाउली र कर्कोमा पनि आक्रमण गर्दछ । श्विप्स मसिना किरा हुन् । यिनका पखेटाहरू नरीबलका पातहरू जस्तै झल्लर परेका हुन्छन् । बच्चा र वयस्कहरू पात कोतेर खान्छ र मसिना सेता धर्साहरू देखिन्छ । बढी लागेको बेला पातहरू ओइलाएर टुप्पाबाट सुक्दै आउँछ ।

नियन्त्रण: मानोकोटोफस १ मि.ली./लिट्र पानीमा मिसाएर छर्ने ।

ख) रोग

१) प्याजको डाउनीमिलड्यु: प्रभावित विरवाहरू बढ्न सक्दैन र पातहरूको कुनै निश्चित आकार नभै धमिलो हरियो रङ्गको हुन्छ । पातहरूमा सेता

अथवा खरानी रङ्गको हुसी पनि देखिन्छ । यिनीहरू पछि तुरन्तै पहेला भई मर्छन ।

नियन्त्रण:

- पानीको निकास राम्ररी हुनु पर्दछ ।
- डाइथेन एम-४५ लाई २ग्राम/लिट्र पानीमिसाएर बेर्ना सारेको २० दिन फरकमा छर्ने ।

२) प्याजको कालो पोके: यो प्याजको डरलाग्दो रोग हो । बेर्नाहरू माटोबाट बाहिर आएको केहि समय पछि नै पातमा गाढा काला रङ्गका अपारदर्शक भागका अथवा धर्साहरू देखिन्छ । यि काला दागहरूलाई छोपेको छाला फुट्छ र कालो धुलो बाहिर निस्कन्छ । अति रोग ग्रस्त विरवाहरू मर्दछन् । जसमा बाटको फेद नजिकै पातहरूमा उठेका फोकाहरू उत्पन्न हुन्छन् ।

नियन्त्रण:

- एउटै जग्गामा लगातार प्याज खेती नगर्ने ।
- रोगी फोकाहरूका छालाहरू फुटेर जिवाणु निस्कनु अगाडि रोगी बेर्नाहरू उखेलेर जलाइदिने ।
- थाइराम/स्याप्टान २ ग्राम प्रति के.जी. बीउको दरले बीउको उपचार गर्ने ।
- हुसी नामक विषादी २ ग्राम/लिट्र पानीमा मिसाएर छर्ने ।

३) डुकु आउनु: प्याजमा डुकु आउनुमा खेती प्रविधि र मलखादको प्रयोग भन्दा प्याजको जात, तापक्रम, बेर्नाको उमेर र साइज आदिले असर पर्दछ । ठाउँमा हुने जातलाई चिसो क्षेत्रमा लगाउनाले, छिप्पीएको र ठुला बेर्ना लगाए, जाडो याम शुरु हुनु भन्दा पहिला बेर्ना सार्नाले पनि प्याजमा डुकु आउँछ ।

प्याजको बेर्ना छिदै तयार गरेर कार्तिक वा मंसिर १५ भन्दा पहिले सारियो भने शुरुमा नै १३°C भन्दा बढी तापक्रम प्राप्त भई गानो प्रक्रिया शुरु हुन्छ । पुस माघमा तापक्रम १३°C भन्दा तल झर्ने डुकु आउनको लागि आवश्यक सितावस्था पूर्ण हुन्छ । फागुनमा तापक्रम पुनः बढ्न थाले पछि प्याजमा डुकु आउँछ । यसरी शुरुमा बढी तापमा, बीचमा घटी तापक्रम, पछि केहि बढी तापक्रम भएमा प्याजमा डुकु आउँछ । त्यसैले प्याजमा डुकु आउने समस्याबाट बच्न ४०-४५ दिनको समयमा सिसाकलमको आकारको बेर्ना मंसिर १५ भन्दा पछि मात्र सार्नुपर्दछ । गानोले शुरुको बढी तापक्रमबाट प्याज उमकन्छ र डुकु आउँदैन ।

उत्पादन: प्रति रोपनी १००० किलो ग्राम देखि २५०० किलो ग्राम सम्म गानो उत्पादन हुन्छ ।

लसुन

हावापानी: लसुन १०-१२°C को तापक्रममा राम्ररी हुर्कन्छ । शुन्य भन्दा तलका तापक्रममा यो पहुँचिन थाल्दछ । लसुन बढ्ने अवधिमा प्रशस्त पानीको आवश्यकता पर्दछ । पोटी लागे पछि पानी घटाउदै लानु पर्दछ । यसको लागि प्रशस्त प्राञ्चारिक पदार्थ भएको खुकुलो माटो हुनु पर्दछ । पि.एच. ५.८ देखि ६.५ बीच भएको माटो यसको लागि राम्रो हुन्छ ।

लसुनको रोपाई र मलखाद: लसुनको पोटी रोपिन्छ । यसका ठुला र मझौला पोटी मात्र रोप्नु लायक हुन्छ । एक रोपनीमा २०-२५ किलो पोटी लाग्छ । लसुन १०-१५ से.मीको फरकमा रोपिन्छ । पोटीको तीन चौथाई भाग छोपिने गरी रोप्नु पर्दछ । प्राञ्चारिक मल १ टन/रोपनीको दरले जम्मा तयार गर्दा नै दिनु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

हेरचाह: लसुन रोप्ने पछि यसको साथ साथै झारपात आउने हुँदा हल्का गोडमेल गरी माटो खुकुलो पार्नु पर्दछ । लसुन खेतीको लागि सिंचाई अति आवश्यक हुन्छ । खेती अवधिभर माटोको अवस्था हेरी ४-५ पटक सम्म सिंचाई गर्नु पर्दछ ।

बाली तयारी: लसुन दुई उद्देश्यबाट तयार गर्न सकिन्छ । प्रथमतः हरियो तरकारीको लागि कलिलैमा हरियो पात छँदा टिप्न लायक हुन्छ । गानोको लागि खेती गर्दा पात पहुँचिन र डाँठ ढल्न थाले पछि गानो उखेली घाममा जरा र डाँठ काटी सुकाइन्छ । खेती प्रविधि र जात हेरी लसुन प्रति रोपनी ५००-१००० किलो ग्राम सम्म फल्दछ ।

कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रबाट प्रकाशित हुने कृषि साप्ताहिक पढ्ने गरौं ।

११५. आधुनिक आलु उत्पादन प्रविधि

परिचय: आलु संसारकै प्रमुख खाद्य बाली हो । नेपालमा विभिन्न खाद्य बालीहरूले ढाकेको क्षेत्रफल अनुसार यो बालीले पाँचौ स्थान ओगटेको छ भन्ने उत्पादनमा चौथो र उत्पादकत्वमा प्रथम स्थान ओगट्दछ । आ.व. २०५७/५८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करीब १,२९,०१९ हेक्टरमा आलु खेती गरिन्छ । आलुमा सबै भन्दा धेरै कार्बोहाइड्रेट १९.४ पाइन्छ ।

हावापानी: आलु स्वाभावैले चिसो हावापानीको बाली भएकोले यसले चिसोसँगै बालावरण रुचाउँदछ । तर धेरै न्यून तापक्रममा आलुको बोटको वृद्धि विकास रोकिन सक्छ । यस बालिले तुषारो पनि धेरै न्यून मात्रामा माग्न सहन सक्दछ । आलुको बोटको उचित वानस्पतिक वृद्धिका लागि हावाको सतह सरदर तापक्रम २०-३०°C र आलुको गेडाको विकासका लागि १५-१८°C उत्तम मानिन्छ । यदि उक्त तापक्रम १०°C भन्दा तल र ३०°C भन्दा माथि हुन गएमा बाधा उत्पन्न हुन गई दानाको वृद्धि प्रकृया रोकिन जान्छ । तसर्थ आलुको गेडाको वृद्धि र विकासका लागि रातको तापक्रम १०-२०°C हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै साधारणतया रोपेको बीउ आलु उम्रन माटोको तापक्रम कमिस्मा ८-१०°C हुनु पर्दछ । कम सापेक्षिक आद्रतामा प्रकाश संश्लेषण घट्ने जाने र बढीमा पनि डुबुवा जस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्न जाने भएकोले साधारणतया ६०-७० सम्मको सापेक्षिक आद्रताको अवस्था आलु बालीको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

बाली लगाउने समय: भौगोलिक विविधता तथा हावापानीको विचार गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आलु खेती गरिन्छ । नेपालमा मुख्यतया पहाडी क्षेत्रमा गर्मी याममा र तराईमा जाडो याममा आलु खेती गरिने भए तापनि विभिन्न हावापानी अनुसार उक्त समयमा पनि केही फरक पर्न जान्छ ।

भौगोलिक क्षेत्र

रोपाई र भित्री मधेश (३०० मिटर भन्दा तल)
पहाड (३००-१५०० मिटर)
पहाड (१५००-३००० मिटर)
उच्च पहाड (३००० मिटर भन्दा माथि)

लगाउने समय

असोज देखि फागुन
शिशिर बाली (आद्र-फागुन)
फागुन - चैत्र
चैत्र - जेठ

माटो (Soil): आलु खेती क्षारीय बाहेक अरु सबै किसिमको माटोमा गर्न सकिन्छ । तर पानीको राम्रो विकास हुने, प्रशस्त प्राञ्चारिक पदार्थयुक्त केही भाग खालको बलौटे दुमट वा दुमट माटोमा सब भन्दा राम्ररी फल्दछ । माटोको बनावटले यसको भौतिक अवस्थामा विभिन्न किसिमले असर पार्ने

भएकोले साह्रो, चिन्ट्याहा, लेसिलो र सुके पछि डल्ला पर्ने वा जम्ने खालको माटो आलु बालीको लागि उपयुक्त हुँदैन । आलुको दाना लागेर वृद्धि भईरहेको बलामा माटोमा चिस्यान बढी भएमा वा माटो साह्रो भएमा वायु संचारमा अवरोध पैदा हुन गई आलुको बोकामा रहेको श्वास प्रश्वासको लागि उपयोग हुने विशेष छिद्रहरू (Lenticels) ठुला भई स-साना छटिरा भै देखिन थाल्दछन् ।

मलखाद: खेती गरिने जग्गाबाट उपलब्ध हुने खाद्य तत्व अपर्याप्त हुने हुँदा माटोमा उर्वराशक्ति कायम गराउनका लागि थप मलखादको आवश्यकता पर्दछ । तर मलखादहरू बढी महँगो र सजिलो उपलब्ध नहुने भएकोले खाद्य तत्वहरूको प्रतिक्रिया विरवा र माटोमा कसरी हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत सफल खेतीका लागि हुनु जरुरी छ । प्राज्ञाधिक र रासायनिक मलको उचित प्रयोग बिना माटोमा विद्यमान पोषक तत्वहरूको भरमा मात्र आलु बालीबाट सन्तोषजनक रूपमा उत्पादन लिन सकिँदैन । त्यसमा पनि आलु जमीन मुनि फल्ने भएको कारणले अपर्याप्त र असन्तुलित मलखादको प्रयोगद्वारा आशातित उत्पादन लिन सकिँदैन ।

आलु बालीमा मलखाद सम्बन्धि केहि वर्षका परीक्षणहरूबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले राम्ररी कुहिएको प्रज्ञाधिक मल २० टन/हेक्टरका साथै रासायनिक मल तराईमा १५०:१००:९० किलो ग्राम/हेक्टरका दरले, पहाडी क्षेत्रमा १५०:१००:३० किलो ग्राम नाइट्रोजन, फोस्फोरस तथा पोटास/हेक्टरका दरले आलु बालीका लागि सिफारिस गरेको छ । आलु रोप्नु भन्दा पहिले जग्गा तयार भैसके पछि रासायनिक मल लाइनमा छरेर गई भैसीको मल वा कम्पोस्ट मलले पुरी दिनु पर्छ । बीउ आलु रासायनिक मलको सिधा सम्पर्कमा आउन दिनु हुँदैन नत्र बीउ कुहिन गई उमारमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ ।

जमिनको तयारी: आलु जमिन मुनि फल्ने बाली भएकोले आलु खेतीको लागि गहिरो जोती, डल्ला फुटाई, माटो बुर्जार्दो र खुकुलो बनाउनु पर्दछ । आलुको गोडा नरम वा हलुका माटोमा मात्र राम्रो संग बढ्ने र बढी फल्ने भएकोले माटोमा भएको ढुङ्गा र झारपात राम्रो संग बढ्ने र बढी फल्ने भएकोले माटोमा भएको ढुङ्गा र झारपात राम्रो संग हटाउनु पर्छ । राम्रो संग तयार पारेको माटोमा जमिन भित्रको पानी सजिलो संग माथि आउने भएकोले विरवालाई उपलब्ध हुन्छ र जमिन माथि भएको पानी सजिलैसंग जमिनभित्र नै निकास भै जाने हुन्छ ।

१०) सेतो धुले दुसी रोग (Powdery Mildew Disease): यो *Erysiphe* *thoracearum* नामक दुसीबाट हुन्छ । शुरुमा पातको माथिल्लो सतहमा *powdery* सेतो वा खैरो रङ्गको थोप्ला देखिन्छ । पछि रोग बढी लागेमा पातको *upper* पट्टी सतह र डाँठमा खरानी जस्तो धुलो देखिन्छ । पातहरू पहेँलिन्छ, *turning* र मर्दछ ।

११) कृषक: झारपात र पुराना बोट बटुलेर जलाउने तथा खेती बारी सफा राख्ने । क्याराथेन झोल १ मिलि लिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई १०/१२ लिटरको फरकमा छर्ने ।

१२) गुजमुज्जे रोग: यो रोग *Cucumber mosaic virus* नामक विषाणुबाट हुन्छ । ६ हप्ता पछि बोटमा पहेँलो रङ्ग मिसिएको धब्बाहरू देखिन्छ । पातहरू घुमेका र तल माथि उठेका हुन् । साधारणतया पातहरू तल तिर *pointing* । बोट नबढ्ने, डाँठ छोटो हुने र फुल तथा फल सानो हुने हुन्छ ।

१३) कृषक: स्वस्थ बीउ लगाउने र खेती बारी सफा राख्ने । रोगी बोट देखिने भित्तिकै उखेलेर फाल्ने ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,
कृषि सेवा केन्द्र, कृषि सेवा उपकेन्द्रमा
गई आफ्ना कृषि सम्बन्धी
समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस् ।

भएकोले साह्रो, चिन्ट्याहा, लेसिलो र सुके पछि डल्ता पर्ने वा जन्मे खालको माटो आलु बालीको लागि उपयुक्त हुदैन । आलुको दाना लागेर बृद्धि भईरहेको बेलामा माटोमा चिस्यान बढी भएमा वा माटो साह्रो भएमा वायु संचारमा अवरोध पैदा हुन गई आलुको वोक्रामा रहेका श्वास प्रशवासको लागि उपयोग हुने विशेष छिद्रहरू (Lenticels) ठुला भई स-साना खटिरा नै देखिन थाल्दछन् ।

मलखाद: खेती गरिने जग्गाबाट उपलब्ध हुने खाद्य तत्व अपर्याप्त हुने हुँदा माटोमा उर्वराशक्ति कायम गराउनका लागि थप मलखादको आवश्यकता पर्दछ । तर मलखादहरू बढी महङ्गो र सजिलो उपलब्ध नहुने भएकोले खाद्य तत्वहरूको प्रतिक्रिया विरवा र माटोमा कसरी हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत सफल खेतीका लागि हुनु जरुरी छ । प्राज्ञारिक र रासायनिक मलको उचित प्रयोग बिना माटोमा विद्यमान पोषक तत्वहरूको भरमा मात्र आलु बालीबाट सन्तोषजनक रूपमा उत्पादन लिन सकिदैन । त्यसमा पनि आलु जमीन मुनि फल्ने भएको कारणले अपर्याप्त र असन्तुलित मलखादको प्रयोगद्वारा आशातिर उत्पादन लिन सकिदैन ।

आलु बालीमा मलखाद सम्बन्धि केहि वर्षका परीक्षणहरूबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले राम्ररी कुहिएको प्रज्ञारिक मल ३० टन/हेक्टरका साथै रासायनिक मल तराईमा १५०:१००:९० किलो ग्राम/हेक्टरका दरले, पहाडी क्षेत्रमा १५०:१००:३० किलो ग्राम नाइट्रोजन, फोस्फोरस तथा पोटास/हेक्टरका दरले आलु बालीका लागि सिफारिस गरेको छ । आलु रोप्नु भन्दा पहिले जग्गा तयार भैसके पछि रासायनिक मल लाइनमा छरेर गाई भैसीको मल वा कम्पोस्ट मलले पुरी दिनु पर्छ । बीउ आलु रासायनिक मलको सिधा सम्पर्कमा आउन दिनु हुँदैन नत्र बीउ कुहिन गई उमारमा नराप्नो असर पर्न सक्छ ।

जमिनको तयारी: आलु जमिन मुनि फल्ने बाली भएकोले आलु खेतीको लागि गहिरो जोती, डल्ता फुटाई, माटो बुर्बुराउदो र खुकुलो बनाउनु पर्दछ । आलुको गोडा नरम वा हलुका माटोमा मात्र राम्रो संग बढ्ने र बढी फल्ने भएकोले माटोमा भएको कुश र झारपात राम्रो संग बढ्ने र बढी फल्ने भएकोले माटोमा भएको कुश र झारपात राम्रो संग हटाउनु पर्छ । राम्रो संग तयार पारेको माटोमा जमिन भित्रको पानी सजिलो संग माथि आउने भएकोले विरवालाई उपलब्ध हुन्छ र जमिन माथि भएको पानी सजिलैसंग जमिनीभित्र नै निक्कास भै जाने हुन्छ ।

जमिनको तयारीको मुख्य उद्देश्य आलुको बोटलाई राम्ररी फस्टाउन र म भौतिक संरचनालाई उपयुक्त पार्नुको साथै माटोमा रहेको झारपात नाभो (पहाडी भेगमा), रोगका जीवाणुहरूको अलावा माटो भित्र बस्ने किम्विन्न अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न भए तापनि प्रत्येक खनजोतले म भएको चिस्यानलाई उडाउने भएकोले सिँचाईको व्यवस्था नभएको वा भएको ठाउँमा जमिनको तयारी गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन सक्छ । सिँचाई नै जमिन तयार गरी आलु रोपिहाल्ने अथवा धेरै गहिरो नखल्ने पनि यसका उपायहरू हुन् ।

रोप्ने तरीका: बीउ आलु ड्याङ्ग बनाएर लाइनमा रोप्दा गोडमेल गर्न, चढाउन, मलखाद दिन, सिँचाई गर्न, औषधि छर्न, रोगिङ गर्न र आलु र कार्य गर्न समेत सजिलो हुने हुनाले आलु रोप्दा एक ड्याङ्गबाट ड्याङ्गको दुरी आलु खेती उद्देश्य अनुसार ६०-७० से.मी. (तीन बिता हात), एक बीउबाट अर्को बीउ २५ से.मी. (एक बिता) फरक पारी पर्दछ । माटोको किसिम र चिस्यानको अवस्था हेरी बीउ ५-१० से. गहिराईमा रोप्नु पर्छ ।

बीउ व्यवस्थापन: सफल आलु खेतीका लागि बीउ व्यवस्थापनका विधि पछ्याइनु जरुरी छ । बीउको दर, बीउ आलु काट्ने तरीका, बीउ आलु टुसाउने कार्यहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

बीउ दर: बीउ आलु कति लाग्छ भन्ने कुरा मुख्यतया बीउको आकार र रोप्ने दुरीमा भर पर्दछ । ज्यादै साना बीउ आलुबाट कम टुसाहरू आउनेका बीउहरू हलकक बढ्न नसक्ने र रोगव्याधी, तुषारो आदि खपन नसक्छ । ज्यादै ठुलो बीउ आलु रोप्नाले पनि बीउ बढी लाग्न गई खर्च बढ्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा नहुन सक्छ । त्यसैले साधारणतया २०-३० ग्राम तौल भएका आलुका दाना रोप्नको लागि उपयुक्त मानिएको छ । आलु उत्पादनको लागि सिँचै आलुका दाना रोप्न सिफारिस गरिएको छ । जस्त अनुसार प्रति हेक्टर १.५ - २ टन सम्म बीउ आलु आवश्यक पर्दछ । तयार खायन आलु उत्पादनका लागि खेती गरिएको भए बीउ आलुलाई कापि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

बीउ आलु काट्ने तरीका: आलु काटेर रोप्दा काट्ने औजारको माध्यमक आलुमा रहेका रोगहरू एक बाट अर्कोमा सजिलै संग सर्न सक्छ । काट्ने बीउ आलु कुहिन पनि सक्छ । यसका अलावा उमेका बीउमा प

- सरदर उत्पादन- १५ देखि २० टन/हेक्टर
- रोगको अवरोधक- ऐजेर
- सिफारिस- मध्य पहाड र तराई

४) जनक देव

- आलुको दाना- लाम्बो, ठुलो
- दानाको रङ्ग- रातो
- बाली तयार हुने समय- १०० देखि १२० दिन
- सरदर उत्पादन- २५ देखि ३० टन/हेक्टर
- रोग अवरोधक- डडुवा र ऐजेर
- सिफारिस- उच्च र मध्यम पहाड

५) खुमल सेतो-१:

- आलुको दाना- गोली
- दानाको रङ्ग- सेतो
- बाली तयार हुने समय- १०० देखि १२० दिन
- सरदर उत्पादन- २५ देखि ३० टन/हेक्टर
- रोग अवरोधक- डडुवा र ऐजेर भाइरस
- सिफारिस- कम वर्षा हुने पहाड

६) खुमल रातो-२:

- आलुको दाना- गोली, मझौला आकार
- दानाको रङ्ग- हल्का रातो
- बाली तयार हुने समय- १०० देखि १२० दिन
- सरदर उत्पादन- २५ देखि ३० टन/हेक्टर
- रोग अवरोधक- डडुवा, ऐजेर भाइरस
- सिफारिस- तराई र भित्री मधेश

सिफारिस जातहरू:

जातिय विवरण	जात
कार्डिनल	पेरी कोली
दाना	लाम्बो, चिल्लो गोली, सानो देखि ठुलो
दानाको रङ्ग	रातो प्याजी खैरो/रातो
बाली तयार हुने समय	९०-१२० दिन १००-१२० दिन
सरदर उत्पादन	२०-२५ टन/हेक्टर २०-२५ टन/हेक्टर
रोग अवरोधक	डडुवा सहने डडुवा र ऐजेर
सिफारिस क्षेत्र	तराई र मध्यम पहाड परिचम तराई

आजभोलि आलुको बियाबाट खेती गर्ने प्रचलन पनि आएको छ ।

११६. आलुका समस्याहरू र तिनका रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू

आलुका किराहरू

आलुको पुतली (Potato Tuber Mouth): यो पुतलीको लार्भाले आलुको पात, डाँठ र दानामा आक्रमण गर्दछ । बोटमा पिनले पात र माथिबाट डाँठ खान्छन् । पात विस्तारै सेतो हुने र डाँठ सुक्छन् । दाना भित्र लार्भाको आक्रमण गरे पछि दाना बिग्रने र भण्डारण गरिएको आलु पुरै बिग्रने हुन्छ ।

रोकथाम:

- किरा लागेर सडेका आलु खुला ठाउँमा नफर्‍याकी माटो भित्र गहिरो खाल्डोमा पुरिदिने ।
- दानामा आक्रमण गरेको भए तुरन्त लक्षण देखिने भएकाले राम्ररी हेरी छानिरहनु पर्दछ ।
- पुतलीहरू बत्तीमा आकर्षित हुने हुँदा आलु थन्क्याइएको ठाउँमा बत्ती बाली बत्तीमुनी पानी सहित पानीको भाँडोमा मडिले राख्ने र यसो गर्दा त्यहाँ किरा परी मर्दछन् ।
- किरा लागेको आलु पुनः रोपण नगर्ने ।
- आलु खनिसके पछि खुला खेतमै नराख्ने र राख्ने परेमा छोपेर राख्ने । खुला भएमा पुतलीले आक्रमण गर्दछ ।
- आलु खनेपछि बोटहरू जम्मा गरी गाड्ने वा फोल्ने ।
- थन्क्याउनु भन्दा पहिला आलु राख्ने ठाउँमा मालाधिन २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीको झोलोले स्त्रे गर्ने ।

फोट काट्ने किरा (Cut Worm): पातमा तल्लो पट्टि फुल पार्ने र २ देखि ४ दिनमै लार्भा पनि पात खान थाल्दछन् । यिनीहरू दिनभरी माटो भित्र लुकी बस्ने र राती मात्र खान्छन् । यो किराको जीवनचक्र ७ दिनमा पुरा हुन्छ ।

रोकथाम:

- नियमित निरीक्षण गर्ने, बोट ओइलाएको देखिएमा राम्ररी हेर्ने, लार्भा देखिएमा जम्मा गरी नष्ट गरिदिने ।
- माटोमा फ्युराडान १५ किलो वा फोरेट १५ किलो प्रति हेक्टरका दरले प्रयोग गर्ने ।

- यदि पहिला विषादीको प्रयोग गरिएको छैन भने र पछि समस्या देखिएमा १२ देखि १५ किलो प्रति हेक्टरका दरले मन्चकद्रवल दानेदार विषादी राखी गोडिदिने ।

- माटोमा उकेरा दिएपछि यस्तो समस्या देखे थायोडान ३ मि.ली. प्रति लिटर पानीका दरले प्रयोग गर्ने ।
- खुमे किरा (Grub)

यो किरा जमिन मुनि बसी जरा र आलु खान्छन् साथै बोट पनि काटीदिन्छन् ।

रोकथाम: फेद काट्नेका लागि काँचो मल प्रयोग नगर्ने ।

रातो कभिला (Red Ant): यसले आलुको दानामा आक्रमण गरी क्षत विक्षत बनाउनुका साथै खान अयोग्य बनाइदिन्छ ।

रोकथाम: फ्युराडान, डर्सवान आदिको प्रयोग गर्ने ।

जरामा गाँठा बनाउने जुका (Root Knot Nematodes): आलुका जरामा मसिना पिर्खा हुन्छन् र यस भित्र मसिना आँखाले नदेखिने जुका हुन्छन् । यस्ता खालका आलु खान योग्य हुँदैनन् ।

रोकथाम: फोरेट, फ्युराडान वा डर्सवान प्रयोग गर्ने ।

लाही (Aphids): विरवाको रस चुसी विरवामा भाइरस रोगको विकास हुन जान्छ ।

रोकथाम:

- रोग र मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा राखी स्ने गर्ने ।
- फोरेट विषादी आलु रोप्ने बेलाका प्रयोग गर्ने ।

कालो कागो किरा: यो ठुलो किरा, पहेंलो टाउको र पुरा शरीर कालो हुन्छ । यसले आलुको पात खान्छ ।

रोकथाम: फेद काट्ने किरामा जस्तै प्रयोग गर्ने ।

आलुका रोगहरू

क) डडुवा रोग (Late Blight):

- शुरुमा पातका किनारमा स साना पानीले भिजे जस्तो धोन्दाहरू देखिन्छन् ।
- विहानीपख पातको उल्टो तर्फ सेतो भुवादार ठुसी देखिन्छ । यदि वातावरण ओसिलो रहिरहेमा विरवाका पातहरू डडेको देखिन्छ ।

रोग नियन्त्रण:

- स्वस्थ बीउ आलु रोपण गर्ने ।
- पुराना आलुका डाँठ, दाना र अन्य क्षारपात हटाउने ।
- रोग अवरोधक तथा सहन सक्ने जातहरू जस्तै: कार्डिनल, एकिराना आदि जातहरू लगाउने ।
- मेन्कोजेव (डाइथेन, मुथेन, किसान (एम आदि) २ देखि ३ ग्राम, ल्वाइटक्स २ ग्राम, किलोक्सील २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई प्रत्येक ७ देखि १० दिनमा रोग शुरु भएदेखि बालीनाली भित्रयाउन्जेल सम्म स्ने गर्ने ।

ग) ब्याक्टेरिया जन्य रोग: छैरो पिपचकके रोग: बोट शुरुमा ओइलाउँछ र पहेलिएर मर्दछन् । रोग बढी भएपछि आलुको आँखा काला भई पिप पदार्थ निस्कन्छ ।

प्रचार: १.५ ग्राम/१५ लिटर पानीमा मिसाई Strepto-cycline र ३० ग्राम/१५ लिटर पानीमा मिसाई च्याक्सिड एक साथ मिसाई स्ने गर्ने ।

ग) भाइरस जन्य रोगहरू: भाइरसका कारणले बोट पात पहेंलो हुने, पात पार्ने, पात दोबिने, सोझाकका लक्षण देखिने हुन्छ । यो समस्या वा भाइरस विकास लाही किराबाटै हुन्छ ।

नियन्त्रण:

- स्वस्थ बीउ रोपण गर्ने ।
- रोगी बोट फल सहित उखेली गाड्ने वा पोसिदिने ।
- लाही किराका विरुद्ध रोग र मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई स्ने गर्ने र साथमा रोगनासक विषादी पनि मिसाई स्ने गर्ने ।

११७. केराउ, बोडी र सिमीको उन्नत खेती प्रविधि

नेपालमा दालबाली मध्ये केराउ, बोडी र सिमी एउटा महत्वपूर्ण तरकारी हो । मानव शरीरमा आवश्यक प्रोटीन, खनिज, लवण तथा भिटामिन ए र सी का प्रमुख स्रोत हुन् ।

हावापानी र माटो:

बाली	हावापानी	माटो
केराउ	१०-१८°C	दुमट माटो, ५.५-७.५ P.M.
बोडी	१५-२४°C	चिम्टाइलो दुमट माटो, ५.५-६.० P.M.
सिमी	१२-२५°C	बलौटे दुमट, चिम्टाइलो दुमट P.M.

केराउको जात

१) आर्केल: ४० देखि ५० दिनमा फुल फुली ६० देखि ६५ दिनमा बाली लिन तयार हुन्छ । यो अगौटे जात हो । एक कोशामा ७/८ दाना हुन्छ । हरियो कोशा २५० देखि ३५० के.जी./रोपनी उत्पादन हुन्छ ।

२) बोनभिसे: यो उच्च पहाड तथा मध्य पहाडमा राम्ररी सफलता प्राप्त गरेको जात हो । यो रोपेको ५५ देखि ६० दिनमा फुल फुली ८० देखि ८५ दिनमा हरियो कोशा तयार हुन्छ । हरियो कोशा सरदर उत्पादन २७५ देखि ३७५ के.जी./रोपनी हुन्छ । कोशाहरू हल्का हरिया रङ्गको गोलाकार हुन्छन् ।

३) सिक्किम लोकल: नेपालका पहाडी भागहरूमा प्रचलित प्रमुख जातहरू मध्ये एक जात सिक्किम लोकल हो । यो रोपेको ८० देखि ८५ दिनमा फुल फल्छ । यो पछौटे जात हो । हरियो कोशाको उत्पादन ४०० देखि ४५० के.जी./रोपनी हुन्छ ।

४) न्यु लाइन परफेक्सन: यो रोपेको ६० देखि ६५ दिनमा फुल फुली ८५ देखि ९० दिनमा हरियो कोशा तयार हुन्छ । २७५ देखि ३७५ के.जी./रोपनी हरियो कोशा हुन्छ । सुकेका बीउ हरियो चाउरी परेका हुन्छन् । तराई क्षेत्रमा बढी तापक्रम हुने हुँदा अरु जातका भन्दा आर्केल जातको केराउ खेती ताजा तरकारी र बीउ उत्पादनको लागि राम्रो उत्पादन दिन्छ ।

राने बोडीका जातहरू

१) काठमाण्डौ स्थानीय: यो बीउ रोपेको ६० देखि ७० दिनमा पहिलो बाली तयार हुन्छ । कोशा ४५ से.मी. देखि ६० से.मी. लामा, हल्का हरियो जस्तो रातो रङ्गको हुने गोडा पाकेर सुकाउँदा रातो रङ्गको हुने जात हो ।

२) सर्लाही स्थानीय: यो बीउ रोपेको ५० देखि ६० दिनमा पहिलो बाली लिन सकिन्छ । तयार कोशा २५ से.मी. देखि ३० से.मी. लामा हल्का हरियो जस्तो सेतो रङ्गका हुने, गोडा पाकेर सुकाउँदा कालो रङ्गका हुने जात हो ।

सिमीका जातहरू

१) झागो समूह: यो समूहमा थार्कोको आवश्यकता नहुने बोट झारीदार हुन्छ । कोशा तथा बीउ उत्पादन छिटो हुने हुँदा यसको खेती हाम्रो देशमा लोकप्रिय जात भएको छ ।

- कन्टेनर: ५० देखि ५५ दिनमा हरियो कोशा, उत्पादन ४०० देखि ५०० के.जी./रोपनी हरियो कोशा ।
- कार्लोस फेभोराइट:
- हार्भेस्ट: ???
- रेड किङ्गनी: ८० देखि ९० दिनमा हरियो कोशा, उत्पादन ३५० देखि ४५० के.जी./रोपनी हरियो कोशा ।
- चार्ल्स फेभोराइट: ७० देखि ८० दिनमा हरियो कोशा, उत्पादन ३०० देखि ४०० के.जी./रोपनी हरियो कोशा ।
- पश्चिमी मध्य पहाडमा तीन पन्ध्रे नामले यो स्थानीय जात प्रचलित छ । हरियो कोशा रोपेको ४५ दिनमा खान तयार हुन्छ ।

२) लहरे समूह: साधारणतया ४ देखि ७ फिट अगला थार्का दिन पर्दछ । यस समूहमा जातहरूमा नेपालमा प्रचलित केन्ट्रिकबन्डर हो । यो जातको भिमीलाई छु सिमी भन्दछन् । यो रोपेको ७० देखि ७५ दिनमा पहिलो बाली तयार हुने मध्यम खाले जात हो । सुकेका बीउहरू हल्का कफी रङ्गको र भालामा कलेजी रिङ्ग भएका हुन्छन् । हरियो कोशा उत्पादन ३०० देखि ४०० के.जी. र रोपनी हुन्छ ।

रोप्ने/लगाउने समय:

क्षेत्र	बाली/रोप्ने समय	बाली/उत्पादन	सिमी	केराउ
उच्च पहाड	बोडी	बोडी	सिमी	
मध्य पहाड	बैशाख-जेठ	चैत्र-बैशाख	माघ	असाढ-भाद्र
तराई	असाढ-मसीर	माघ-बैशाख	कार्तिक-मसीर	फागुन-चैत्र
	पुस-माघ	बैशाख	श्रावण-भाद्र	कार्तिक

बीउ दर तथा लगाउने दुरी

बाली	जाल	बीउ दर/रोपनी	लगाउने दुरी/से.मी.
केराउ	अगौटे जाल	५-६ के.जी.	४०-४५ लाइन देखि लाइनको सम्म
पखौटे जाल		४-५ के.जी.	१५-२० बोटे देखि बोटे सम्म ।
बोडी		१.५-२ के.जी.	
सिमी	यागे सिमी	५.५ के.जी.	४०-५० लाइन देखि लाइन सम्म,
लहरे सिमी	१-२ के.जी.	७५-१००	१०-१५ बोटे देखि बोटे सम्म ।
			पक्ति देखि पक्ति सम्म, २५ बोटे देखि बोटे सम्म ।

बीउ उपचार: बेभिष्टीन २ ग्राम प्रति के.जी. अथवा निर्पोट ४६ ग्राम प्रति के.जी. बीउमा मिसाई छर्ने वा २५० के.जी. निर्पोट युक्त मल प्रति हेक्टरमा छर्ने ।

बोडीको जाल

- क) प्रकाश:
- विरवाको उचाई: २९ से.मी. (Plant height 29 cm)
 - फुल्ने दिन: ६० (Days of flowering 60)
 - दाना उत्पादन: ७५२ के.जी./ हेक्टर, कोसा उत्पादन: ७५२ के.जी./ हेक्टर। (Grain average yield 752 Kg/ha pod-1572 Kg/ha).
 - आकाशो पानीको भरमा पर्ने र सिंचित क्षेत्रलाई समेत सुहाउने (Suitable in rainfed & irrigated management).
 - लाग्दैन (Aphid, bugs and hoppers).

यो तराई र भित्री मधेशको लागि सिफारिस भएको हो ।

रोप्ने समय: भदौमा (मकै-बोडी-तोरी) August/Early September (Maize cowpea-mustard).

बीउ - बैशाख - गहुँ - बोडी - धान earlier April (Wheat-cowpea-rice)

ग) आकाश:

- विरवाको उचाई: ४१ से.मी. (Plant height 41 cm).
- फुल्ने समय: द्ध दिन (Day of flowering 45).
- फल्ने: ७२ दिन (Maturity 75).
- उत्पादन: ९५९ के.जी./हे. (दाना) (Yield 959 Kg/ha pod yield 2413 Kg/ha)
- सिंचित र अर्सिंचित दुवै अवस्थालाई सुहाउँदै (Suitable for rainfed and irrigation conditions).
- यो तराई र भित्री मधेशको लागि सिफारिस गरिएको छ ।
- ५-६ से.मी. गहिराईमा बीउ रोप्नु पर्छ ।

मलखाद:

- कम्पोस्ट/गोबर मल १ टन प्रति रोपनी
- डि.ए.पी. ४.३ के.जी.
- युरिया २.५ के.जी.
- पोटास ३.३ के.जी.

उत्पादन:

- झण्डे सिमी हरियो कोशा: २००-३०० के.जी./रोपनी ।
- झण्डे सिमी सुकेको: ३०-४० के.जी./रोपनी ।
- तनेबोडी हरियो कोशा: २००-४०० के.जी./रोपनी ।
- तनेबोडी सुकेको: ३०-४० के.जी./रोपनी ।
- केराऊ हरियो कोशा: २००-४०० के.जी./रोपनी ।
- केराऊ सुकेको दाना: ४०-७० के.जी./रोपनी ।

कोसे तरकारी बाली समूहका तरकारीमा लाग्ने किराहरू निम्न अनुसार छन् ।

१) भटमासको झुसिलकिरा

क्षतिको प्रकार: पातको हरियो भाग खाने, खाए पछि खाएको भाग पातलो सेतो कागज जस्तो देखिन्छ । किराहरू छिपीदै गएपछि तिनले पातको सम्पूर्ण भाग खान्छन् र रिवालाई नाङ्गो बनाइ दिन्छन् ।

रोकथाम:

- फुलहरू जम्मा गरी नष्ट गर्ने, साथै लार्वाहरू पनि जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
- विषादीहरू साइपरमेथिन, डेल्टामेथिन(डेसिस) १-२ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

२) कोसामा लाग्ने गबारी

क्षतिको प्रकार: फल लाग्नु भन्दा पहिले यो किराको लार्वाले विरवाको पात खान्छन् । फल लागेपछि फल खान्छ र छिप्ने पछि फल छाडेर पात खान्छन्, जुन फल खान योग्य हुदैन ।

रोकथाम:

- यो किराको यौन जन्य पर्दा ढक्कन एजन्स्ययलभण को प्रयोग गरेर यो किरा समात्ने ।
- नीम र पाइरेथ्राइड समूहका किटनाशक पदार्थहरू (साइपरमेथिन, फेन्थेलेरेट र डेल्टामेथिन) आलोपालो गरी १-२ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाई २/१ पटक छर्ने ।

३) लाही

क्षतिको प्रकार: विरवा बढ्न सक्ने, कोसाहरू बटारिन्छ र तिनमा खसा घण्टा हुन्छन् । यस्ता कोसामा गोडा लग्दैन ।

रोकथाम: प्रकृतिक शत्रुको नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा डाइमेषोए मेटसिस्टक्स १-२ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

४) अन्य किराहरू: कालो पतेरो, उफ्रेने खपटे, घुन, झिझा आदि ।

सामान्यतया यदि किराहरूको कम आक्रमण छ भने घरेलु उपचार जस्तै खरानी, सुतीको झोल, नीमपातको झोल आदि छर्ने सकिन्छ ।

रोगहरू

१) एन्थ्राकनोज रोग (Anthracnose disease)

कारक: दुसी ।

गर्ने माध्यम: बीउ र रोगी विरवाको ठुटाहरू

लक्षण:

- पात र अन्य भागहरूमा शुरुमा थोप्लाहरू सासाना र हल्का खैरा रङ्गका हुन्छन् । पछि ओसिलो मोसममा थोप्लाहरू गाढा खैरा हुन्छन् ।
- डाँठ र भेटुनामा पनि देखिन्छ, रोग ग्रसित हरिया कोसाहरूमा सब भन्दा बढी प्रष्ट रूपमा रोगका लक्षण देखा पर्दछ ।
- धिनीहरूमा गाढा खैरो र बीचका भाग कालो र खाल्डो परेको जस्तो भिषुसेको, किनारा तिर खरानी रङ्गको हल्का खैरो, चारैतिर घेरा परेको गोल थोप्लाहरू बढ्दछन् ।

नियन्त्रण:

- छेती गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- रोग अवरोधक जात लगाउने ।
- बीउ उपचार गर्ने: धिराम/डाइथेन एम-४५ विषादी २-३ ग्राम/किलो बीउ
- विषादीको झोल बनाएर छर्ने । वेभिन्टीन विषादी २ ग्राम वा डाइथेन एम-४५ विषादी २-३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर २ हप्ताको फरकमा २/१ पटक छर्ने ।

२) सिन्दुरे रोग (Rust Disease)

कारक: दुसी ।

श्रोत (माध्यम): माटो ।

लक्षण:

- पात र कोसाहरूमा मात्र देखिन्छ ।
- शुरुमा पातको माथिल्लो र तल्लो भागमा स-साना सेता केही उठेका थोप्पाहरू देखा पर्दछन् । यी थोप्पाहरू पातमा प्रष्ट निस्कनको लागि रोग लाग्न शुरु भए देखि जम्मा ५ दिन लाग्दछ । यस्तो प्रकारको थोप्पामा छैरो रङ्गका जीवाणुका धुलोहरूले भरिएको हुन्छ । यस्तै प्रकारको लक्षण कोसामा पनि प्रष्ट देखा पर्दछ ।

नियन्त्रण:

- खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- बीउ उपचार गरी रोप्ने ।
- चुन प्रयोग गर्ने ।
- रोग देखे बित्तिकै वैश्वेदीन विषादी र ग्राम/लिटर पानीमा छोल बनाई १०/१० दिनको फरमा ३ पटक छर्ने ।

३) सेतो धुले हुसी रोग (Powdery Mildew Disease)

कारक: हुसी ।

श्रोत: माटो ।

लक्षण:

- पात र अन्य भागमा देखिन्छ ।
- पातको दुवै सतहमा र लहरा डाँठ र कोसामा समेत मसिनो किला जस्तो सेतो पिठो जस्तो थोप्पाहरू देखिन्छन् । रोग छिपिदै गए पछि यी थोप्पाहरूको क्षेत्रहरू बढ्दै जान्छ र हुसीको सेतो धुलो पातको सतह ढाँडिन्छ । अनुकुल वातावरण भएको बेलामा यस्तै लक्षणहरू विरवाको जस्तो भागहरूमा सेतै पाउडरले भरिएको टाढेबाट चिनिन्छ ।

नियन्त्रण:

- खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- रोग अवरोधक जात लगाउने ।

- गन्धक र चुनको बराबरी धुलो १५-२० किलो/हेक्टर र हत्ताको फरकमा पटक सम्म छर्ने ।

५) थोप्ने मरवा रोग (Bacterial Halo Bright Disease)

कारक: व्याक्टेरीया ।

श्रोत: बीउ ।

लक्षण: शुरुको अवस्थामा पातहरू सासाना पानीले भिजेको जस्ता पारदर्शी थोप्पाहरू देखा पर्दछन् । यी थोप्पाहरू पहिला शुरुमा पहेलो हुन्छन् । तर पातको रोगको प्रकोप बढ्दै गएमा थोप्पाको रङ्ग पनि बदलिदै जाने हुन्छ । पातको रोग सासाना नसाहरूमा रोगको लक्षण देखा पर्दछ । तर बिस्तारै बिस्तारै रोगहरूको पातको मुल नशामा सर्दछ । यसरी नशाको बीच बीचमा रातो थोप्पाहरू फैलिएको देखा पर्दछ । रोग बढ्दै गएपछि पातहरू सुक्दै जान्छन् । भनि वर्द्धछन् ।

नियन्त्रण:

- खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- बीउ उपचार गर्ने ।
- तर विषादीले यो रोगको नियन्त्रण नहुने भएकोले शुद्ध बीउ प्रयोग गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ ।

४) गुजमुजे रोग (Bean Common Mosaic Virus Disease)

कारक: भाइरस ।

श्रोत: बीउ ।

लक्षण: गुजमुजे, कालो जरा हुने र पातमा दागहरू देखिने, पात कप जस्तो हुने ।

नियन्त्रण:

- खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- मालाशिन/मेटासिस्टक्स १०-१५ दिनको फरकमा ३ पटक छर्ने ।

११९. अन्य कोशे (दात) बालीका मुख्य सजुहरू र तिनको रोकथाम तथा उपचार

चना: चनाको कोसामा लाग्ने गबारो हृद्यम हृद्यचभन्धः शुरुमा लार्भाहरूले पात खान्छन् र विरवामा कोसा लागे पछि बढ्न लागेको दाना खान्छन् । यिनले पहिले कोसाको बोक्रा काटी प्वाल बनाई भित्र पसी दानाहरू खान थाल्छन् ।

रोकथाम: क्षति धेरै भएमा डेसिस १ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा वा साइपरमेथिन २ एम.एल./लि. पानी ७/७ दिनको फरकमा स्प्र गर्ने ।

रहर:

- रहरको कोसामा लाग्ने लार्भा: लार्भा कलिला कोसामा पसी दाना खान्छन् र धेरै क्षति भएमा कोसा भित्रका सबै दाना क्षत विधत वा विधिएका हुन्छन् ।
- रोकथाम: बाली चक्र अपनाउने, डेसिस जा साइपरमेथिन प्रयोग गर्ने ।

भटमास: भटमासको झुसिल किरा (Soybean Hairy Caterpillar): पातमा बसी पातको हरियो भाग खान्छन् । त्यसैले विरवाको पात कागजको झिल्ली जस्तो बन्दछ र किराको आक्रमण बढी भएमा विरवा पात विहिन नाशो बन्न पुग्दछ ।

रोकथाम: एकै ठाउँमा बसी खाने भएकाले डेसिस/साइपरमेथिन आदिको प्रयोग गर्ने । डाँठमा लाग्ने गबारो: पोथीले पात र डाँठ कोनेर भित्र फुल पार्दछ र औसामा विकास भै पातबाट भित्र पसी डाँठमा र विशेष गरी मुलस्तम्भको नोक्सान हुने हुँदा पुरै विरवा मर्दछ । तर विरवा छिप्पीएको भए मर्दैन ।

रोकथाम: फ्युराइन प्रति का २ कि.ग्रा. माटोमा राख्ने । साथै लाही, पात खाने किरा, पतेरा, पात खाने खपटे आदि पनि लाग्दछन् । यसका लागि विभिन्न किसिमका विषादीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

बोटबाट फल पाकीसकेपछि भण्डारण गर्दा मालाथिन र क्वीकफस मिलाई बीउ र खाद्यान्नको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । २५० ग्राम मालाथिन/क्वी-टम बीउका लागि मात्र र प्रति १२ ग्रामको क्वीकफसले ६०० कि.ग्रा. अनाजको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।

१२०. फलफुलका मुख्य किराहरू, तिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू

आप

१) फडके किरा (Mango Hopper)

क्षति: आपको मुजुरा निस्के पछि यो किराहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि हुन्छ । यिनको माउ र बच्चा दुवैले कलिलो मुजुरा र फलबाट रस चुस्छन् । फलस्वरूप फुल र कोपिलाहरू ओडलाएर झर्दछन् । किराको शरीरबाट एक प्रकारको गुलियो पदार्थ निस्कन्छ, जसले पात, डाँठ सबै गुलियो पारेको हुन्छ । गुलियो पदार्थमा ठुसी लाग्छ । पात, डाँठ कालो हुन्छ । यसलाई तराईमा मधुवा भन्छन् ।

रोकथाम: आपमा फुलका कोपिलाहरू निस्कने वित्तिकै मोनोक्रोटोफस १ देखि २ एम.एल./लिटर पानीमा वा मेटासिस्टक्स २५ प्रतिशत झोल १० एम.एल. वा डिमेक्रन १०० प्रतिशत ३ एम.एल. झोल १० लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने । किराको रोकथाम नभए फेरि १० दिन पछि अर्को पटक छर्ने । भोटमा फुल फुले पछि औषधि छर्ने विचार गर्नु पर्दछ ।

२) आपको फल कुहाउने औसा (Mango Fruit Fly)

क्षति: पोथी विशाले आफ्नो तिखो फुल पार्ने अङ्गले आपको बोक्रा छेडेर भित्र पछि फुलहरू पार्दछ । यी फुलबाट औसा निस्केर फलको भित्र भित्रै खान थाल्दछन् । जसको फलस्वरूप फलहरू कुहिएर भुईँमा झर्दछन् । पछि पाकने फलहरूमा यो किरा ज्यादा लाग्दछ ।

रोकथाम:

- बगैचालाई सफा राख्ने ।
- मालाथिनको प्रयोग गर्ने ।
- रासायनिक पदार्थहरू जस्तै: सिट्रोनेल्ला (Citronella), झोल एमोनिया र एथिलबल mixture आदिले फलहरू कुहाउने औसाका विशाहरूलाई आकर्षण गर्दछ । यसमा मालाथियन मिसाएर छर्नु पर्दछ ।

१) आपको मिलिबग (Mango Mealy Bug)

क्षति: पात, डाँठ र फल चुल्ने गर्दछ । पात, डाँठमा गुलियो पदार्थ हुन्छ ।

रोकथाम: मोनोकोटोफस १ देखि २ एम.एल./लिटर पानीमा मिलाएर छर्ने ।

४) आफ्नो डाँठमा लाग्ने गबारो (Mango Stem Borer)

किया लाग्ने वनस्पति: आप, कटहर, अम्ला आदि ।

क्षति: यो गबारो खेचको हागा र मुल काण्ड भित्र पसेर सुरङ्ग बनाउँदै जान्छ । लाभाले यसरी बनाएको सुरङ्गमा पानी र काठको धुलो निकिक्केको देखिन्छ । किया लागेको मुल काण्ड वा हागा निकै क्षति ग्रस्त भए पछि यसका पातहरू खस्न लाग्छन् र पछि गएर पुरै बोट र हागाहरू सुक्छन् ।

रोकथाम:

- बोट बिस्वा सफा राख्ने,
- किराले बनाएको सुरङ्ग भित्र पेट्रोल, माई तेल वा कुनै किटनाशक विषादी पानीमा घोलेर हाली त्यसको मुख बन्द गरिदिनाले भित्र रहेका लार्भा नष्ट हुन्छन् साथै बगैचामा माउ खट्टे किया देखिने बित्तिकै नष्ट गर्नु पर्दछ ।

५) रातो कभिला (Red Ant): फलफुलको बोटमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुई तरिकाबाट क्षति पुर्‍याउँछ । प्रत्यक्षबाट बेर्ने काम गर्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा हानिकारक किराहरू जस्तै: मिलिबाग, कल्से किया र लाली आदिको रक्षा गर्दछ।

रोकथाम:

- कभिलाको गुडहरू नष्ट गर्ने ।
- यो कभिलाले रेखरेख गर्ने किराहरू (लाली, मिलिबाग आदि) को राम्ररी रोकथाम गर्नाले पनि यिनको संख्या कम हुन्छ ।

६) अन्य: डाँठमा एजेर बनाउने किया (Mango shoot gall maker), पातमा जालो बनाउने किया (Mango leaf wesser), धमिरा आदि ।

लिचि

१) लिचिको रातो पतेरो (Licchi Red Bug)

कृषक सहयोगी

३२२

इकाईस्-नेपाल

क्षति: यसको प्रकोप फुल फुल्ने बेला हुन्छ । यसका माउ र बच्चा दुवैले लिचिको फुलको डाँठ र फलको भेटुनुबाट रस चुस्छन् । जसले गर्दा फलहरू पूर्ण रूपमा विकसित नहुँदै झर्दछन् । छिपिएका फलहरूमा यो किया लाग्ने भन्ने फलहरू सुक्दै जान्छन् । यो किया धेरै लागेको वर्ष लिचिका बोटहरूमा एउटा पनि फल पाउन सकिन्न ।

रोकथाम: लिचि फुल फुल्ने बेलामा मेटासिस्टक्स २५ प्रतिशत झोल वा सेगर २० प्रतिशत वा मोनोकोटोफस झोल १ देखि २ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने । आवश्यक परेमा फेरि १० दिन पछि छर्ने ।

२) लिचिको फलको कोयामा लाग्ने गबारो (Licchi Fruit Stone Borer)

क्षति: लार्भारू फलको भेटुनुबाट भित्र पस्छन् र कोयालाई छेडेर त्यस भित्र पसी खान लाग्छन् । कहिले काहिँ यिनीहरू बोक्रा भित्रको नरम भाग पनि खान्छन् । फल नपाकुन्जेल यिनीहरू भित्रै बस्छन् तर कहिले काहिँ भेटुनको छेउमा प्वाल पारेर पनि निस्कन्छन् ।

रोकथाम: किया धेरै लाग्ने ठाउँमा फल कलिलै छँदा थायोडान ३५ प्रतिशत झोल ३० एम.एल. १० लिटर पानीमा मिसाएर वरिपरि छर्ने ।

३) अन्य: रातो कभिला, लिचिको पात गुजुमुजु पार्ने सुलसुले, बोक्रा खाने लार्भारू ।

अम्ला

- फल कुहान्ने औसा (Fruit Fly): यसको लागि आफ्ना अपनाए जस्तै प्रविधि अपनाउनु पर्दछ ।
- मिलि बग (Mealy Bug)
- खपटे किया
- बोक्रा खाने किया

रोकथाम: आप खेतीमा जस्तै रोकथामको प्रविधि अपनाउनु पर्दछ ।

कृषक सहयोगी

३२३

इकाईस्-नेपाल

कटहर

१) मुनामा लाग्ने गबरो (Shoot Borer): यसले कटहरका मुना, फुलका कोपिला र कलिला फलहरूमा आक्रमण गर्छ ।

रोकथाम: कटहरमा मुना र फुलका कोपिला पलाउन थाले पछि ७ देखि १० दिनको फरकमा २/३ पटक मेटासिड/फोलिथायन झोल १ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) रूखको बोक्रा खाने लार्भा (Bark Eating Caterpillar): कटहरका मुल स्तम्भ र हागाका बोक्रा खान्छ र ढुलो पारेर भित्र बस्छ ।

रोकथाम:

- यो किराले रूखको बोकामा बनाएका सुरङहरू नष्ट गर्ने र तिनमा फेला परेका लार्भाहरूलाई मार्ने ।
- सिरिन्जको सहयोगले लार्भाले डाँठमा बनाएका च्वालहरूमा पेट्रोल मद्धितेल जस्ता कुनै पनि किटनाशक विषादी पानीमा घोलेर भित्र हालिदिने र ढुलोको मुख भिलो माटोले टालिदिने ।

३) काण्डमा लाग्ने गबरो (Stem Borer)

४) भिलि बग

५) रातो कभिला: सबैमा आपमा जस्तै प्रविधि अपनाउनु पर्दछ ।

अभिलो जातका फलफुल (Citrus) (कागती जातका फलफुल)

१) कागती जातका विरवाको पुतली (Lemon Butterfly)

क्षति: लार्भाले विरवाका पात खान्छन् । धेरै आक्रमण भएमा विरवा नाश हुन्छ । विरवाको सानो अवस्थामा बढी दुख दिन्छ ।

रोकथाम:

- लार्भाहरू हातले टिपेर नष्ट गर्ने ।

- ढुलो विरवाहरूमा यदि रोकथामको जरुरत परेमा मोनोकोटोफस वा थायोडिन वा डिमेक्रन १ देखि २ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) कागतीका विरवाको पात खन्ने किरा (Citrus Leaf Miner)

क्षति: लार्भाहरूले कलिलो पात खोतलेर भित्र पस्छन् र सुरङ बनाएर हरियो भाग खदि अगाडि बढ्छन् । लार्भाले यसरी खाइसकेको ठाउँ सेतो पातलो बन्नको कागज जस्तो देखिन्छ र पातमा बाङ्गाटिङ्गा (Zigzag) सुरङ देखिन्छन् । यो किरा लागेको पात खुन्चिन्छ, पहेँल्लै जान्छ र कालान्तरमा झर्दछ । यसरी रोगाणुको पातमा Citrus Canker नामक रोग पनि छिदै लाग्छ ।

रोकथाम:

- मसिनो विरवामा यो किरा लागेका पातहरू टिपेर नष्ट गर्न सकिन्छ ।
- यो किरा धेरै लागेमा माथि कागती पुतलीको रोकथाम गर्न प्रयोग गरिएको विषादी छर्न सकिन्छ । त्यस बाहेक मेटासिष्टक्स २५ प्रतिशत झोल १ एम.एल. वा डिमेक्रन झोल १/३ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

३) कल्ले किरा (Scale Insects)

क्षति: पात र डाँठ चुस्ने, विरवा रोगाउने, फल लाग्दैन ।

रोकथाम: मेटासिष्टक्स वा डिमेक्रन प्रयोग गर्ने ।

४) कागतीका विरवाको सिल्ला (Citrus Psylla)

क्षति: माउ र बच्चाले नरम हागा, कोपिला र फुलहरूबाट रस चुस्छ । लाग्ना सुक्दै जाने, पात झर्ने, बोटमा फल लाग्दैन । यसले एक प्रकारको गलियो पदार्थ निकाल्छ र पातमा लाग्छ, जहाँ एक प्रकारको कालो ढुसी फैलिन्छ । यसले Citrus Greening भन्ने भाइरस रोग सार्छ ।

रोकथाम: मेटासिष्टक्स वा डिमेक्रन प्रयोग गर्ने ।

५) अन्य किराहरू: डाँठको गबरो, सेतो झिङ्गा, लाही, सुलसुले, रातो कभिला माथि ।

कटहर

१) मुनामा लाग्ने गबारो (Shoot Borer): यसले कटहरका मुना, फुलका कोपिला र कलिला फलहरूमा आक्रमण गर्छ ।

रोकथाम: कटहरमा मुना र फुलका कोपिला पलाउन थाले पछि ७ देखि १० दिनको फरकमा २/३ पटक मेटासिड/फोसिथायन झोल १ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) रूखको बोक्रा खाने लार्भा (Bark Eathing Caterpillar): कटहरका मुल स्तम्भ र हाँगाका बोक्रा खान्छ र ढुलो पारेर भित्र बस्छ ।

रोकथाम:

- यो किराले रूखको बोक्रामा बनाएका सुरङहरू नष्ट गर्ने र तिनमा फेला परेका लार्भाहरूलाई मार्ने ।
- सिरिज्जको सहयोगले लार्भाले डाँठमा बनाएका प्वालहरूमा पेटेल मढितेल जस्ता कुनै पनि किटनाशक विषादी पानीमा घोलेर भित्र हालिदिने र ढुलोको मुख गिलो माटोले ढालिदिने ।

३) काण्डमा लाग्ने गबारो (Stem Borer)

४) मिलि वग

५) रातो कर्मिल: सबैमा आँपमा जस्तै प्रविधि अपनाउनु पर्दछ ।

अमिलो जातका फलफुल (Citrus) (कागती जातका फलफुल)

१) कागती जातका विरवाको पुतली (Lemon Butterfly)

क्षति: लार्भाले विरवाका पात खान्छन् । धेरै आक्रमण भएमा विरवा नाश हुन्छ । विरवाको सानो अवस्थामा बढी दुब दिन्छ ।

रोकथाम:

- लार्भाहरू हातले टिपेर नष्ट गर्ने ।

- ढुलो विरवारूमा यदि कथामको जरुरत परेमा मोनोक्रोटोफस वा थायोडिन वा डिमेक्रन १ देखि १ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) कागतीका विरवाको पात हने किरा (Citrus Leaf Miner)

क्षति: लार्भाहरूले कलिलो पात छोटलेर भित्र पस्छन् र सुरङ बनाएर हरियो भाग खाँदै अगाडि बढ्छन् । लार्भाले यसरी खाइसकेको ठाउँ सेतो पातलो चम्कने कागज जस्तो देखिन्छ र पातमा बाझाटिङ्गा (Zigzag) सुरङ देखिन्छन् । यो किरा लागेको पात खुम्चिन्छ, पहेँलिदै जान्छ र कालान्तरमा झर्दछ । यसरी रोगाणुको णामा Citrus Canker नामक रोग पनि छिदै लाग्छ ।

रोकथाम:

- मसिनो विरवामा यो किरा लागेका पातहरू टिपेर नष्ट गर्न सकिन्छ ।
- यो किरा धेरै लागेमा ढेरै कागती पुतलीको रोकथाम गर्न प्रयोग गरिएको विषादी छर्ने सकिन्छ । त्यस बाहेक मेटासिष्टक्स २५ प्रतिशत झोल १ एम.एल. वा डिमेक्रन १/३ एम.एल./लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

३) फल्ले किरा (Scale Insects)

क्षति: पात र डाँठ चुस्ने, विल रोगाउने, फल लाग्दैन ।

रोकथाम: मेटासिष्टक्स वा डिमेल प्रयोग गर्ने ।

४) कागतीका विरवाको सिल्ला (Citrus Psylla)

क्षति: माउ र बच्चाले नरम हाँगा, कोपिला र फुलहरूबाट रस चुस्छ । लार्वा सुक्दै जाने, पात झर्ने, गोटमा फल लाग्दैन । यसले एक प्रकारको गमिया पदार्थ निकाल्छ र णामा लाग्छ, जहाँ एक प्रकारको कालो दुसी फैलिन्छ । यसले Citrus Greening भन्ने भाइरस रोग सार्छ ।

रोकथाम: मेटासिष्टक्स वा डिमेल प्रयोग गर्ने ।

५) अन्य किराहरू: डाँठको गालो, सेतो क्षिन्ना, लाही, सुलसुले, रातो कर्मिला आदि ।

१२१. गहुँमा लागने मुख्य शत्रुहरू र तिनीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू

गहुँ बालीमा लाग्ने मुख्य शत्रुहरूमा रोग, किरा र झार पनि पर्दछन् । गहुँ बालीमा लाग्ने मुख्य किरा एवं मुसा नियन्त्रण गर्ने सकिन्छ । भण्डारण गर्नु अघि गहुँलाई राम्रो संग ३/४ दिन घाममा सुकाउने । भण्डारण गर्दा गहुँको चिसाना १२ देखि १३ प्रशित भन्दा बढी हुनु हुँदैन । राम्रो संग सुकेको गहुँलाई बन्द टीन, ध्याम्पो, सीडविन, माटो वा अन्य भकारीमा राख्ने र पोलिथिन पाइपको सहायताबाट तल्लो भागमा पुग्ने गरी सल्फर १ चक्की प्रति व्हीन्टलका दरले हावा ओहोर दोहोर नहुने गरी बन्द गर्ने । सेल्फस प्रयोग भएको कोठामा मानिस वा पशु पंक्षी निषेध गर्ने । प्रत्येक ३ हप्तामा २० भाग गहुँमा १ भाग वानस्पतिक बिषहरू (निम/बकाइनोको गेडा, दामपाते पिर, बोझो, टिमुर, तितेपाते) धुलो बनाई राखेमा किराबाट हुने क्षतिमा क्रमिक रूपले कमी आउँछ ।

रोग एवं नियन्त्रण

मुख्य रोगहरू: छैरो सिन्दुरे, पहेंलो सिन्दुरे, डडुवा, कालेपोके, धुलो दुसी आदि।

छैरे सिन्दुरे (Brown Rust/Leaf Rust)

लक्षण: स-साना गोलकार सुन्तला वा छैरो रङ्गका फोकाहरू पातको माथिल्लो सतहमा छिरिदिइएर निस्केको देखिन्छ । खास गरी पात र पातको मुन्तीरको डाँठमा उक्त रोगको लक्षण देखिन्छ । पाक्ने बेला पातको तल्लो पट्टि पनि हुन्छ । यो रोग विशेष गरी तराईमा बढी पाइन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- रोग अवरोधक जात लगाउने: भुकुटी, यु.पी.-२६२, बी.एल.-११३५, रोहिणी, अच्युत, त्रिवेणी आदि ।
- गहुँ छर्ने समयमा हेरफेर गर्ने । १० देखि १५ दिन अघि जोत्ने ।
- सन्तुलित मलखाद प्रयोग गर्ने ।
- सन्तुलित सिचाई दिने ।
- रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने:
- डाइथेन एम.-४५-विषादी ३ ग्राम प्रति लिटर पानी मिसाएर ३/४ पाइप छरेमा केहि कम हुन्छ ।

- हाल वाइलेटन विषादी २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर १/२ पटक छर्नाले रोग पुरा नियन्त्रण भएको छ तर शुरुमा नै छर्नु पर्दछ।
- Blixox-५० उही मात्रामा प्रयोग गर्ने ।

पहेंलो वा धर्म सिन्दुरे (Yellow or Stripe Rust)

लक्षण: पातको माथिल्लो सतहमा स-साना लाचिलो र पहेंलो फोकाहरू एक धर्को संग जोडिएर लामा पहेंला धर्साहरू देखिन्छन् । प्रकोप बढेमा जरा बलिक सबै ठाउँमा ढाक्छ । पाक्ने बेलामा पातको तल्लो भागमा काला लामा धर्सा देखिन्छन् । बढी पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छन् ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- रोग अवरोधक जात लगाउने: अन्नपूर्ण १, अन्नपूर्ण ३, नेपाल २९७, पासाङ ल्ताम, कान्ति आदि ।
- ठीक समयमा गहुँ लगाउने: मंसीर दोभो हप्ता सम्म छर्ने (पहाडमा) ।
- सन्तुलित मात्रामा रासायनिक मल राख्ने । रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने: वाइलेटन १/२ ग्राम प्रति लिटर पानीमा वा प्वाण्टोथ्याक्स २०, २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई रोग लान शुरु भए पछि १/२ पटक छर्कनाले यो रोग पुरा नियन्त्रण हुन सक्छ। Blixox प्रयोग गर्ने ।

मालो पोके (Loose Smut)

लक्षण: गहुँमा बाला निस्के पछि उक्त बालामा दाना लाग्नुको सट्टा कालो रङ्गको धुलो दुसी सानो झिल्लीले ढाकिएर रहेको हुन्छ । जब हावा चलन भएछ उक्त झिल्ली फुटी सारा दुसीको धुलो बीजाणु वरपर फिजिन्छ र पछि गहुँको डाँठ मात्र बाँकी रहन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- रोग अवरोधक जात लगाउने: पहाडको लागि मात्र अन्नपूर्ण-४ ।
- रासायनिक विषादीद्वारा बिजारोपण गर्ने: भाइटाथ्याक्स २०० वा बेभिस्टीन वा भाइटाथ्याक्स ७५, यस मध्ये भाइटाथ्याक्स २०० वा बेभिस्टीन २ ग्राम प्रति किलो बीउका दरले उपचार गरी छर्ने । यस भन्दा पनि भाइटाथ्याक्स ७५, ३ ग्राम प्रति किलो बीउका दरले उपचार गर्दा अझ प्रभावकारी देखिन्छ ।

पुसी रोग (Powdery Mildew)

लक्षण: पातको माथिल्लो सतहमा देखिन्छ । सेतो भिषेको हुलो जस्तो हुसीको त्यानन्दा र जीवाणुहरू बोट ठिड्गिएका र वद्वन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- रोग अवरोधक जात लगाउने: अच्युत, बी.एल. १४७३, बी.एल. ११३५ आदि।
- कम बीउ दर राख्ने ।
- रासायनिक विषादी छर्ने: क्याराथेन १।२ मि.लि. प्रति लिटर पानी मिसाएर २/३ पटक छरे कम हुन्छ ।

इडुवा रोग (Foliar Blight)

लक्षण: पातमा अण्डाकारका लाम्चा थोप्ला, खैरो वा गाढा खैरो, बीचमा हल्का रङ देखिने र यी थोप्लाहरू बढ्दै गे एक अर्को सँग जोडिदै हुलो थोप्लामा परिणत हुन्छ । अन्तमा पात नै पुरा सुकेको वा डढेको जस्तो देखिन्छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण:

- रोग अवरोधक जात लगाउने: अन्नपूर्ण १, अन्नपूर्ण ३, (पहाडमा), र भुगोल
- NL-२९७, BL-११३५, BL-१४७३ आदि ।
- ठीक समयमा गर्नु छर्ने ।

रासायनिक विषादी छर्ने:

- रोग देखिना साथ डाइथेन एम-४५ विषादी २ ग्राम प्रति लिटर पानी
- मिसाई १५ दिनको फरकमा २/३ पटक छर्ने ।
- टिल्ट (२५० इ सी) पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कालो सिन्दुरे (Stem Rust/Black Rust)

लक्षण: डाँठमा लाग्ने शुरुमा चरिक्लो रातो थोप्लाहरू पछि कालोमा परिवर्तन

रोकथाम: पहुँलो सिन्दुरेमा जस्तै गर्ने । झारपातको हकमा सके सम्म विषादी प्रयोग नगरी उखेलेर फाल्नु पर्छ । विषादी प्रयोग गरेमा चाँडै पातको माथि १ किलो २, ४-डी ५०० लिटर पानीमा मिसाएर १ हेक्टर जमिनमा ५० देखि ४० दिन भित्र छर्ने । साँघुरो पातमा टोल्कान पनि उही छर्ने ।

भाप (Mango)

का) भाप (Anthracnose): यो एक हुसीबाट हुने रोग हो । शुरुमा कलिले पातमा, डाँठमा र फुलमा र त्यसपछि फलमा यसको Symptoms देखिन्छ फलमा काला धब्बाहरू देखिन्छ र पछि यी धब्बाहरू बढ्दै गएर पुरै फल कालो दागी हुन्छ । र पछि कुहिन्छ । पातमा धेरै काला तथा धब्बाहरू बढ्दै गएर पछि पुरै पात डढ्छ । गरिभ अथवा आर्द्रता बढी भएको वेलाभा रोगहरू छिटो फैलिन्छ । साना फूलहरूमा बढी यो रोग लाग्छ र प्याहरू मर्ने र फुलहरूमा Blight देखिने हुन्छ ।

रोकथाम:

- समयमा सन्तुलित मल तथा पानीको व्यवस्था गर्ने ।
- रोगी बीजाहरू काटेर जलाइने तथा रोगी फलहरू गाड्ने ।
- २ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा Blitox राखेर Spray गर्ने अथवा १ प्रतिशत Bordeaux mixture छर्ने ।

का) भापको हुली रोग (Powdery Mildew): यो रोग एक हुसीबाट हुने रोग हो (Oidium Mangiferae): यो हुसी लागेपछि पातमा, फुलमा, फलमा भाँप हुलो देखिन्छ । फुलेका टुप्पामा पहिले सेतो दाग देखिन्छ । पछि तल भाँप भागहरूमा यो हुसी फैलदै जान्छ । पछि यसले पातलाई हल्का खैरो र भाँपको र केही दोब्रेको हुन्छ ।

रोकथाम:

- रोगी भागहरू काटेर जलाइदिने, बगैँचाको सरसफाई गरिराख्ने ।
- Karathane २ एम.एल./ १ लि. पानीमा मिसाएर १५ दिनको फरकमा छर्ने ।

का) भापको विकृती रोग (Malformation): यो एउटा जटिल रोग हो । यो रोग Funigus वाट पनि हुन्छ । यसमा लाग्ने Funigus Fusarium blight हो । यो हुसीले पुरै फुलको भागलाई फल नलाग्ने र रोगी भागहरूको भागमा परिवर्तन गर्दछ । कहिले काहीँ ती भागबाट फुलको सट्टा भाँप पातहरू विकसित हुन्छ ।

रोकथाम:

- रोगी भाग काटेर जलाई दिने र बगैँचाको सरसफाई गर्ने ।
- Blitox-५० लाई २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर ७ दिनको फरकमा छर्ने ।

- सुलसुलेहरू लागेको भए मोनोकोटोफस २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने (१२ दिनको फरकमा २/३ पटक) ।

घ) आफ्नो फलको टुप्पा कालो हुने रोग (Black Tip or Mango Necrosis): धुवाँ अथवा चिम्नीबाट निस्कने पदार्थबाट हुने रोग हो फलको टुप्पाको कालो दाग देखिन्छ । पछि बढेर टुप्पा पुरै कालो हुन्छ ।

रोकथाम:

- बोरेक्सको कभि भएको ठाउँमा यो देखिने हुनाले Borax 2gms/Li या water मा राखेर Spray गर्नु पर्दछ ।
- फल ३-४ cm साइजको भए पछि Borax २ र ३ पटक छर्नु पर्दछ ।

ङ) आफ्नो कालो हुसी रोग (Sooty Mould): यो रोग एउटा हुसीबाट हुने रोग हो (Capriodium ramosum): यो हुसी विरवाको कोट तथा तलु भित्र नछिरी विरवा रोगाउँछ । यसले पातमा Nopper, Scade insects आदिले खाएर दिसा गरेको ठाउँमा यो हुसी विकसीत भई पातको हरियो भाग ढाकेर बत्नाले विरवाले खाना बनाउने काम गर्न सक्ने र विरवा रोगाउँछ ।

रोकथाम: Sooty Mould लागेको आफ्ना किरा मार्ने कुनै पनि विषादी ७१० दिनको फरकमा २ देखि ३ पटक छर्ने ।

केरा (Banana)

क) Wilt of Banana या Panama Disease (केराको बोट ओइलाउने रोग): यो केराको मुख्य रोग हो । यो Fusarium oxysporium pv. Cubensis भन्ने हुसीबाट हुन्छ । यो पहिले पुराना पातहरूमा देखिन्छ । पुराना पातहरूमा पहुँलो दाग र धर्साहरू देखिन्छ । पछि ती पातहरू छेउबाट बिचतिर पुरै पहुँलिएर जान्छ । कलिला पातहरू हरियो, ठाडो परेको र नबढ्ने हुन्छ । पछि पातहरू ओइलाउने र पुराना पातहरू भिचिएर लत्रीने हुन्छ । धेरै लागेको बेला पुरै बोट ओइलाई, कम्भवतज हरू कतभ बाट छुटिन्छ । कतभ (बोट) भित्र काटेर हेर्दा हल्का खैरो किसिमको रोग देखिन्छ र जराहरूमा पनि खैरा दागहरू देखिन गई कुहिन थाल्छ ।

रोकथाम:

- रोगी बोटको गानो पुरै उखेलेर जलाई दिने उखेलेको ठाउँमा माटो खनेर १ भाग लाइम(चुना), ३ भाग माटो मिसाई सो खाडलमा अर्को गाना लगाउने ।

- यो रोग लागेको ठाउँमा कस्तीमा ३ वर्ष सम्म केरा नलगाई अरु बालीहरूमा लगाउने (धुम्ले बाली प्रणाली अपनाउने) ।
- गानो (सकर) लगाउँदा रोग नलागेको ठाउँबाट लगाउनु पर्दछ ।
- बगैँचामा खनजोल, गोडमेल र सिँचाई गर्दा जरामा चोट पुऱ्याउनु हुँदैन । जराबाट हुसीको बिजानु भित्र पसी विरवा रोगी बनाउँछ ।
- Bavistin 2gms/Li या Water मा मिसाई १० दिनको फरकमा २/३ पटक छर्ने

रोकथाम:

- रोगी पात काटेर जलाई दिने र बगैँचाको सरसफाई गर्ने ।
- Dithane-४५ अथवा Bavistin २ g/Li या water मा राखेर ६-१० दिनको फरकमा २-३ पटक छर्ने ।

ग) Bunchy Top (केराको बोटको टुप्पामा झुप्पा हुने रोग): यो भाइरसबाट हुने रोग हो । यो भाइरस रोगी बोटबाट निरोगी बोटमा Penhalonia nigronovosa भन्ने एफिडबाट सर्दछ । यो रोग लागेको केराको बोटको टुप्पोमा पातहरू कुच्चो जस्तो झुप्पा परेको हुन्छ । पातको छेउहरू बिस्तारै माथि तिर फर्केको हुन्छ र पातहरू ठाडो परेको, सुानो भई पहुँलिन्छ ।

रोकथाम:

- बगैँचाको सरसफाई गर्ने, रोगी ठाउँको सकर प्रयोग नगर्ने ।
- किरा मार्ने विषादी मोनोकोटोफस २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।

फटहर (Jackfruit)

क) Leaf spot disease (पातको थोप्ने रोग): यो रोग Collectotrichum Langenarium भन्ने हुसीबाट हुन्छ । यसले पातमा गोलाकार, ठुला, कालो खैरो किसिमको दाग बनाउँछ । उक्त दागको आकार १० देखि ३० मिलिलिटर सम्म हुन्छ । यो रोग बढी लागेमा पुरै पात डढेर झर्दछ ।

रोकथाम:

- रोगी पातहरू टिपेर जलाई दिने । बगैँचाको सरसफाई गर्ने ।

- Blitox-५०, 2gum/L. या water मा अथवा Bordeaux mixture १%, ६-९ times एक मौसम भरि छर्नु पर्छ ।

सुन्तला जातका फलफूल (Citrus Fruits)

क) Citrus gummosis: यो दुसीबाट हुने रोग हो । यो Phytophthora Poraiiica भन्ने दुसीबाट हुन्छ । बोक्राको मरेको भाग मक्कीएको रूपमा हुने र गुदे निस्कने, रोग लागेको भागमा काठ र म्यानीयमको पातलो तह छैरो हुन्छ पछि त्यो भाग मर्दछ र बोक्रा फुट्दछन् । यसबाट फेद कुहिन्छ र त्यही लक्षण माटो मुनि हुँदा फुटरट भनिन्छ।

रोकथाम:

- टाइफोलिएट ओरेन्ज जस्ता रोग अवरोधक रटस्टक माथि विरवा कल्मी गर्नु पर्दछ ।
- विरवा सेपे पछि फेदमा कम्तीमा २० से.मी. उचाई सम्म बोर्डोपेस्ट लगाइदिनु पर्दछ ।
- बोट वरपर Blitox-५०, २ ग्रा./लि. पानीमा राखी से गर्ने ।

ख) Anthracnose Wither Tip: यो Colletotrichum gnosporiodes भन्ने दुसीबाट हुन्छ । नयाँ तथा मसिना हागाहरूको टुप्पा सुक्ने र गम्भिर अवस्थामा नयाँ हागाहरू पात बिहिन हुन्छन् र मर्छन् । रोगले फलको भेटुको टुप्पामा आक्रमण गर्दछ । फलस्वरूप फलहरू मर्दछन् । यसले फल माथि छैरो वा कालो दाग पैदा गर्दछ ।

रोकथाम:

- रोग लागेका हागाहरूलाई काटछाँट गरी नष्ट गरिनु पर्दछ र काटिएका घाउहरूमा Bordo Paste लगाउनु पर्दछ ।
- डाइथेन् एम-४५, २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा घोली छर्नु पर्दछ ।

ग) Citrus Canker (Bacterial disease): यो रोग Xanthomonas citri नामक ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ । पात, डाँठ, फल र फलको भेटुमा यो रोग लाग्दछ । रोगको शुरुको लक्षण आलपिनको टाउको बराबरको वा सानो, पानीले भिजेको, चम्किलो र उठेको दाग देखिन्छ । दागहरू विस्तारै ठुलो हुँदै छैरो हुन्छ । फल माथिको दाग बोक्रामा मात्र सिमित हुन्छ । तर फलको वजार मुख्य धेरै कम हुन्छ ।

रोकथाम:

- रोग लागेका सम्पूर्ण रूखहरूलाई नष्ट गर्ने ।

- सुख्खा मौसममा बोटको रोग ग्रस्त भागलाई काटछाँट गरी जलाइदिदा रोगको श्रोतलाई कम गर्न सकिन्छ ।

- Blitox-५०, ३ ग्रा./लि. पानीमा मिसाएर बोटमा छर्ने ।
- Plantomycin १ ग्रा./लि. पानीमा मिसाएर छर्ने ।

घ) Citrus Greening: यो रोगका कारण शुरुमा विषाणु भनियो । पछि बसलाई Myer plasma भनियो र अरु अनुसन्धान पछि यस रोगजनक जीवलाई Reckesia Likeorganism (RLO) भनी वर्गीकरण गरियो । हाल यसलाई Phloem Limiting Bacteria or PLO भनी पहिचान र नामाकरण गरियो । यो रोग Citrus Psylla(Diaphorina Citria) र अन्य किराहरू द्वारा सार्छ । नर्सरीको नयाँ विरवा देखि वयस्क रूखहरू सबैमा यो रोगको आक्रमण हुन्छ । रोगी हागा वा पुरै बोट पहेँलिन र पातहरू छिरीबिरे हुने लक्षणहरू आउँछ । पातको पहेँलो भागमा साना हरिया थोप्पा वा टप्पु देखा पर्दछन् । मध्य भागहरू पनि पहेँलिएका देखिन्छन् । रोगाएका पातहरू झर्दछन् र हागा मर्छन् । बोट टुप्पाबाट मर्दछ ।

रोकथाम:

- रोगी रूखबाट लिएको Root Shock प्रयोगमा नियन्त्रण आवश्यक छ।
- किटनाशक विषादीद्वारा Citrus Psylla को नियन्त्रण गर्ने ।

पाउ (Apple)

ग) Powdery Mildew (सेतो धुले रोग): यसको प्रकोपले माथिल्लो भाग सेतो धुलो छोपिएको हुन्छ । यो नर्सरीमा बढी देखिन्छ । नर्सरीको पुरै बोट पुरै दिन्छ । यो रोग चैत्र वैशाखमा जब पालुवा लाग्दछ, त्यसै समयमा यो हागाई सुहाउने मौसम हुन्छ ।

रोकथाम:

- पालुवा लाग्ने समय हुने बेलामा क्याराथेन भन्ने द्रव्य विषादी १/२ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई ६ देखि १० दिनको फरकमा छर्ने ।
- फुलको पत्रहरू धेरैपछि Bavistine २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्काले यो रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

ख) दाद (रोग): यो रोग पात फल दुवैमा लाग्छ । पातमा हल्का जैतुनी रङ्गको गहिरो दागहरू नैसाख जेठ महिना देखि देखिन्छ भने फलमा यसै दाग अन्तिम असाढ श्रावण महिना तिर देखा पर्छ । पछि यी दागहरू पुरा कालो रङ्गमा परिवर्तन भएर जान्छ ।

रोकथाम:

- जमिनमा राखेका रोग ग्रष्ट पातहरूलाई जम्मा गरी जलाउने ।
- असोज कार्तिक महिनामा भुईँ र रुखमा भएका पातहरूमा गुरिया मल ५ प्रतिशतका दरले छर्ने ।
- Dithione: ४५ वा Bavistine २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा भिसाई छर्ने ।

ग) फेद कुहिने रोग (Collar Rot): यो रोगले स्याउको बोटको फेद, ठीक जमिन माथिको भाग वा तलको भागलाई असर गर्दछ । यस रोगले साधारण तया १५ वर्षको उमेर काटीसकेको बोटलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ । रोगी बोटहरू बढ्न सक्दैन, पातहरू खैरो वा पहेँलिनन्छ र पात समय भन्दा अगाडि झर्दछ । यो रोगले तापक्रम २५°C वा सो भन्दा माथि गएमा र माटोमा धेरै चिस्यान छ भने बोटहरूलाई असर पार्दछ ।

रोकथाम:

- रोग लागेको बोक्रा जति चक्कु वा अन्य धारीलो हतियारले छुर्केर फाल्ने ।
- बोक्रा छुर्केको भाग जतिमा मिलोटुथो १ किलो, जुना २ किलो र पानी ५ किलोको लेप बनाई लगाउने । यो काम फागुन मध्यदेखि चैत्र मध्यसम्म १ पटक र भदौ मध्यबाट असोज मध्यमा अर्को पटक दोहोर्‍याई लगाउने ।
- रोगी बोटको परिपरि आउने झारपातलाई तत्काल हटाउने ।
- २ प्रतिशत को बोर्डो मिश्रण वा डाइथेन एम ४५ को घोल चैत्र र भदौमा प्रतिबोटका दरले बोटको वरीपरि राखी दिनले पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

सकेसम्म कलमी विरुवा प्रयोग गरौं । चाँडै फल्नुका साथै यसका विभिन्न अन्य फाइदाहरु छन् ।

१२३. फलफूल तथा तरकारी नर्सरीमा लाग्ने मुख्य मुख्य रोग र किरा व्यवस्थापन

पानीविरुवा लगायत झारपातहरू नै रोग र किराको आश्रय प्रक्षेपको लागि प्रमुख स्थान हुन् । बाली विरुवा मध्ये पनि फलफूल र तरकारी बाली अन्य शाखान्त बालीहरू भन्दा कमलो स्वभावका हुने भएकोले किराहरूले बढी मन पार्दछन् । फलस्वरूप: किराहरूको आक्रमण पनि बढी हुने गर्दछ । फलफूल प्रकारी नर्सरी उत्पादनमा किराहरूले परिमाणान्तरक साथै गुणात्मक क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ । फलफूल र तरकारी नर्सरीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने किराहरू दुई समुह हुन्छन् ।

- माटोमा वा माटो मुनि बसेर क्षति पुर्‍याउने,
- बोटमा नै बसेर बालीलाई क्षति पुर्‍याउने ।

माटोमा वा माटो मुनि बसेर क्षति पुर्‍याउने मुख्य मुख्य किराहरू:

१) रातो कभिला (Red Ant):

- रातो कभिलाले नेपालको मधेश देखि मध्य पहाडसम्मको जलवायुमा निकै क्षति पुर्‍याएको देखिएको छ ।
- रातो कभिला जमिन मुनीको लगभग ४/५ हातको गहिराईमा गोलो बनाई बस्छन् । गोलाबाट निस्की माटो मुनि नै बसेर बाली विरुवाको जरा तथा डाँठको बोक्राहरू खाइदिन्छन् । जसले गर्दा माटोबाट लिएको खाद्य तत्वहरू र पानी माथि बोटमा सर्न नपाई शुष्कता दिनमा विरुवाहरू ओझलाउने र रातमा सामान्य देखिने गर्छन् ।

- प्रकोप बढ्दै गएको खण्डमा सम्पूर्ण विरुवाहरू ओझलाई मरेको देखिन्छ । विरुवाहरू सजिलै सँग उखेल्न सकिन्छ र भदौ पहेँलिदै गरेको बोटको वरीपरि माटोमा खोतली हेर्दा रातो कभिलाको आक्रमण जरा र डाँठमा बढि भएको देखिन्छ ।

२) भुसे किरा (White Grub):

- भुसे एक प्रकारको वयस्क खपटे किरा हो । यो गाढा खैरो रङ्गको हुन्छ । यो काँचो गोबर गुपारेको ठाउँमा फुल पार्दछ । फुलबाट निस्केको बन्वाहरूलाई भुसे भन्दछौं । यो गोबरमा नै हुर्की बस्छन् ।

भुसे रातो टाउको भएका नौनी जस्ता सेता रङ्गका र प्रायः हसिया आकारका हुन्छन् । यो माटो मुनि वा माटोमा बसेर जरा तथा कमलो डाँठ खाइ दिन्छन् । जसको फलस्वरूप विरुवाहरू मर्ने र ढल्ने पहेँलिने गर्दछन् । यो प्रायः मध्य पहाडी क्षेत्र जहाँ काँचो गोबर मल प्रयोग हुने ठाउँमा बढी प्रयोग गर्दछन् ।

३) फेद काटने किरा (Cut Worm): यो किराको वयस्क अवस्था खैरो अथवा खरानी रङ्गको पुतली हुन्छ । पुतलीको अगाडिको भाग ध्वसि रङ्गको हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा कालो दाग तथा पछाडि हल्का सेता रङ्गका हुन्छन् । पोथी फुलबाट ध्वसि रङ्गकै लार्वाहरू निस्कन्छ । यिनको शरीरमा काला काला धर्साहरू देखिन्छ । यी लार्वाहरू माटोको सतहको डाँठ वा माटो मुनिको डाँठ काटेर विरवाहरूलाई ढलाइदिन्छ । यिनीहरू प्रायः तरकारी नर्सरी बालीको कलिला नर्सरी बेनीहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछन् ।

रोकथाम:

- कचो गोबरको मल तरकारी तथा फलफुल नर्सरीमा प्रयोग गर्नु हुदैन ।
- नर्सरी बारीको वरपरको आश्रय प्रश्रय दिने झारापातहरू हटाउनु पर्दछ ।
- सिचाई गर्नाले यो किराहरूको नियन्त्रण हुन्छ ।
- फेद तथा खुमे नर्सरीमा किराको प्रकोप हुने जग्गामा गहिरो जोताई गरी केहि दिन छाडि हिँदा लार्वा किराहरूलाई केहि शिकारी किराहरूले खाइ दिन्छन् ।
- तरकारी नर्सरीमा प्रकोप देखिएमा सुतीको झोल/निमको झोल मार्गोसम काउली बन्दाको नर्सरीमा २/३ एम.एल. प्रति लिटर झोलमा नर्सरीमा छर्ने ।
- Chloropyrifos, डर्सवान, K:Chloro 2ml/L of water बेनीमा स्त्रे गर्ने ।

यदि बोटविरवामा लागेको छ भने १ र २ ml झोल/लिटर पानीमा बोटको वरिपरि स्त्रे गर्ने ।

बोटमा बसी तरकारी बालीमा क्षति पुर्‍याउने मुख्य मुख्य किराहरू:

१) लार्वा किरा (Aphid):

- यो किरा हल्का हरियो खैरो तथा हल्का कालो रङ्गको हुन्छ ।
- फुलबाट एकै चोटी बच्चा निस्कने भएको हुँदा बच्चा र माउको रूप उल्टै देखिन्छ ।
- यिनीहरू पात र कमलो डाँठ तथा फलफुलबाट रस चुसेर खाने भएको हुन्छ ।
- विरवाहरूलाई कमजोरका साथै गुणस्तमक क्षति पुर्‍याउँछन् ।
- यिनीहरू एक प्रकारको गुलियो पदार्थ छाड्ने गर्छन् र कभिलाहरू गुलियो पदार्थको लार्वाले घुमेका हुन्छन् । कभिलाहरूले आक्रमण गरेको देखिन्छ ।
- यो भाइरस सार्ने काम गर्दछ ।
- यो पातमा रस चुसेर खाँदा पात डड्ने र सुक्ने गर्दछ ।

२) बन्दाको पुतली:

- बन्दाको सेतो पुतलीको वयस्क अवस्था नै सेतो पुतली हो ।
- सेतो पुतलीको पखेटामा दुई काला थोप्ला हुन्छन् ।
- लार्वा फुलबाट निस्के पछि हरियो निलो हरियो रङ तथा डाँठमा तीन पहेला धर्साहरू भएको हुन्छ ।
- शरीरमा साना साना झुस र काला दागहरू हुन्छन् ।

- यी लार्वाहरू काउली समुहमा पर्ने तरकारीको बेनी तथा फलमा प्वाल पारी क्षति पुर्‍याउने गर्दछन् । जसले गर्दा पातमा प्वाल बढ्दै जाँदा विरवाको सम्पूर्ण पात नष्ट भई नशा मात्र बाँकी रहन्छ ।

सुतीको लार्वा (Tobacco Caterpillar):

- यो वयस्क अवस्थामा खैरो रङ्गको र पखेटामा खैरो धर्साहरू भएको पुतली हो ।
- लार्वा मैलो वा खैरो र शरीरमा टाउको देखि अन्त सम्म समानान्तर सुन्तला रङ्गका पाँच धर्साहरू देखिन्छ ।
- यी लार्वाहरू पातमा प्वाल पारी खाइदिन्छन् । काउली र बन्दा समुहमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको व्यापक आक्रमण देखिन्छ ।

इटबुडे पुतली (Diamond Back Molt):

- यो पुतली सेतो रङ्गको हुन्छ ।
- पखेटा भिलाई बस्त्रा पछिल्लो भाग अलि माथि उठेको र ढाडमा तीन वटा ईटबुडे आकार देखिन्छ ।
- यिनको लार्वाहरू हल्का हरियो रङ्गका र शरीरको मुख र अन्ततिरको भाग तिखारिएको चुच्चो परेका हुन्छन् । यिनीलाई छोइदिदा चलमलाई बोटबाट भुईँमा खसिहाल्ने प्रकृतिका हुन्छन् ।
- यी लार्वाले पातको हरियो भाग खाने र अन्तमा पातमा विभिन्न आकारका प्वाल प्वाल बनाउँछ ।

थ्रिप्स (Thrips):

- यो वयस्क अवस्थामा पहेलो पहेलो रातो रातो रङ्गको मसिनो किरा हुन्छ । यसको पखेटाहरू फाटिएको तथा झालर जस्ता हुन्छन् । यिनीहरू फुर्रर उडेको देखिन्छन् ।
- यिनीहरूले पात तथा फुलमा कोत्रे खान्छन् ।
- लसुन, प्याज, मुला, गाजर, सलगम बालीमा आक्रमण गरेको भेटिन्छन् ।
- नर्सरी बारीमा किरा आउन शुरु गरेका छन् वा छैनन् भन्ने अठोट गर्न केहि पुतलीहरूको लागि फेरोमोन द्रव्य वा लाइट द्रव्य (पासो) प्रयोग गर्ने ।
- समय समयमा बालीहरूको निरीक्षण गर्ने ।
- लार्वाहरू देखिएमा लार्वाको परजिवीहरूको प्रयोग गर्ने ।
- Mabusap/ Econem २-३ एम.एल./लि. पानी प्रति वर्ग मिटर नर्सरीमा छर्ने ।
- म्यालाथिन ५० सिसि र थायोडान ३५ इ.सी.को झोल १.५ एम.एल./लि. पानीमा स्त्रे गर्ने ।
- इटबुडे पुतलीलाई जैविक विधिबाट पनि नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक हुने देखिएको छ । जस्तै: कोटोसिया प्लुटेनी नामको परजिवि किरा किट विज्ञान महाशाखाले उत्पादन गरेको छ । जसमा १०० देखि १५० वटा सम्म प्युपा प्रति सेपनीका दरले छाडो दिएमा नियन्त्रणमा आएको छ ।

१२४. तैल बालीमा लाने मुख्य शत्रुहरू र तिनको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका उपायहरू

तैल बालीमा लाने मुख्य शत्रुहरू निम्न अनुसार वर्णन गरिएको छ ।

तोरीको करैते शिक्षाको गाजले लार्भा

पहिचान: वयस्क माउ घरायसी शिक्षा जस्तै हुन्छ र करिब १० मिलि मिटर लामो हुन्छ । टाउको र पखेटाहरू कालो तर शरीर पहेँलो हुन्छ । लार्भा २५ मिलि मिटर लामो र गाजले हुन्छ । लार्भालाई छुँदा आफैँमा बेगिएर भुईँमा झर्छ ।

क्षतिको प्रकार: कलिलो अवस्थामा लार्भाहरूले आक्रमण गर्दछ । विहान र साँझ पख बढी आक्रमण गर्दछ ।

नियन्त्रण:

- संक्रामक आक्रमणको अवस्थामा गाजले लार्भाहरूलाई हातले टिप्ने ।
- B.M.C. दुलो (१०%) २० किलो/हेक्टर मालाथिन ५० ई.सी. २ मि.लि. लिटर पानीमा ।
- फोलिथियन ५० ई.सी. २ मि.लि. लिटर पानीमा छर्ने ।
- यसबाट तोरीको जस्तै तैलबालीहरूमा किराको राम्रो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

रद्दी चन्नी चुसाहा

पहिचान: वयस्कको अधिल्ला प्वाँखहरू चम्किलो, कालो र रातो हुन्छन् । बच्चा लार्भाहरू सानो र सुन्तला रङ्गका हुन्छन् ।

क्षतिको प्रकार: बच्चा र वयस्कहरू पातहरूबाट र कोशाहरूबाट रस चुस्छन्, जुन पहेँलिएर सुक्छन् ।

नियन्त्रण: फोलिथियन र मालाथिन १ एम.एल./लिटर पानीमा छर्ने ।

तोरीको लाही

पहिचान: यी विरवाहरूको जुम्राहरू साना नरम शरीरवाला र हल्का पहेँलो देखि हरियो रङ्गका हुन्छन् । यसको आकार करिब २.५ देखि ३ मि.मि. लामो हुन्छ । पखेटा भएका र नभएका दुवै थरी हुन्छन् ।

क्षतिको प्रकार: बच्चाहरू र माउहरू असंख्य हुन्छन् । र फुलहरूलाई क्षीण र कोशाहरूबाट ढाक्छन् । तिनीहरूले पातको तल्लो भागबाट बोटको चुस्छन् ।

नियन्त्रण: मेटासिस्टस २५ ई.सी. २मि.लि./लिटर पानीमा वा डिमेकमन १०० ई.सी. २ मि.लि./लिटर पानीमा विषादी छिट्टेने काम १० देखि १५ दिनमा पुनः दोहोर्‍याउनु पर्दछ ।

क्षारी किरा

पहिचान: फुल फुल्ने अवस्था र त्यसपछि बाली नपाकेसम्म ठूलो हुलमा आक्रमण गर्छन् ।

क्षतिको प्रकार: पातहरू बटाँरिन्छ, बोट ठिमुकिन्छ, कोशाहरू चाउरीन्छ र फुलहरू विकसीत हुँदैन । तिनीहरू गुलियो थोपाहरू चुहाउँछन् ।

नियन्त्रण: ३/४ पटक जति १० देखि १५ दिनको फरकमा मालाथिन र फोलिथियन झोल औषधि छर्ने ।

बन्दागोभीको पुतली

पहिचान: बन्दागोभीको पुतली सेतो हुन्छ । त्यसको शरीर २०मि.मि. लामो हुन्छ । अगाडिको पखेटामा दुई वटा काला विन्दुहरू हुन्छन् । लार्भाहरू निलो र हरियो रङ्गका हुन्छन् र शरीरको लम्बाई भरि ३ वटा पहेँला धर्साहरू हुन्छन् । लार्भाहरूमा काला विन्दुहरू र रौहरू हुन्छन् । र शरीर करिब ४० मि.मि. लम्बाईको हुन्छ ।

क्षतिको प्रकार: बच्चाहरू छुँदा भिडभाड गरेर लार्भाहरू पात खाइरहन्छन् र मात खाएर नशाहरू मात्र बाँकी राख्छन् ।

नियन्त्रण: मालाथिन ५० ई.सी. २ मि.लि./लिटर पानीमा घोलेर तयार पारी छिट्टेने ।

भार्के खपटे

पहिचान:

- निलो-कालो पखेटाहरू भएको उफ्फने खपटे किरा हो ।
- वयस्कको आकार १.८ देखि २ मि.मि. लम्बाई सम्म हुन्छ ।
- शरीरको अधिल्लो भाग पछाडिको भन्दा कम चौडा हुन्छ ।

क्षतिको प्रकार:

- वयस्क र बच्चा लार्भा (ग्रव) ले क्षति गर्छ ।
- ग्रव माटो मुनि बसेर जरा खान्छ ।
- वयस्कले पातहरू खान्छ र प्रशस्त प्वालहरू पार्छ ।
- संक्रामक आक्रमणमा, डोँठहरू, फुलहरू र कोशाहरू पनि प्रभावित हुन्छन् ।

नियन्त्रण: विविधहरू: मालाथियन ५० ई.सी. २ मि.लि./लिटर पानीमा घोल पारी छिट्टेने ।

१२५. मकै बालीमा लाग्ने मुख्य शत्रुहरू, तिनका रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू

मकै बालीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका शत्रुहरू छन् । जसमध्ये मुख्य शत्रुका रूपमा किराहरू नै हुन् र मकै छरेदेखि भण्डारसम्म विभिन्न किसिमका किराहरूले मकैबालीमा क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ । मकै बालीमा ८/१० वटा किराहरू ज्यादै खतरनाक सावित भएको पाइएको छ । यी खतरनाक किराहरू कुन कुन हुन् ? यिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने ? मकैको कुन कुन अवस्थामा क्षति पुर्‍याउँछन् ? भन्ने कुराहरू तपसिल बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

क) मकैका कलिला बेर्ना, जरा तथा उमन लागेको बीउमा क्षति पुर्‍याउने किराहरू ।

ख) मकैको पात, डाँठ तथा अन्य भागमा क्षति पुर्‍याउने किराहरू ।

क) पहिलो समुहमा पर्ने किराहरू:

- खुम्मे (White Grub)
- धागे किरा (Wire worm)
- रिस्टेकिरा (Aeod Bed Beetle)
- फेद काट्ने किरा (Cut Worms)
- किर्यो (Field Crickler)

ख) दोश्रो समुहमा पर्ने किराहरू:

- धर्क गाबारो (Maize Borer)
- फौजी किरा (Army worm)
- फट्याङ्गा (Grass hopper)
- मकैको लाही (Maize Aphid)

पहिलो समुहमा पर्ने किराहरू

१) खुम्मे किरा: यो पहाड, तराई सबै ठाउँमा पाईन्छ । राम्ररी नपाकेको गोबर मल बारीमा हाल्ने प्रचलन भएको ठाउँमा यसको प्रकोप बढी हुन्छ ।

पहिचान: यसको लार्भा हेर्दा 'C' आकारको र खैरो टाउको र सेतो शरीर भएको हुन्छ ।

क्षतिको प्रकार: यसले मकैको कलिलो अवस्थामा खासगरी मकैका बेर्नाहरूको सहायक जराहरू खाई दिन्छ । जसले गर्दा मकैका बेर्ना पुड्का, पहेला र अरुख देखिन्छ र केहि दिन पछि मर्दछ ।

२) धागे किरा: यो सानो लाम्चो खपटे हो । यसलाई उत्तानो पारेर राख्ने भने केहि बेर पछि क्तीक आवाज गरी उफ्रेर खुट्टा टेक्छ । यो लार्भा अवस्थामा क्षति पुर्‍याउँछ ।

पहिचान: लार्भाहरू कडा शरीर भएका खैरा रङ्गका धागो जस्ता लामा हुन्छन्।

क्षतिको प्रकार: धागे किराहरूले पनि मकैका कलिला बेर्नाहरूमा क्षति पुर्‍याउँछन् । भर्खर उमन लागेको मकैको बीउ भित्रको भिजेको पिठो नै खाईदिन्छ । यस्ता बेर्नाहरू पुड्का, पहेला र अरुख देखिन्छन् र केहि समय पछि बेर्नाहरू मर्दछन् ।

३) फेद काट्ने किरा: मकैका कलिला बेर्नाहरूको फेद जमिनको सतहमा चढे काटिदिने हुनाले नै फेद काट्ने किरा भनिन्छ । मकै बाहेक अरु बेर्नाहरू पनि यसले काटिदिन्छ तर विरवा छिपि सकेपछि काट्न सक्दैन ।

पहिचान: क्षति गर्ने अवस्था लार्भा हो । लार्भाको रङ्ग टलक टलकने कालो रङ्गको हुन्छ । बस्ता टाउको र पुच्छर एकै ठाउँमा पारी गुड्कीएर बस्छन् । लार्भाहरू रातमा मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

क्षतिको प्रकार: यसले मकैका कलिला बेर्नाहरूको फेद जमिनको सतहमा काटिदिन्छ । ताजा काटेको फेदमा खोसेर हेर्‍यो भने लार्भालाई पाउन सकिन्छ।

४) किर्यो: किर्योको प्रकोप खास गरी तराई, भित्री मधेश तथा बेसी टारहरूमा ज्यादा हुन्छ । यसका माउ र बच्चा दुवैले क्षति पुर्‍याउँछन् । यसको लार्भा अवस्था हुँदैन । चितवन जिल्लामा विगत सालदेखि यसको प्रकोप बढी देखिएको छ । किर्यो रातमा बढी सकृय हुन्छ र दिनमा आफ्नो गुड्मा बस्छ ।

पहिचान: किर्थाहरू ठुला फट्याङ्ग्रा जस्तो देखिन्छ । पिनीहरूको शरीर फट्याङ्ग्राहरू भन्दा भारी र छैरो गाढा रङ्गको हुन्छ । फट्याङ्ग्रा दिनमा देखिन्छन् र किर्था रातमा देखिन्छन् ।

क्षतिको प्रकार: यसको प्रकोप भएको ठाउँ बुढी औला जत्रो प्वालहरू र प्वालको वरिपरि माटो थुप्रिएको गुडहरू देखिन्छन् । प्वालका वरिपरि मकैका बेर्नाहरू छरिएका देखिन्छन् । रातमा नै गुड वरिपरिका बेर्नाहरू काट्छन् ।

५) रिठ्ठे किरा: यो धानको ब्याड र मकै दुवैमा क्षति पुर्‍याउँछ । यसको लार्भा भन्दा माउ खपटेले नै बढी क्षति पुर्‍याउँछ ।

पहिचान: यसले क्षति गरेको ताजा बोटको फेदमा खोशेर हेर्‍यो भने खपटेलाई देख्न सकिन्छ । यो कालो रङ्गको हुन्छ ।

क्षतिको प्रकार: यसले २ पाते देखि ५/६ पाते अवस्था सम्म क्षति पुर्‍याउँछ । यसले क्षति पुर्‍याएको गुबोमा पात ओझलिएको र तलका २ पात हरियो नै हुन्छ र गुबो तान्दा फुत्त आउँछ । जमिनको सतह भन्दा तल र मुख्य ठुला जराहरू निस्कने बीचको भाग छिया छिया पारेर खाई दिन्छ ।

दोश्रो समूहमा पर्ने किराहरू

१) धर्कै गबारी: यसले १,७०० मिटर भन्दा उच्च पहाडमा क्षति पुर्‍याउन सक्दैन । मकै बाहेक यसले धान, कोदो, जुनेलो आदि क्षति पुर्‍याउँछ ।

पहिचान: यसको माउ पराले रङ्गको सानो पुतली हो, जसको पखेटाको किनारमा सानो सानो लहरे काला थोप्ला हुन्छन् । खास क्षति पुर्‍याउने अवस्था लार्भा हो । लार्भाको शरीरमा टाउको देखि पुच्छर सम्म ठाडा हलुका धर्साहरू हुने हुनाले नै यसलाई धर्कै गबारी भनिएको छ ।

क्षतिको प्रकार: माउ पुतलीले मकैको पातको तल्लो र माथिल्लो भागमा फुल मार्दछन् । फुलबाट निस्केका लार्भाहरू केहि घण्टामै पातको हरित कणिकाहरू कोतारेर खान्छन् र त्यस पछि गुबोमा छेडेर भित्र पस्छ । जब मकैको गुबो बाहिर निस्कन्छ, पातमा मसिना पीनको टाउको जत्रा छिद्रहरू देखिन्छन् ।

२) फौजी किरा: फौजी किराहरूले पहाडको वर्षे मकै तथा तराई, भित्री मधेश र वेसी टारहरूमा हिउँदे मकैमा बढी आक्रमण गर्दछ । पिनीहरू रातमा बढी सकृय हुन्छन् । पिनीहरू फौज जस्तै रातभरी हिँड्ने भएकोले यसलाई फौजी किरा भनिएको हो । यसले मकै बाहेक धान, गहुँमा पनि ठुलो भागमा क्षति पुर्‍याउँछ ।

पहिचान: लार्भाहरू शुरुमा हरिया तथा हलुका पहेँला रङ्गका हुन्छन् र पुर्ण विकसित भएपछि छैरो रङ्गमा परिणत हुन्छन् । लार्भाको टाउकोमा २ वटा प्रस्ट काला धर्साहरू विकसित हुनुका साथै शरीरमा पनि हल्का धर्साहरू देखिन्छन् ।

क्षतिको प्रकार: यसका लार्भाहरू ज्यादै खन्चुवा हुन्छन् । मकैको पातका किनाराहरू खाँदाखिदै मध्य भागातिर जान्छ । यसले मकैको पातको मध्य नशा बाहेक अरु हरियो सम्पूर्ण भाग खाई दिन्छ ।

३) फट्याङ्ग्रा

क्षतिको प्रकार: मकैको बोट निस्कने अवस्था देखि मकै पार्ने अवस्था सम्म मकैबोटका हरिया भाग पातहरू कोतारी विरवालाई हानि पुर्‍याउँछन् । कलिला धान/चमरा र जुगामा समेत आक्रमण गरी विरवालाई क्षति पुर्‍याउँछ ।

नियन्त्रणका उपायहरू: मकैमा लाग्ने किराहरूको अध्ययनको आधारमा खुमे, रिठ्ठे र धागे किराको नियन्त्रण गर्नु परेमा मकै छर्नको लागि जमिनको तयारी गर्दा बी.एच.सी. वा अलिड्रिन वा क्लोरोडेन धुलो प्रकोप हेरी २० देखि ३० किलो/हेक्टरका दरले माटोमा मिसाउनाले राम्रो नियन्त्रण हुन्छ । घुम्ती भाली अपनाउनु पर्दछ । किर्थाको आक्रमणको खण्डमा चाराको प्रयोगबाट ९५ प्रतिशत नियन्त्रण भएको पाएको छ ।

निष्पत्ति चारा बनाउने तरीका:

- मकैको मसिनो च्याख्ता (चोकर) १० किलो
- ५ प्रतिशत क्लोरीनको धुलो २५० ग्राम
- सखर वा खुदो ५० ग्राम
- खानेतेल २/३ चन्दा
- बुरजुराउदो किसिमको चारा बनाउने चाहिने आवश्यक मात्रामा पानी राख्ने ।
- प्रति हेक्टर १० किलोका दरले गहुँ छरे जस्तै छरी दिने ।

मकैको धर्क गाबारेको लागि: फ्युराडोन, डिप्टेरक्स तथा थिमेट गेडा बढी प्रभावकारी मानिएको छ । थिनीहरू मध्ये फ्युराडोन राम्रो मानिएको छ । गाबाराको प्रकोप देखिएमा मकैको गुबोमा ३/४ गेडा उपरोक्त औषधि हालनाले गाबाराहरू नियन्त्रण हुन्छन् । बजारमा केही गरी गेडा औषधि नपाएमा थायोडान झोल औषधि (३५ ई.सी.) ३ मि.लि./लिटर पानीमा मिसाई फुलबाट लाभार्हक निस्कने अवस्थामा छरिदिने ।

फौजी किराको लागि: डेसीस औषधि १ मि.लि./लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

रोगहरू: डाँठ सङ्गे रोग:

- खेत बारीमा पानीको राम्रो निकास हुने प्रवन्ध मिलाउने ।
- रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गर्ने ।
- गोडमेल गर्दा मकैको जारामा चोट लाग्न नदिने ।
- बोट बाक्लो हुने गरी नलगाउने ।
- घुम्तीबाली प्रणाली अपनाउने ।

रोग अवरोधक जातका मकैहरू लगाउने:

- अरुण-२, १, चाँडै पाक्ने जात, तराई तथा भित्री मधेश ।
- जानकी: पश्चिमी तराईको लागि हिलो पाक्ने जात ।
- रामपुर २: तराईमा हिउँदमा लगाउने ।
- मकैका जातहरूमा जोर अङ्क भएका पहेलो दाना हुने र विजोर अङ्क भएपछि सेतो दाना हुने भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
- मनकामना १ मध्य पहाडमा हिउँदमा र तराईमा पनि राम्रो उत्पादन दिन्छ ।
- रामपुर कम्पोजिट: मध्य पहाडको लागि ।
- मकालु २ उच्च पहाड जस्तै पाखीवास र लुम्ले क्षेत्रको लागि हुन्छ ।

जथाभावी वनजंगल नकाटौं ।

कैरा बालीको उन्नत जात

१) रोकस्टा:

- बोटको उचाई- २.६ देखि ४ मिटर ।
- एक घरीको तौल- ४० के.जी. ।
- कोसा संख्या- ३०० देखि ४०० बटा/घरी ।
- बढी अद्रता भएको गर्मी जलवायु चाहिन्छ ।
- ओइलाउने रोग लाग्दैन ।
- टेकाको जरुरी पर्दछ ।
- कैराको कोसाहरू पाकेको अवस्थामा पनि हरियो हुने हुनाले यसलाई हरिछाल पनि भनिन्छ ।

२) धिलियम हाइब्रीड:

- हाइब्रीड ।
- घरी र कोसा ठुला हुन्छन् ।
- विरवाको उचाई ३ - ४ मिटर सम्म ।
- एक घरीको तौल ३० के.जी. ।
- कोसा संख्या १२५ - १५० बटा/घरी ।
- रोग सहन सक्ने क्षमता बढी ।
- उत्पादन बढी भएकोले लोक प्रिय हुँदै गएको ।
- टेका दिदा राम्रो हुन्छ ।

३) भिनी चम्पा:

- अग्लो, बोटको उचाई ४ - ८ मिटर ।
- एक घरीको तौल १५ - २० के.जी. ।
- कोसा संख्या १२५ - १५० बटा/घरी
- रोग किरा बढी सहन सक्ने जात ।
- सुब्बा क्षेत्रमा पनि खेती गरिने ।
- पातको ओइलाउने र बन्धी टप रोग लाग्दैन ।

४) मालभोग:

- विरवाको लम्बाई ४ - ५ मिटर ।
- ब्यवसायिक महत्त्व कम ।
- एक घरीको तौल १५ के.जी. ।
- धरिमा कोसा संख्या १०० - १२० बटा ।

- फलको बोक्रा पातलो, मिठो, वास्ता आउने, गुलियो र धेरै स्वादिलो हुन्छ ।
- भण्डारण क्षमता बढी हुन्छ ।

ड) वसराई ड्वार्फ (ड्वार्फ केभेन्डीस):

- बोट होचो (१.८ देखि २ मिटर),
- घरीको तौल २०(२५ के.जी.),
- सरदर कोसा संख्या १०० - १२५ वटा/घरी,
- ओइलाउने रोग लाग्दैन,
- भण्डारण क्षमता कम हुन्छ ।

छ) अन्यमा स्थानिय जातहरू छुसे, मुम्रे आदि ।

उन्नत केरा खेती प्रविधि

क) हावापानी:

- गर्मी र ओसिलो हावापानी उपयुक्त हुन्छ,
- वार्षिक वर्षा २०० - ८०० से.मी.,
- सिंचाईको सुविधा भएको ठाउँमा पनि सुख्खा हावापानीमा पनि केरा खेती गरिन्छ,
- बोट र फलको विकासको लागि २५ - २७°C तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ,
- बढी ठण्डी र तुषारोमा केरा खेती राम्रो हुदैन ।

ख) माटो:

- पानी नजम्ने, खुकुलो र मलिलो माटो,
- पि.एच. ६.५ सम्म भएको,
- कभिसमा ३ फिट गहिरो माटो,
- निकास राम्रो भएको, भिन्न बालुवा नभएको,
- कडा र चिम्टाइलो माटोमा भएमा केरा खेती गर्न सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

ग) प्रसारण:

- प्रसारण कोषा(सकर)बाट गरिन्छ,
- सकर २ प्रकारको हुन्छ, साधुरो पाते सकर (Sword Sucker) र चौडा पाते सकर (Water Sucker)।
- साधुरो पाते सकरका पातहरू चाडै बढ्ने हुँदा नयाँ बोट उत्पादनको लागि उत्तम मानिन्छ ।

ब) पाण्डो तयारी:

- प्रथिन राखरी सम्झाउने,
- १ - ४ पटक जोतेर झारपात हटाउने
- पानी सबै तिर भित्रने गरी जमिन बनाई निकसको व्यवस्था गर्ने ।

ब) लगाउने तरीका: बोट-बोट र लाइन-लाइन बीचको दूरी ज्ञातमा फरक पर्दछ । साधारणतया हरिछल र विलियम हाइब्रीडको लागि ५ x ४.५ फिट लाइन-लाइन ५ र बोट-बोट ४.५ फिट) दूरी उपयुक्त हुन्छ ।

ब) लगाउने समय:

- प्रक्षीर, पुष र माघ बाहेक अरु सबै महिनामा केरा रोपिन्छ ।
- जुमारी रातिको प्रकोप कम भएमा केरा फागुन देखि लगाउन सकिन्छ
- कम पानी पर्ने तथा पानी नजम्ने ठाउँमा वर्षातको पुख्ता वा अन्तमा केरा लगाउन सकिन्छ ।
- धेरै लगाउने समय छनौट गर्दा फागुन देखि भाद्र सम्म पसाउने गरी गर्नु पर्दछ । भाद्र पछि पसाएको केरा राम्रो हुदैन ।

ब) खाडलको तयारी:

- खाडल २ फिट लामो, २ फिट चौडा र २ फिट गहिरो हुनु पर्दछ।
- खाडल केरा लगाउनु भन्दा कभिसमा १० दिन पहिले तयार गर्नु पर्दछ ।
- खाडलमा एक डोको गोबर मल, एक के.जी. पित्त र पीच के.जी. खरानी पशु पर्दछ ।
- १ ग्राम युराइन पनि राख्ने ।
- पसाको अतिरिक्त खाडलको माटोमा २०० ग्राम युरिया, १०० ग्राम डि.ए.पी. र ५० ग्राम पोटास राख्नु पर्दछ ।

ब) मलबाध:

- ब्याक्टेरियल रूपले केरा खेती गर्दा प्रशस्त रुपमा मलबाध दिनु पर्दछ ।
- ब्याक्टेरियल मलको निम्न अनुसार प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- युरिया गुरुमा २०० ग्राम, गोडमेल गर्दा २०० ग्राम र पसाउने बेला २०० ग्राम प्रति बोट ।
- डि.ए.पी. गुरुमा १०० ग्राम, गोडमेल गर्दा १०० ग्राम प्रति बोट ।
- पोटास गुरुमा ५० ग्राम, केरा पसाउने बेला २०० ग्राम प्रति बोट ।

- मलखारको प्रयोग गर्दा बोटको १ फिट टाढा बरिपरि राख्नु पर्दछ ।

झ) सिंचाई:

- केरा लगाएपछि, मलखार राखेपछि र पसाउने समयमा सिंचाई अति आवश्यक हुन्छ ।
- गर्मीमा हरेक हप्ता र जाडोमा प्रत्येक १५/२० दिनको फरकमा सिंचाई दिनु राम्रो हुन्छ ।
- पानी दिदा बीचको कुलेसोमा दिनु पर्दछ । बोटको फेदमा पानी जम्नु हुदैन ।

ञ) छापो हाल्ने (मलिचङ्क) तथा गोडभेल:

- झारापात, भुसा र पातपतिभरबाट मलिचङ्क गर्न सकिन्छ ।
- बगैचा पुर्णतया झारापात रहित हुनु पर्दछ र आवश्यकता परेमा झारनाशक विषादीको प्रयोग गर्ने ।
- बेला बेलाभा गोडभेल गरी बोटमा हल्का माटो चढाउनु पर्दछ ।

ट) बगैचाको व्यवस्थापन:

- घरी आउने बेला एउटा मात्र साधुरो पाते सकर राख्ने ।
- केराको बुन्ना काट्दा हला भन्दा ८ से.मी. तल काटेर काटिएको भागलाई १.५ ग्राम फिनोक्सील गोल्ड/लिट्र पानीको झोलामा डुबाएर छोड्नु पर्दछ ।
- केरा पसाइ सकेपछि बाँसको वा अरु कुनै काठको टेका दिनु पर्दछ ।

अन्तरबाली: बोडी, तरकारी, सुर्यमुखी आदि लगाउन सकिन्छ ।

रोग/किराहरू

१) रोगहरू

- क) ओइलाउने रोग (पनामा विल्टर Panama wilt):
- कारक- डुसी, माटोबाट सर्ने रोग ।
 - गर्मी तथा पानी निकास नभएको ठाउँमा यो रोग लाग्छ ।

लक्षण: तल्लो भागको पात एककासी पहेँलिने र जुगेर भित्रिने, बोट कमजोर भई ढल्ने, गुबोमा पहेँला, राता धर्साहरू देखा पर्दछन् ।

रोकथाम:

- रोग अवरोधक जात लगाउने, जस्तै विलियम हाइब्रीड ।
- खाडल खन्ने समयमा १ कि.ग्रा. चुन/खाडल माटोमा मिसाएमा यो रोकन सकिन्छ ।

ख) केराको डिङ्गुरे (बन्ची टपर Bunchy Top): कारक- भाइरस ।

लक्षण:

- विरवारहरूमा वृद्धि रोकिने, पात पहेँलो र ठाडो भएर एकै ठाउँमा पात आउँछ । पातहरू साना र सिधा पर्ने हुनाले पंखाको आकार बन्दछन् ।
- फल लाग्दैन ।

रोकथाम:

- रोगी विरवा हटाउने, बगैचा सफा राख्ने ।
- लाही किराको प्रकोपले सर्ने भएकोले विषादी छर्नु पर्दछ ।

ग) एन्थाक्नोज (Anthracnose): कारक- डुसी ।

लक्षण:

- कोसामा देखिन्छ । रोगी फलमा सानो र गोलो थोत्ता भएको हुन्छ ।
- पछि पुरै फल दाक्छ ।
- बेला बेलाभा फिनोक्सील गोल्ड १.५ ग्राम/लिट्र पानीमा मिसाएर छर्ने ।

२) किराहरू

क) गबारो

- गानोमा लाग्ने गबारो ।
- सरसफाइको साथै ३ ग्राम गुराइन बोटको बरिपरि बेला बेलामा किराको प्रकोप अनुसार छर्नु पर्दछ ।

ख) खपटे (Bettle): बगैचा पुर्ण रूपले सफा राखी बेला बेलामा थायोडान २ एम.एल/लिट्र पानीमा वा मालाथियन छर्नु पर्दछ ।

उत्पादन: जात र ठाउँ अनुसार केराको उत्पादन फरक फरक हुन्छ । सरदरमा २०(२५ टन/हेक्टर केरा उत्पादन हुन्छ ।

विषादी बारे जानकारी

विषादी भनेको केही ?

मानिस, पशु पंक्षी वा बोट विस्फाको सामान्य वृद्धि, विकास, अरु प्राकृतिक प्रक्रिया वा जीवनलाई नराम्रो असर पार्ने सबै कुरालाई विषालु भन्न सकिन्छ । बालीनालीमा लाग्ने किरा, सुलसुले, जुका, ठुसी आदिको नियन्त्रण गर्न वा खेतबारीको झार मार्न प्रयोग गरिने विभिन्न थरीका विषालु रासायनिक पदार्थलाई नै विषादी भनिन्छ ।

विषादीहरू किरा, फट्याङ्ग्रा र बालीनालीमा लाग्ने जीवाणु, ठुसी, ब्याक्टेरिया, भाइरस आदिका लागि मात्र होइन, पशु पंक्षी र मानिसका लागि पनि हानिकारक हुन्छन् । तर बाली जोगाउनका लागि कहिले काहीँ केही मात्रामा विषादीको प्रयोग नगरेर पनि हुँदैन । ठीक तरीकाले र ठीक मात्रामा उपयुक्त किसिमको विषादीको प्रयोग गरेमा विषादीबाट हुने हानीबाट हामी बच्न सक्छौं ।

हाम्रा गाउँ घरमा विषादीलाई किरा मार्न दवाई वा औषधि भन्ने चलन छ । तर विषादीहरू औषधि होइनन्, विष हुन् र यिनबाट सावधानी रहनु पर्दछ । विषादीका किसिम र चल्तीका नामहरू: विषादीलाई विभिन्न किसिमले अलग-अलग समुहमा राख्न सकिन्छ । विषादीका किसिम छुट्ट्याउने सबभन्दा सजिला केहि उपायहरू यस प्रकारका छन् ।

१) कामको आधारमा:

- किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने विषादी:

नुमान ।	वैभिटिन ।
रोग नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग गरिने विषादी:	२, ४, - डी ।
झार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग गरिने विषादी:	जिङ्ग सल्फाइड ।
मुसा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग गरिने विषादी:	डाइकोफोल ।
सुलसुले नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग गरिने विषादी:	डाइक्लोरो प्रोपेना
जुका नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने विषादी:	

२) रासायनिक संरचनाका आधारमा:

- अर्गानोक्लोरीन विषादी, जस्तै: अलिडिन, बीएचसी, डिडिटी, हेप्टाक्लोर आदि (यो समुहका विषादी प्रतिबन्धित छन्) ।
- अर्गानो फस्फेट, जस्तै: मालाथिन, मोनोक्लोरोफस, मेटासिड आदि ।
- कृत्रिम पाइट्रोप्रोइडयुक्त विषादी, जस्तै: साइपरमेथीन, डेल्टामेथीन, फेन्थेलेट ।
- अग्राहारीक विष, जस्तै: कपरअक्सीक्लोराइड, कपरसल्फेट आदि ।

किटनाशक विषादीहरूको प्रयोग किरा र सुलसुले नियन्त्रण गर्न गरिन्छ । सामान्यतया यस्ता विषादीहरूले सम्पर्कित विषादी खाँदा लाग्ने विषको रुपमा कार्य गर्दछ । केहि विषादीहरू हुवाउने सपयाको रुपमा पनि कार्य गर्दछ । किटनाशक विषादीहरूलाई तिनीहरूको रासायनिक समुहको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

१) अर्गानोक्लोरीन्स: यस समुहको किटनाशक विषादीहरूमा एल्डीन, डाइएल्डीन, डि.डि.टी., क्लोरडेन, लिन्डेन र बी.एच.सी. पर्दछन् । यी विषादीहरूमा खाँदा लाग्ने विष र सम्पर्कमा आउँदा लाग्ने विष हुन्छ र धेरै पैकारका किराहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस मध्ये खुमे किरा, काटने किरा, झुसिल किरा पर्दछन् । हाल यो विषादी प्रतिबन्धित छ ।

२) अर्गानो फस्फेट: धेरै प्रकारका अर्गानो फस्फेट किटनाशक विषादीहरू हुन्छन् । यिनीहरूमा पाराथियन, फोन्ट्रोथियन, फस्फिमिडन, मालाथियन, पर्दछ । धेरै जसो अर्गानो फस्फेट सम्पर्क विष हुन तापनि यी मध्ये केहि विष वैदीक पनि हुने भएकाले लाठी र सुलसुले मार्न बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

३) कार्बामेट्स: यस समुहमा कावारीत र कार्बो-युरान आउँछ । कार्बारील छोटो समय सम्म प्रभावकारी हुने र खाँदा विष लाग्ने किटनाशक हो । जसको प्रयोग चपाएर खाने किराहरूको नियन्त्रण गर्न गरिन्छ । कार्बो-युरान बढी समय सम्म टिक्ने वैदिक किटनाशक हो, जसलाई माटोमा प्रयोग गरिन्छ र विरवाहरूले सोस्छ ।

४) पायराथ्रोइड्स: यस समुहका किटनाशक विष अरु समुहका किटनाशकहरूको तुलनामा पछि प्रचलनमा आउन थालेको हो । यो कृषिमा उपयोग गरिने प्राकृतिक पाइथीन सँग मिल्दो हुन्छ । पाइराथ्रोइड्स किटनाशकहरू किराहरू मार्न धेरै असरदार, अर्गानो फस्फेट किटनाशकको तुलनामा मानिसहरूका लागि कम विषालु र माटोमा धेरै समय सम्म नरहने प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता किटनाशकमा साइपरमेथीन, डेल्टामेथीन र फेन्थेलेट पर्दछन् ।

दुसीनाशक विषादीको प्रयोग विरवा र बीउ बिजनलाई दुसीबाट जोगाउन गरिन्छ । धेरै जसो प्रचलित विषहरू बाली रक्षकको रूपमा कार्य गर्दछन् । यस्ता प्रकारका दुसी नाशकलाई रोग लाग्न अगाडि प्रयोग गरिनु पर्दछ । रोग बढ्दै गए दुसीनाशक बरोबर छर्कनु पर्दछ । जसबाट नयाँ पातहरू र हागाहरूलाई संरक्षण गर्न सकियोस् । बजारमा अनेकन प्रकारका दुसीनाशक विषहरू पाइने गरिन्छ र यस्ता विष सामाग्रीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने रोगहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् ।

दुसीनाशक विषादीका प्रकार

Sulfer Containing Fungicides: तरकारीमा Anthracnose, Alternating रोग, डडुवा रोग, रस्ट आदि रोगको रोकथाम गर्न यस समूहको दुसीनाशक विषादी प्रयोग गरिन्छ । जस्तै: Mancozeb, Maneb उपयोगमा आउँछ । (Dithave एम्.-४५, Dithan २७८ etc.). यसमा Dithio Carbamates समूहका विषादी पर्दछन् ।

Copper containing Fungicides: तरकारीमा डडुवा रोग, बेर्ना कुहिने रोग, थोप्ने रोग अभिलेखित जातको फलफुलमा हुने पात खुम्चने रोग यस समूहको दुसीनाशकबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ । जस्तै: Bordeaux mixture, Bordeaux part and cuperovychloride मा Blix-५०, Fxtolan आदि पर्दछन् ।

Benzimidazole: यो एक वैदीक विषादी हो । यसले बेर्ना उपचार, बीउ उपचार र स्याड उपचार गर्न र सिन्दुरे रोग दुसी स्याडमा लाग्ने दुसी तथा गर्हुमा लाग्ने दुसी रोग नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसमा पर्ने विषादीहरू Carbendazim: Bavistine & Benomil पर्दछन् ।

Hexathier: यस समूहमा पर्ने विषादीहरू तरकारी बीउ उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ । जस्तै: Thiram, Thiride etc.

Derocap: e.g. Karathian (Cucurbits मा धुले दुसी रोग नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने) ।

झारपातनाशक विषादी

बालीमा लाग्ने झारपात नियन्त्रण गर्न बाली रोपिनु वा उम्रनु अगाडि वा बाली लागेको खेतमा रहेको हुर्केका झारपातहरू मार्ने प्रयोजनको लागि झारपातनाशक विषको प्रयोग गरिन्छ । बालीको रोपाईं गरेको तुरन्तै पछि प्रयोग गर्न सकिने झारपातनाशक विषमा मकै र भटमासको लागि अलाक्कोर, धानको लागि बुटाक्लो र २, ४ डी, गर्हुको लागि आइसोप्रोट्युरान आदि छन् ।

मुसानाशक विषादी

मुसा जातिका जनावरहरू (खास गरी मुसा) लाई नियन्त्रण गर्ने रसायनहरू साधारणतया चाराको रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ । जसलाई मुसाले खाने बढी सम्भावना भएको ठाउँमा राखिन्छ । खेत तथा घर पसलमा बिङ्ग फम्फाइडको धुलो प्रयोग गरी विषालु चारा तयार पारेर मुसा नियन्त्रण कार्य गरिन्छ ।

विषादीका प्रकार:

१) झोल (इ.सी.): यस्तो विषादी बनाउँदा पानीमा घुलनशील तेल तथा तेल जस्ता पदार्थहरू मिसाएर झोल विषादी बनाएको हुन्छ । यो विषादी तालीमा राख्नु हुँदैन । यस्तो किसिमको विषादी मानिसको छालाबाट सजिलै सोसिएर भित्र पुग्दछ ।

२) पानीमा भिस्ने पाउडर (डब्ल्यु.पि.): पानीमा भिस्ने पाउडरलाई अलि मसिनो धुलोमा विशेष पदार्थधर्मसं द्याइएको पानीमा तैरिने बनाएको हुन्छ । यो सस्तो तथा भण्डारण र ढुवानी गर्न सजिलो एवं बालीलाई झोल विषादीको तुलनामा कम हानी पुऱ्याउने हुन्छ । यो झोल भन्दा कम मात्रामा छालाबाट सोसिन जाने हुन्छ । यो विषादी स्वे गर्दा बेला बेलामा चलाइ रहनु पर्दछ ।

३) धुलो (डि.पि.): यस विषादीलाई अण्डा, माटो तथा अन्य Diluent (पाउडर) सँग मिसाएको हुन्छ । यो प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ तर हावामा सजिलै उडेर जाने, पानीमा बगेर जाने भएकोले लक्षित क्षेत्रलाई बढी प्रदुषित पार्दछ ।

विषादीको विषालुपन

विषालुपनले शारीरिक वा जैविक गुण जनाउँदछ, जसबाट यान्त्रिक कारणबाट नभई रसायनको प्रभावको कारणबाट जीवित प्राणीलाई कति सम्म नोक्सान वा पीडा पुऱ्याएको छ त्यो निर्धारण गरिन्छ ।

१) शारीरिक सम्पर्क: मानिसको शरीरमा छाला, फोक्सो, मुख र आँखाबाट प्रवेश गर्छ ।

- छालाबाट: प्रयोग गर्दा विष हवाको माध्यमबाट प्रदूषित कपडा, घाउ छटिरामा परेर तथा घाटी, मुख, टाउको विष सोत्न बढी सम्बेदनशिल हुन्छन् । दुधिलो हुने विषादी धुलो वा दानादार भन्दा बढी सोसिन सकिने हुन्छ ।
- फोक्सोबाट: मसिनो धुलो, पाउडरहरू श्वास प्रश्वासबाट गई नाक, घाटी र फोक्सोलाई नराम्रो असर पुऱ्याउँछ ।
- खाना सेवनबाट: लेबुल नभएको भाडोमा विष राखेमा प्रयोग गर्ने क्रममा तथा स्नेयर जस्ता उपकरण फुत्ने चुस्ने गर्दा विष सेवन हुन जान्छ ।
- आँखाको संसर्गबाट प्रदुषण: आँखाले सजिलै सोस्छ ।

२) विषालुपन: किटनाशक विषादीको विषालुपन मुसा, खरायो, कुकुर र बाँदर जस्ता जनावरमा विषादीको स्थाभाव अनुसार (मुख, छाला वा श्वास) परिक्षण गरिन्छ । विषालुपनलाई कडा विषालुपन र दीर्घ विषालुपन गरी २ भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

क) कडा विषालुपन: एक मात्र विषादीको खुराकको असर । विषालुपनको परिक्षण LD-५० (मारक मात्रा ५०) को अनुपातको रूपमा गरिन्छ । परीक्षण गरिने जनावरको आधा सङ्ख्यालाई मार्न जति मात्रामा वास्तविक विष प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई एल.डी.५० भन्दछन् । कुनै विषादीको एल.डी.५० मात्रा कम छ भने त्यो विषादी खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।

केहि विषादीको कडा विषालुपन अनुपात:

क्र.सं.	विषादीको सक्रिय तत्व	LD-५० (सेवन)	LD-५० (त्वचा)
१	अर्गानो फस्फेट्स:		
क) फोरेट	२	१००	
ख) फोस्फामिडिन	७	१२५	
ग) मिथाइल पाराथियन	१४	६७	
कार्बोन फुरान	८	२०००	
अर्गानोक्वोरीन:			
क) एल्डीन	५०	९८	
ख) इन्डोसल्फान	८०	३६०	
ग) बी.एच.सी.	९०		
घ) लिन्डेन	१००	९००	
मुसानाशक: जिङ्गफस्फाइड	४६		
पाइरेन्ट्रोइड्स:			
क) साइप्र मिथिन	४०००	२४००	
ख) डेल्टामेथिन	२२००	२००० भन्दा बढी	
दुसीनाशक:			
क) ट्राइडोफोर्फ	६५०	१४००	
ख) कार्बेन्डिजिम	१५०००	२००० भन्दा बढी	
ग) कपरअक्सीक्लोराइड	१४४०		
घ) मेन्कोजेव	८०००	१५००० भन्दा बढी	
क्षारनाशक:			
क) ग्राउन्दाट	१५०	२४०	
ख) २, ४(डी)	३९५	१५००	

ख) दीर्घ विषालुपन: धेरै साना साना खुराकहरूको असर । कैयौँ महिना देखि १ वर्ष वा बढी सम्मको प्रभाव:

- छरिएको झोल/धुलो: तरकारी र फलफुल नपछालिँदा तथा प्रभाव नसकिएर खानेमा ।
- विषादी भण्डारणमा राम्रो हवा संचारको व्यवस्था नभएको ठाउँमा बस्दा पर्ने असर ।
- छर्ने बेलामा झोल/धुलोको सम्पर्कमा रहने असर तथा पहिरन नमुनेबाट सम्पर्कमा आउने विषको असर ।

दीर्घ विषालुपनको असर परिक्षण गर्दा जनावरमा विषादीको सानो मात्रा भिसावट गरी सेवन गराइन्छ । दीर्घ विषालुपनको असरहरू जन्म सम्बन्धिय दोष, कैन्सर ट्युमर, प्रजननमा असर तथा रक्त सञ्चारमा असर पर्दछ ।

WHO Classes:

Class	LD-50 for Rats mg/kg Body Weight	Oral	Dermal	Solid	Liquid	Solid	Liquid
I A. Extremely Hazardous (खतरा धेरै)	५ or less	०.५०	२० or less	१० or less	०.२००	४० or less	
I B. Highly Hazardous	५-५०	२०-२००	१०-१००	४०-४००			
II. Moderately Hazardous (चेतावनी)	५०-५००	२००-२०००	१००-१०००	४००-४०००			
III. Slightly Hazardous (सावधान)	Over ५००	Over २०००	Over १०००	Over ४०००			

Source: Nepal Pesticide Board

विषादीहरूको पढ्ने अवधि: विषादीको अवशेषलाई स्वीकार्य तह सम्म खिड्दत हुन दिन विषादीहरू प्रयोग पछि अवधि निर्धारण गरिएको छ ।

Common Name	Trade Name	पढ्ने अवधि
Cypermethrin	Ripcord, Vstad	१ हप्ता
Fenvalerate	Fen-Fen-30	१-२ हप्ता
Dimethoate	Rogor	२ हप्ता
Oxydemeton Methyl	Metasystox	२-३ हप्ता
Dichloro Vus	Nuvan	२-३ दिन
Chloro Pyrifos	Dursban 20%	४ हप्ता
	Hexaban 20%	५ हप्ता
	Nurulle D 505	६ हप्ता
	Pyriivol	७ हप्ता
Monocrotophos	Phoskill	१४-३० दिन
Phorates	Thimath	१० दिन
Carbendazim	Derosal/Kibestin	२ हप्ता
Mancozeb	Indofil M-45, Kisan-M-45	२-४ हप्ता
2, 4-D Sodium Salt		१० दिन
Butachlor		१०-१२० दिन

विषादीमा लेखेको लेबल बुझ्नु: किटनाशक विषादीको लेबलमा निम्न सुचनाहरू हुन्छन्:

- किटनाशक विषादीको किसिम,
- व्यापारिक नाम,
- रासायनिक वा साधारण नाम,
- बनावटको किसिम,
- सशक्त वा अशक्त तत्वको प्रतिशत,
- विषादीको परिमाण,
- उत्पादकको नाम र ठेगाना,
- रजिष्ट्रेशन नम्बर,
- उत्पादन मिति,
- व्याच नम्बर,
- म्याद सकिएको मिति,
- प्रयोग गर्ने तरिका: प्रयोग हुने बाली, लक्षित किरा, प्रयोग गर्ने मात्रा, अन्तिम प्रयोग र बाली भित्र्याउने समयवधि कति दिनका फरकमा दोहोर्‍याउने,
- खतरा संकेत,
- भण्डार गर्ने र सकिए पछि भाडो फ्याक्ने निर्देशन,
- प्राथमिक उपचार, डाक्टरलाई सुचना वा उपचार गर्ने तरिका र निषेधाज्ञा ।

रासायनिक औषधीहरूको प्रयोग सकेसम्म कम गरौं ।
प्रांगारिक पदार्थहरूको प्रयोगमा जोड दिऔं ।

१२९. विखावाट किटनाशक विषादी र सौ को प्रयोग

- क.सं. विखाको नाम कुन किराको लागि उपचार गर्ने
- १) असुरो: १% धुलोले धानको पुतली नियन्त्रण गर्न सकिने ।
१ किलो असुरो र १ लिटर पानीको घोलले लाही किरा मार्न सकिने ।
कोका, फर्सीको खपटे पनि नियन्त्रण गर्न सकिने ।
- २) मखमली फुल: मखमली फुलको रसले धमिरा, कभिला मार्न सकिने ।
- ३) केतुकी: कागजमा लारने धमिरा नियन्त्रण गर्न सकिने ।
साङ्गले: केतुकीको रसले घरको साङ्गले मार्न सकिने ।
धानको घुन: एक भाग पात र ५ भाग पानीको माग्नाले धानको घुन मार्न सकिने ।
- ४) भोटो लसुन: लसुनलाई टुक्राएर १ हप्ता सम्म पानीमा राखी बनेको रसले प्याजमा लाग्ने झिङ्गलाई नियन्त्रण गर्ने ।
- ५) लसुन: लसुनको पोटीलाई पेष्ट्रोलियम इथर सँग उपचार गरी प्राप्त रसले चनाको बीउ धुनबाट जोगाउन सकिने ।
लामखुट्टे भगाउने, मार्न काम गर्न सकिने ।
- ६) काजु: काजुको बोक्राबाट निकालिएको तेलले धमिरा नियन्त्रण गर्न सकिने ।
बोक्राको तेल र मट्टितेलको मिश्रणले लामखुट्टेको लार्भार प्युपा नियन्त्रण गर्न सकिने ।
- ७) सुपु: सुपुमा मर्चा भिसाएर पिठोमा लाग्ने खपटे किरा मार्न सकिने ।
- ८) बोझो (पानी जम्ने ठाउँमा हुने): आलुमा लाग्ने किरा मार्न, धुलोले कभिला नियन्त्रण गर्न, कागजमा लाग्ने किरा भगाउने, सञ्चिन् अनाजमा किरा लाग्न नदिन ।
- ९) सुपारी: सुपारीको तेलमा पाइने Azeoline नामक Alkaloid ले किर्ना मार्न काम गर्दछ ।
- १०) आक: आकको बोटको धुलो र एसिटोनको रसले धानको घुन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
झिङ्ग, लामखुट्टेको लार्भा पनि नियन्त्रण गर्न सकिने ।

- ११) तिते पाते: तिते पातीको धुलोले मसुरो, गहुँ, मकैको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
(५० ग्राम/कि.ग्रा. अनाज), १०० बैखि २०० ग्राम हरियो पात/लिटर पानीले रातो खपटे कम गर्न सकिन्छ ।
- १२) गन्धे झार (वनमारा): यो वनस्पतिबाट निस्कने यौगिकले उपचार गरेमा अडिरको रेशम किराले मृत पराउँदैन ।
- १३) सुर्यमुखी फुल: तेलले खाद्यान्न उपचार गर्न सकिन्छ ।
- १४) अफ्रिकी सयपत्री (Mban Gold): अन्य खेतीमा भिसाएर लगाउँदा किराहरूको प्रकोप धेरै कम हुने ।
यसको १ भाग फुल र पातलाई १० भाग पानीमा भिसाएर बनेको रसले किरा विरुद्ध र्सो गर्न सकिन्छ ।
- १५) मेकसीको मेरिगोल्ड: यसको तेलले भिण्डीको झिङ्गा मार्न काम गर्दछ ।
पात र फलले लामखुट्टेको पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
मकै सञ्चय पनि गर्न सकिन्छ ।
- १६) रायोको तेल: यो तेलले दालको संरक्षणमा फाइदा गर्दछ ।
घरको झिङ्गा र काउलीमा लाग्ने किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
- १७) मेवा: मेवाको चोप (Larva)बाट प्यापिन (Pupin) पाइन्छ । यसले सुलसुले, चमजुआ आदिको नियन्त्रण गर्दछ ।
- १८) साल: सालको तेल ५ भाग र दलहनको बीउ ९५ भागले मुडको घुन नियन्त्रण गर्न प्रयोग सकिने ।
- १९) अडिर (अण्डी): अडिरको तेल, फल वा पातको धुलोले किटनाशकको काम गर्दछ । जस्तै: अनाज सञ्चित गर्न सकिने, कभिला, धमिरा नियन्त्रण गर्न सकिने ।
- २०) सिल टिमुर: ५०० ग्राम फलको धुलो र बोके टिमुर १ कि.ग्रा. दुबैभिसाएर ६ वर्ग मी. जमिनमा प्रयोग गर्दा रातो कभिला नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२१) निमः

निमका सबै भागमा किटनाशक गुण पाइए तापनि बीउमा बढी हुन्छ । निमको रस प्रयोग गर्नाले किराले (क) बाला नखाने, (ख) नमिठो भएर खान छाड्ने र २/४ दिन पछि मर्ने वा शरीरमा विकृती आउने आदि लक्षण देखिन्छन् । निमबाट छपटे, मुलमुले, झिझा, पतरो, लाही, मौरी, पुतली, फट्याङ्ग्रा आदि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसबाट आजकल धेरै विषादीहरू समेत बनेका छन् ।

२२) बकाइनो:

सुकेका पातबाट उनि कपडा र छालाका सामानहरू किराबाट बचाउन सकिने । सुकेको पात ८ देखि १० प्रतिशत गहुँमा राख्दा अनाजमा लाग्ने पुतली नियन्त्रण गर्न सकिने । आलापात २०० ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर १२ घण्टा पछि निम्केको रसबाट किरा मार्ने काम गर्न सकिन्छ । ५ पटक लगातार प्रयोग गर्ने । बन्दाको पुतली, सुतीको पात खाने लार्भा र छपटे किरा नियन्त्रण गर्न सकिने । छिप्पीएको भन्दा कलिला पातहरू बढी असरदार भएको बीउको धुलोले (२६) प्रयोग गर्दा अनाजलाई किरा लाग्नबाट बचाउन सकिने ।

२३) गाजा/भाङ्ग:

पातहरू ओछ्यानमा राख्दा उडुस, उमिया लाई भगाउन सकिने । १०० ग्राम हरिया पात प्रति लिटर पानीमा राखी निम्केको रसले फसीको छपटे किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । पातको धुलोले किर्ना मार्न सकिने ।

२४) मरिच:

फलको धुलोले मकैको कलिलो घोघामा लाग्ने किरा नियन्त्रण गर्न सकिने । धुलो २ देखि ३ प्रतिशत प्रयोग गर्दा अनाजमा किरा लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ ।

नोट: टिमुर, परपरे टिमुर, काली धतुरो, सुती, सिस्नु आदिबाट पनि किरा नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

१३०. घरेलु (प्राकृतिक) विषादी र रासायनिक विषादी बीचमा फरक र प्रयोग विधि

घरेलु विषादी

रासायनिक विषादी

बोझो:

२० देखि २५ ग्राम प्रति किलो अन्य (धान, गहुँ, मकै) मा मिसाएर राख्नाले पुतली र घुनको प्रभावकारी हुन्छ । अदुवा १ ग्राम खरानी प्रति किलो अन्नमा मिसाई भण्डारण गर्नाले भण्डारणक किराहरूको नियन्त्रण हुन्छ । यो कम तथा मानव तथा वातावरणलाई दुषित हुदैन । एल्युमिनियम फस्फाइड (सेल्फोस, फस्टोक्सन, क्वीकफोस ८/१५ ट्याबलेट प्रति 'मे.टन' अन्नमा प्रयोग गरेमा भण्डारण गरिएको अन्न सुरक्षित रहन्छ ।

निमको धुलो:

१० देखि २० ग्राम प्रति किलो ग्राम अन्नमा मिसाई राख्नाले अन्नमा भण्डारणमा लाग्ने पुतली, घुन एवं दालमा लाग्ने अन्य छपटे किरा नियन्त्रण हुन्छ । मालाधिनको धुलो यो २.५ ग्राम प्रति किलो बीउमा मिसाउँदा बीउ छर्नलाई मात्र योग्य भई खानलाई दुषित हुन्छ । यो मानव तथा वातावरणलाई ज्यदै खतरनाक हुन्छ ।

अलकत्रा (कोलटार):

आप, रुख, कटहरको गुबो खाने किराको नियन्त्रणको निमित्त भाग अलकत्रामा १ भाग मट्टितेल मिसाई लेतो पेस्ट बनाई कान्डामा लेप गर्नु पर्दछ ।

बोर्डो पेस्ट:

५:५:५ को औसतमा फलफुलमा बोर्डो पेस्ट लगाएमा तथा लेप माथि Chloropyrinphos को विषादी छर्कमा पानीले धोई जान्छ ।

असुरो:

असुरोमा विषादी युक्त गुण पाइन्छ । यसको प्रयोगद्वारा माटोमा बसी बालीनालीलाई दुइ दिन खुमे फेद कटुवा आदिको किराहरूको नियन्त्रण हुन्छ । कोलोरोडेन धुलो माटोमा २० देखि २५ किलो प्रति हेक्टरको दरले छर्दा विषादीको प्रभाव ज्यादा हुने भएकोले असुरोको पात र हाँगाको प्रकोप भन्दा धेरै विषादी हुन्छ ।

खुसानीको धुलो:

१०० ग्राम पिरि खालको खुसानीको प्रयोग १ लिटर पानी मिसाई रातभरी भिजाउने र तरकारी बालीमा छर्कनाले विशेष गरी लाही किराको नियन्त्रण हुन्छ ।

खुर्सानीको मिश्रण एक भाग ५ भाग साबुनमा मिसाई छरेमा प्रभावकारी हुन्छ ।

यसमा कम विषालु हुन्छ ।

रोग/Indosulfan: २ एम.एल./लि. पानीमा छर्दा तरकारीको लाही किरा नियन्त्रण हुन्छ तर छर्ने मान्छेलाई विषको असर पर्ने र तरकारी लामो समय सम्म टिप्न वा तोड्न नपाइने हुन्छ ।

गाईको गहुँत:

१ भाग गहुँत ५ भाग साबुन पानीको झोल मिसाएर तरकारी बालीमा छर्दा लाही, थिप्स पुतलीको लार्भा तथा फर्सी समुहमा धुले दुसी रोगको नियन्त्रण हुन आएको छ ।
यो कम विषालु हुन्छ ।

केरापिपा धुलो:

धुलो दुसीरोग २/३ ग्राम/लिटर पानीमा छर्दा यो रोग निको हुन्छ । पैसा बढी लाग्छ । अलि अलि विषालु हुन्छ ।

गाईको गोबर:

घासमा ब्याक्टेरियल डहुवा रोगका नियन्त्रणमा यस रोगको लक्षण देखिएमा घासको बोटहरूमा २० ग्राम गोबरको मल प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्दा नियन्त्रणमा आएको छ ।

Curex Aug Augomycine ६० ग्राम धुलो १०० लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने । Augomycine-१०० नामक विषादी २/३ ग्राम प्रति लिटर पानीको हिसाबले १५ दिनको फरकमा छरेमा नियन्त्रण हुन्छ ।

चिउरीको पिन:

माटोमा बसी बाली नालीलाई दुःख दिने धमिरा, रातो कभिला र खुम्चे किराको नियन्त्रणमा चिउरीको पिन २०० देखि २५० किलो प्रति हेक्टरमा मिसाउनाले नियन्त्रण हुन्छ ।
फोरेट/फ्युराडान १० देखि १५ किलो/हेक्टरको हिसाबले खेतमा प्रयोग गर्दा यी किराहरू नियन्त्रण हुन्छ तर असर धेरै दिन सम्म रहि रहन्छ ।

लसुन १०० ग्राम धुलो आधा लिटर पानी र २ चम्चा मट्टितेल मिसाई २४ घण्टा सम्म राख्ने र उक्त मिश्रण २ लिटर साबुन पानीको झोलमा मिसाई तरकारी बारीमा छर्दा बन्दाको लाही किरा, बन्दाको पुतली, सेतो खुम्चे आदिको नियन्त्रण हुन्छ । लसुनको प्रयोग गर्नाले विभिन्न कोसे बालीमा लाग्ने लार्भा किरा नियन्त्रणमा आएको छ । Thiodan 35ec/Malathion बन्दाको पुतली, खुम्चे किराको नियन्त्रण 2ml/L या water मा छर्दा नियन्त्रणमा आएको छ । यो विषालु छ ।

सुर्ती:

१ किलो सुर्तीको पात तथा डाँठको धुलोमा १५ लिटर पानी र १०० ग्राम लुगा धुने साबुन मिसाई एक दिन भिजाई भोली परत छरेमा लाही, थिप्स, फेद काट्ने किराको नियन्त्रण हुन्छ । यो ज्यादै खतरनाक हुन्छ ।

Desis/Monocrotophus गुपको विषादी २ एम.एल./लि. पानीमा मिसाई छनाले यो किराको नियन्त्रण हुन्छ । तर यो अलि खतरनाक हुन्छ ।

डहुवा:

गाईको गहुँत १:१ दुध मिसाई २०० एम.एल./ पानीमा मिसाउदा टमाटर बालीमा लाग्ने अगौटे तथा पछौटे डहुवा पनि नियन्त्रण हुन्छ । यो कम खर्चिलो औषधि हो । Blix-५० २/३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा स्रे गरेमा केही १५ देखि २० दिनको फरकमा २ चोटी स्रे गरे पछि नियन्त्रण हुन्छ । यो ज्यादै खर्च हुने खालको औषधि हो ।

दिगो माटो व्यवस्थापनका मूल सन्त्रहरू

दिगो माटो व्यवस्थापनको लागि निम्न चार मूल कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ :

- १) माटोको मलिलोपना र विरवाको मागको आधारमा मलखाष व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
 - २) बालीलाई कुनवेला कुन खाद्यतत्वको आवश्यकता पर्छ सोको आधारमा मलखाष प्रयोग गर्नुपर्छ ।
 - ३) नाइट्रोजनयुक्त मल एकैपटक प्रयोग गर्नु बुद्धिमानि हुदैन । सकभर बालीको आवश्यकता हेरेर मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
 - ४) दिगो माटो व्यवस्थापनको लागि सकेसम्म प्राज्ञिक पदार्थबाट सो ते नपुग्ने भएमा मात्र रासायनिक मलको थप प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । यसका लागि एकीकृत माटो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
- दिगो माटो व्यवस्थापनको मूल सन्त्रको रूपमा माटामा प्राज्ञिक पदार्थ घट्टन दिनु हुदैन । यसका लागि स्थानीय स्रोतहरू (गोठमल/ कम्पोस्ट मल, हरियो मल आदि) बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्नु पर्दछ र यिनले नपुगेको खण्डमा मात्र रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

नेपाल एक भूपरिवेष्टित कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित देश हो । मुलुकको आधा जसो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन् । करिब ८० प्रतिशत नेपाली परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित छ । कृषि व्यवस्थापन नेपालीको जिविकाको माध्यम मात्र नभई आर्थिक विकासको आधारशिला पनि हो । तर विडम्बना यति ठुलो जनसङ्ख्या कृषि व्यवसायमा आश्रित रहेता पनि कृषि अर्थतन्त्रको सेरुदण्ड भए तापनि कृषि व्यासाय आकर्षित व्यवसायको रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन । एक दशक अगाडि सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूका पंक्तिमा रहेको हाम्रो मुलुक हाल राष्ट्रिय आयको ठुलो हिस्सा खाद्यान्न आयातमा खर्च गर्ने गर्दछ ।

यो पनि निर्विवाद छ कि जब सम्म कृषिको विकास हुन सक्ने तब सम्म बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको जीवन स्तर माथि उठ्न सक्नेन । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रा लागि अपरिहार्य नभई अत्यावश्यक हो । कृषि विकासका लागि धेरै प्रचार भएका छन् र रहेका पनि छन् । देशको कृषि उत्पादन बढाउने क्रियाकलापहरूमा हानीकारक जीव नियन्त्रणका कृषि सँग सम्बन्धित विषादीहरूको प्रयोग हुँदा गतिमा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको छ । कतिपय बालीहरूमा २५ देखि ३० पटक सम्म विषादी प्रयोग गरिएको पाइएको छ । यति मात्र नभएर तयारी तरकारी बालीमा जस्तै: गोलभेडा, भण्टा आदि फलमा टिपी सके पछि तिनलाई विषादीमा डुबाई दिए पछि (चम्कीलो बनाउन) बजारमा ल्याएर बेच्ने कुकार्यहरू समेत हुन थालेका छन् । जसले गर्दा दैनिक आहारमा विषादीका अवशेष खान बाध्य भएका छौं । फलस्वरूप मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा विभिन्न विकारहरू देखिएका छन् वा क्यान्सर जस्ता भयङ्कर रोगका चपेटामा होमिन बाध्य हुन परेको छ । यसरी हामीमा (कृषक, प्राविधिक बिक्रेता) रहेका ज्ञानभावका साथै अविवेकीपना र सरकारको विषादी सम्बन्धि फितलो कानुनका कारणले गर्दा कृषिमा प्रयोग हुने विषादीले भयावह स्थिति सृजना भएको छ भने अर्को तिर बढ्दो जनसङ्ख्याको जीवन धान्न बढी उत्पादन लिनको लागि रसायनहरूको प्रयोग पनि बाध्यता भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको खाद्यान्न उत्पादनमा दिगो विकास गर्न विषादी कम भन्दा कम प्रयोग गरी वातावरण प्रदूषित हुनबाट जोगाउन विश्वासिलो र भरपर्दो उपायको खोजीमा संसारका धेरै देशहरूले अगाल्दै आएको उपाय हो । एकीकृत शत्रुनिब व्यवस्थापन (Integrated Pest Management) जसलाई छोटकरीमा I.P.M. भनिन्छ ।

आइ.पि.एम. के हो ?

एकीकृत शत्रुनिब व्यवस्थापन (I.P.M.) भन्नाले आर्थिक रूपले न्यायोचित एउटा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त दिगो बाली संरक्षण विधि हो । जसमा एउटा भन्दा बढी बाली संरक्षणका उपायहरू एक साथ वा अलग अलग रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

आइ.पि.एम. किन ?

- विषादीको अनुचित प्रयोगबाट बढ्दो स्वास्थ्य समस्या एवं वातावरणीय प्रदूषणबाट बच्न ।
- किरामा विषादी प्रतिको प्रतिरोधात्मक बढ्नाले किराको बिगबिगीबाट हुने सक्ने विषम परिस्थितिबाट बच्न र बचाउन ।
- दिगो विकासको लागि भरपर्दो विधि भएकोले ।
- स्वस्थ बाली उत्पादन बढाउन ।
- कृषकको आय स्तर बढाउन ।

आइ.पि.एम.का सिद्धान्तहरू

१) स्वस्थ बाली उत्पादन: स्वस्थ बाली उत्पादन गर्नु नै कृषि पेशाको मुख्य उद्देश्य हो । स्वस्थ बाली भयो भने त्यसबाट अधिकतम उत्पादन लिन सकिन्छ । स्वस्थ बाली उत्पादन गर्न कृषिका तमाम कार्यविधिहरू प्रयोगमा ल्याइन्छन् । जस्तै: राम्ररी जमिनको तयारी, उचित मात्रामा मलजलको प्रयोग बालीका उचित जातहरूको छनौट, स्वस्थ बीउको प्रयोग, उचित मात्रामा प्रयोग, बालीका विरवामा लाग्ने रोग र किराहरूको उचित किसिम (जैविक तरीका) बाट रोकथाम आदि ।

२) किरा तथा रोगहरूको प्रकृतिक शत्रुहरूको संरक्षण: प्राकृतिक सृष्टि भएकाले सबै प्रणालीलाई एक न एक प्रकारका प्राकृतिक शत्रुले आक्रमण गर्दछन् । त्यसकारण हाम्रा बालीनालीमा लाग्ने रोग र किराहरूका पनि आफ्नै प्राकृतिक शत्रुहरू छन् । जसले गर्दा तिनलाई (किरा र रोगका) धेरै बढ्दैनन् । निदिएर नियन्त्रणमा राख्नु छ । कहिले काहीँ प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रनाले कुनै रोग वा किराको बालीनालीमा अचानक प्रकोप हुन जान्छ । यसो हुनाको कारण हाम्रा क्रिया कलापहरू खसगरी रासायनिक विषादीको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा बालीविरुवाका रोग र किराको साथै तिनका प्राकृतिक शत्रुहरू जस्तै: परजीवि किराहरू, शिकारी किराहरू, माकुराहरू, शिकारी शूलशुलेहरू, छेपारो, भ्यागुता आदि प्राणीहरू पनि नाश हुन जान्छ । यसरी रोग र किराको प्राकृतिक शत्रुहरू नाश हुन भएमा रोग र किराहरू छिदै बृद्धि हुन

जान्छ र बालीविरुद्धमा फेरि हानी पुऱ्याउँछ । अतः यस्ता हानिकारक विषादी खेतबारीमा प्रयोग गर्दा बढी होस पुऱ्याउनु जरुरी छ ।

३) खेतबारीमा नियमित निरीक्षण एवं हेरचाहः नियमित रूपमा बालीनालीको निरीक्षण गर्नाले कुन बालीमा, कुन समयमा, कुन रोग वा किराहरू लाग्छन्, तिनको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ वा छैन, आफ्ना बालीनालीमा लाग्ने किराहरू एवं रोगहरूका प्राकृतिक शत्रुहरू छन् वा छैनन्, कस्तो किसिमको मौसममा कस्तो किसिमको रोग एवं किराहरू लाग्छन्, मौसम परिवर्तन हुँदा तिनको संख्यामा कस्तो असर पर्दछ । आदि विषयहरू राम्ररी अध्ययन गर्नाले कृषकलाई धेरै ज्ञान हुन्छ । अतः कृषक पाठशालामा कृषकहरूलाई नियमित रूपले हाजीर गराई बालीनालीमा उक्त विषयहरूका बारेमा अध्ययन एवं अवलोकन गर्न सिकाउनु पर्दछ । यस्तो अध्ययनलाई अंग्रेजीमा कृषि पर्यावरणीय अध्ययन (Agro-ecosystem Analysis) भन्दछन् ।

४) कृषकहरूलाई दक्ष बनाउनुः नियमित रूपमा खेतबारीको निरीक्षण गर्नाले हाम्रो कृषकहरूले कृषि पर्यावरणलाई राम्रो सित बुझ्ने र त्यसलाई विश्लेषण गरेर सही नतिजा निकाल्न सक्ने हुन्छन् । लाभो समय सम्मको अनुभव, नयाँ नयाँ किसिमका खेतबारीमा गरिने प्रयोग, अध्ययन र अनुसन्धानले किसानलाई एक सफल वैज्ञानिक बनाउँछ । विगतका अनुभवका आधारमा मौसमको अवस्था र अनुकुलता हेरी भविष्यमा आउन सक्ने आकस्मिक प्रकोप र त्यसबाट बच्न सकिने सम्भाव्य उपायहरूको समयमा नै व्यवस्था मिलाउन सफल हुन्छन् । यसरी एक कृषक स्थानीय स्तरमा एक श्रोत व्यक्ति र दक्ष प्रविधिक बन्न सफल हुन्छ ।

आइ.पी.एम. कृषक पाठशाला

आइ.पि.एम.का चार सिद्धान्तलाई व्यवहारीक रूपमा उतार्नका लागि बनाएको कार्यनीति नै कृषक पाठशाला हो । कृषक पाठशाला आइ.पि.एम. को मेरुदण्ड हो । यो पाठशाला यस्तो पाठशाला हो जसको कक्षा कोठा हुँदैन र पुर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पनि हुँदैन । खुल्ला आबास मुनिको खेतबारी नै यस पाठशालाको कक्षा हो भने खेतमा लगाएका बाली र सो बाली सँग सम्बन्धित जीव नै पाठ्यक्रमका अध्ययन हुन् । यस पाठशालामा सहभागीहरू महिला, पुरुष, युवा तथा पौढ जो सुके हुन सक्छ, उमेरको हद हुँदैन । एउटा निर्दिष्ट कृषकको खेतमा तोकिएको भित्ति र समयमा हलाको १ पटक भेला भई आइ.पि.एम. का सिद्धान्त अनुरूप बाली लगाई बालीनालीमा आई पर्ने समस्याहरू रोग, किरा, झारपात र अन्य विनाशकारी जीवहरूको सही पहिचान गराई तिनका प्राकृतिक शत्रु (मित्रजीव) को पहिचान एवं संरक्षण

गर्न सिकाउनु वा विनाशकारी प्राणीहरूले पुऱ्याउने क्षतिको मुल्याङ्कन गर्न सिकी यस्तो क्षति आर्थिक रूपले बढी हुने देखिएमा विभिन्न उपायहरूलाई एकिकृत गराई सबै भन्दा सस्तो र मानव तथा पशु पक्षी र वातावरणलाई सुरक्षित राख्न सिकाउने उपाय हो । यस प्रविधिमा रासायनिक विषादीलाई सके सम्म प्रयोग नगर्ने । तर तिनको कुनै विकल्प नपाइएमा बजारमा पाइने सबै भन्दा सुरक्षित विषादी सही तरीकाले मात्र प्रयोग गर्ने । रासायनिक विषादीका विकल्पहरू कृषकहरूलाई संलग्न गराई परिक्षण गरेर देखाउने ।

छोटकरीमा भन्नु पर्दा आइ.पि.एम. कृषक पाठशाला हो । मुख्य उद्देश्य भनेको कृषकहरूलाई तिनका बालीनाली एवं वस्तुभाउमा लाग्ने किरा एवं रोगहरूको सही पहिचान गर्न सक्ने र ती प्रणालीले पुऱ्याएको वा पुऱ्याउन लागेको क्षतिको सही मुल्याङ्कन गर्न सक्ने र मुल्याङ्कनको आधारमा यदि रोकथाम गर्नु पर्ने नै देखिएमा मानिस, पशु पक्षी एवं वातावरणलाई हानी नपुऱ्याउने र आर्थिक दृष्टिले लाभदायक उपायहरूको एकिकृत रूपले प्रयोग गरी समस्याको समाधान गर्न सक्षम बनाउनु हो ।

एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनका उपायहरू

१) खेती गर्ने तरीकाबाट रोकथामः

- खनजोत समयमा नै गर्ने ।
- बाली चक्र अपनाउने ।
- बाली लगाउने समयमा हेरफेर गर्ने ।
- खेतबारी सफा सुरु गर्नु ।
- रोग किरा नलाग्ने/कम लाग्ने जातको बाली लगाउने ।
- मिश्रित खेती गर्ने ।
- राम्ररी पाकेको गोबर मलको प्रयोग गर्ने ।

२) शारीरिक तरीकाबाट रोकथामः

- हातले टिप्ने ।
- जालीले पक्रने ।

३) भौतिक तरीकाबाट रोकथामः

- बत्तीको फन्दा (Light trap) ।
- तापक्रम र अर्हताको घटबढ गराई नियन्त्रण गर्ने ।

४) जैविक तरीकाबाट रोकथामः

- शिकारी र परजीवि किराहरू पालन गर्ने ।
- शुद्ध जीवाणुहरू ।

५) कानुनी तरीकाबाट रोकथाम ।

६) रासायनिक तरीकाबाट रोकथाम ।

१३२. जीवनाशक विषादीको सुरक्षित परिवहन

किटनाशक (जीवनाशक) विषादीहरू पोखिएर वा फुटेर वा कुन पदार्थ हो भन्ने लेबुल नभएर पनि छुट्टयाउन नसक्दा विषादी पदार्थबाट मानव जीवनमा विविध खाले समस्या आइपर्ने हुन्छ । तसर्थ ढुवानी गर्दा पोखिएर वा चुहिएर मानव जीवन र वातावरणमा असर पर्ने नदिन विषादी पदार्थको सुरक्षित ढुवानी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । हामीहरूकोमा ढुवानी गर्दा खाद्य सामग्री, औषधि र विषादीहरू एउटै गाडीले ओसार पसार गर्ने भएकाले सुरक्षित ढंगबाट ढुवानी गरी प्रदूषण हुनबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ ।

विष सम्बन्धि दुर्घटना हुन नदिन र पोखिन नदिनका लागि गरिनु पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निम्न लिखित छन्:

- टुकमा सामान राख्दा र झिक्दा विषादीलाई राम्रो सँग प्याकेजिङ गरिएको छ वा छैन जाँच्नु आवश्यक हुन आउँछ । कच्ची वा नराम्रो बाटोबाट विषादीहरू ओसार पसार गरिएको छ भने पुरानो, कमजोर वा बिग्रिएको भाँडो भएमा त्यो टुट्न वा चुहिन सक्छ, जसबाट अन्य सामग्रीहरूलाई प्रदूषित गर्ने र सवारी चालकलाई पनि हानी पुग्न सक्ने हुन्छ ।
- वर्षा वा सोझै पर्ने घामबाट जोगाउन विषको भाँडोलाई राम्रो सँग छोप्नु पर्दछ । विषको भाँडो भिज्न गएमा वा घाममा त्यत्तिकै रहिरेमा विषादी सामग्री बिग्रने प्रक्रिया शुरु हुन जान्छ र केही अवस्थारूमा खतरनाक घुवा उत्पन्न हुन सक्छ ।
- दुर्घटना हुन गएको अवस्थामा पहिचान गर्न सकिने प्रयोजनका लागि विषादी सामग्रीको सबै भाँडाहरूमा लेबुल लगाउनु पर्दछ । आदेशको रूपमा भन्ने हो भने किटनाशक विषादी ओसार गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुर्घटना भएको अवस्थामा र केही मात्रामा विष पोखिन गएमा के गर्नु पर्दछ त्यसबारे केही आवश्यक निर्देशनहरू दिइनु पर्दछ ।
- किटनाशक विषादीहरूलाई गाडीबाट झिक्दा पोखिनबाट बचाउन वा विषादी राखेको भाँडोलाई क्षति हुन नदिन विशेष सावधानी लिनु पर्दछ । विषादीहरू (खोल, पाउडर) टुकबाट ओसार पसार गरिएको हुन सक्छ र झिक्दा पोखिन सक्ने हुन सक्छ । त्यसैले सावधानी अपनाउनु पर्दछ ।
- विषादीहरू टुकमा राख्दा सुरक्षित हुने गरी र गह्रौँ सामान तल र हलुका तथा कम घातक सामान (विषादी) माथि राख्नु पर्दछ । खाद्य पदार्थ, लुगाहरू, बीउ वा पशुखाहालाई विषादी भन्दा धेरै टाढा राख्नु पर्दछ ।
- एकदम जररी नभए सम विषादी राखिएको टुकमा यात्रुहरू तथा पशुपंक्षी ओसारन हुँदैन । यदि एउटै टुकमा ओसारु पर्ने भएमा ती पशुपंक्षी र विषादी सामग्री भन्दा टाढा राखिनु पर्दछ ।

१३३. गाउँ-धरमा किटनाशक विषको भण्डारण

किटनाशक विषादीहरूको प्रयोग, म्याद, भण्डारण र यसबाट आइपर्ने समस्याको सही समाधान यी एक आपसमा अन्तरनिहित प्रक्रिया हुन् तथा समस्याको सही समाधान यी एक आपसमा अन्तरनिहित प्रक्रिया हुन् मानव जीवनमा अज्ञानमा थुप्रै विषादी सामग्रीहरूको गलत प्रयोग पनि भएक हुन सक्छ । त्यसैले पुनरावृत्ति नहोस् भनिकन हामी सबै किसान, कृषिकर्म तथा अन्य व्यक्तिहरूले किटनाशक विषादीको सुरक्षित भण्डारण गर्नु गराउनु त्यत्तिकै जरुरी छ जति विषादी छर्नका लागि मिसावट गर्दा वा छर्दा (सर्दा) सावधानी पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ ।

असुरक्षित तरीकाबाट किटनाशक विषादीको भण्डारण गरिएमा आलमारी र न्याकमा राखिएको विषको उपयोगिता घट्दै जान सक्छ । साथै पोखिने चुहिन विषको भाँडोबाट प्रदूषण सम्बन्धि खतरा बढ्ने हुन सक्छ । यसबाट विशेषतः केटाकेटी, अन्य व्यक्तिहरू र पशुपंक्षीको स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पर्ने र वातावरण समेत बिग्रन पुग्दछ ।

सुरक्षित ढंगबाट विष सामग्रीहरूको भण्डारण गर्ने केहि सामान्य नियमहरू निम्न लिखित छन्:

- १) खाद्य पदार्थ, पशु आहारा, बीउ विजन, मल र अन्य कृषि उपकरणबा विषादीहरूलाई बेग्लै अन्य सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गरिनु पर्दछ । जसबाट विषादीबाट घुर्वा निस्कन्छ र पोखिन गई प्रदूषण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
- २) विषादी सामग्रीहरूलाई सोझो घाम नपुग्ने गरी धेरै तात्न नसक्ने भिजनबाट बचाउन सुख्खा, बढी तापक्रम नभएको ठाउँमा भण्डारण गरिनु पर्दछ । विषादी सामग्री काँडबोर्डको भाँडोमा प्याकिङ गरिएको छ राखिएको छ भने चिसोपनाले त्यस भाँडोलाई भिजाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ र पछि प्रयोगमा नआउने गरी बिग्रन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के किटनाशक विष खासगरी पानीमा भिसिने पाउडर चिसिएर (डल्ला वा हि जस्तो भएर) प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । बढी तापक्रम सोझो घामको किरण प्याकेटमा पर्ने गई प्याकेटमा लेखिएको अक्षरहरू धमि हुन गई पढ्न नसक्ने हुन जान्छ र साथै तापक्रमका कारणले के विषादीहरूको विषालुपन फरक परी बिग्रन सक्छ ।
- ३) भण्डारण कोठालाई तालाबन्दी गरिनु पर्दछ । कोटाकेटीलाई विषबाट टा राख्न यस्ता कार्यहरू महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य छ । स्टोर कोठामा विषादी भनी पुर्व जानकारीका लागि ठोकामा खतरा अझै संकेत जरुरी छ ।

४) विषादी राखिएको कोठा अध्यारो पनि हुनु हुँदैन । त्यहाँ बाट हावा घर तर्फ बहने गरी बनाउनु पनि हुँदैन । पानी चुहिने पनि हुनु हुँदैन । तसर्थ उपरोक्त सावधानी अपनाई भण्डारण गरिनु जरुरी छ ।

५) विषादी राखिएको भाँडो चुहिने वा पोखिने गरेको छ/छैन, त्यो नियमित रूपमा जाँच्नु पर्दछ । विषादी पोखिएको पाइएमा तत्काल सफा गर्नु पर्दछ । विष सकिएका खाली भाँडाहरू वा कार्टोन, बाकस आदि जलाई नष्ट गर्नुपर्दछ ।

६) विषादी पोखिएमा वा चुहिएमा सो लाई तत्काल बालुवा वा माटोले छोपी गन्ध आउनबाट बचाई विस्तारै सफा गर्नु पर्दछ । अचानक आगालागी हुन गएमा पनि बालुवाले छोप्नु पर्दछ । अन्यथा पानी हालियो भने झनै ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ ।

बिक्री वितरण तरीका:

- लेवल नभएको, म्याद गएको विषादी नबेच्ने ।
- पेय पदार्थ राख्ने गरेको भाँडा, खाद्य पदार्थ राख्ने भाँडामा राखेर विषादी बेच विखन गर्नु हुँदैन ।
- स्टकमा रहेकालाई पहिला बेच्ने, लामो समय सम्म स्टक नराख्ने ।
- विषादीका पाकेटहरू तल्लामा मिलाएर राख्ने, त्यसमा भएका लेवलहरू देखिने गरी राख्ने । यसो गर्दा, क्षिप्ता वा राख्दा गल्ती हुँदैन र साथै विषादीलाई चाँग मिलाएर नराख्ने ।
- विषादी बेच विखनको रेकर्ड राख्ने, मिति (खरीद, बिक्री दुवै) रेकर्ड गर्ने ।
- खरीद गर्दा वा बेच्दा भाँडाहरू राम्रो निरीक्षण गर्ने किनकी चुहिने वा सिल टेडिएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता भाँडाका विषादी खरीद बिक्री गरिनु हुन्न ।
- भण्डारण र पसललाई सफा सुगंध राख्नु पर्दछ । खाली बट्टा, बोरा आदि यत्रतत्र राख्नु हुँदैन ।
- पोखिएको, चुहिएको छ भने तुरन्त सफा गर्नु पर्दछ । सफा गर्ने बालुवा, माटो, पानी, साबेल, कुचो आदि पनि पसलमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
- विषादी पसलमा एग्रोन वा लामो कपडा प्रयोग गर्नु पर्दछ । दुर्घटना भइहाले पनि नाह्रो शरीरमा नपरोस् भनेर यस्तो गर्नु पर्दछ ।
- विषादीको प्रकार, विषालुपन, अवस्था हेरी बेचविखन गर्ने, प्रचार प्रसार सामग्री, कम्पनीको भिबामितक र जानकारी व्यक्तिहरूले सुरक्षाको ब्याल गर्नु पर्दछ ।

चर्पी बनाऔं र सधैं चर्पीमा दिसा पिसाव गरौं ।

१३४. ऋण सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था र ऋण प्रवाह

हाम्रो जस्तो निम्न आयस्तर भएका कृषकहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा ऋण नभैकन नहुने एउटा व्यवस्था हो । अतः ऋण र त्यसलाई प्रवाह गर्ने संगठि निकायहरू बारे जानकारी राख्नु साम्प्रतिक देखिन्छ ।

बैंक भनेको के हो ?

- पैसाको कारोबार गर्ने पसल वा पैसाको व्यापार गर्ने ठाउँ ।
- सम्पति सुरक्षण राखी कर्जा पाइने ठाउँ ।

विकास बैंक भनेको के हो ?

- व्यापारमुखी नभई सेवा मुखी बैंक ।
- आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेको उद्देश्यहरू पूर्ति गर्नु पर्ने बैंक ।
- द्विगो आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने बैंक ।
- नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पारित बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने बैंक ।

यहाँ उदाहरणको रूपमा हामीले कृषि विकास बैंकलाई लिएका छौं । कृषकहरूको सरोकारको विकास बैंक कृषि विकास बैंक हो । यो विकास बैंक एन अन्तर्गत स्थापना भएको संस्था हो र यसको मुख्य उद्देश्य कृषकहरूलाई सहयोग गर्नु नै हो । यो बैंक छुल्लुका निम्न आधार थिए:

- नेपाल कृषि प्रधान देश हो ।
- ९०% जनता जीवनयापनको लागि खेतीमै भर पर्दछन् ।
- उत्पादनको लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू उचित मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
- त्यस कारण कृषिमा आसातित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।
- कृषि जन्य उद्योगहरू पनि सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध नहुनाले फस्टाउन सकिरहेका छैनन् ।
- यिनै कुराहरूलाई मध्य नजर गर्दै वि.सं. २०२० मा सहकारी बैंक र वि.सं. २०२४ माघ ७ गते कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो ।

उद्देश्य:

- कृषि विकासमा गतिशिलता ल्याउने ।
- जनताको आर्थिक हित र सुविधा कायम गर्ने ।
- सरल र सुलभ तरीकाबाट ऋण उपलब्ध गराउने ।

विकास बैकका तीन ढोकाहरूः

- विकास बैकः कृषि तथा ग्रामिण विकासको लागि सहयोग गर्छ ।
- वाणिज्य बैंकडः शहरी क्षेत्रमा बचत संकलन गरी ग्रामिण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छ ।
- साना किसान विकास आयोगनाः निम्न आय भएका साना किसानहरूलाई ऋण सहयोग गरी गरीबी निवारणमा सहयोग गर्छ ।

बैकका कार्यहरूः माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू अनुरूप निम्न बमोजिम कार्यहरू गर्नका लागि साधन र सुविधाहरू उपलब्ध उतराउँदछः

- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन,
- उत्पादित वस्तुको संरक्षण, प्रसोधन र बेचबिखन गर्न,
- सिंचाई व्यवस्था गर्न,
- कृषि व्यवसायलाई यान्त्रिकरण गर्न,
- कृषि तथा घरेलु उद्योग स्थापना र संचालन गर्न,
- पशु पक्षी पालन गर्न,
- बैकल्पिक उर्जा विकास तथा वितरण गर्न,
- फलफुल खेती, जडिबुटी, चिया, अलैंची र कफी खेती गर्न,
- गैहृ कृषि कर्जा ।

बैकबाट उपलब्ध हुने ऋणहरूः बैकबाट प्रवाह हुने ऋणहरू तथा सो मा प्रचलित ब्याजदरको विवरणः

क्र.सं. उद्देश्य	भुक्तानी अवधि	ब्याजदर (%)
मासिक ब्याज बुझाउँदा हुने ब्याजदर (%)		
१ उत्पादन ऋण	छोटो	१५
२ सिंचाई ऋण	मध्यम	१५
३ पशुपक्षी पालन	मध्यम	१५
४ कृषि तथा घ.व.	छोटो/मध्यम	१६
५ बैकल्पिक उर्जा	मध्यम	१५
६ फलफुल खेती	मध्यम/लामो	१२
७ गोदाम तथा कोल्ड स्टोर	लामो	१३
८ बेच बिखन	छोटो	१६
९ गैहृ कृषि उर्जा	छोटो	१६

ऋणको किसिमः ऋणलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा निम्नानुसार वर्गिक गर्न सकिन्छः

- छोटो अवधिको ऋणः ६ देखि १८ महिना सम्म चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण ।
- मध्यम अवधिको ऋणः १ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण ।
- लामो अवधिको ऋणः ५ वर्ष देखि १५ वर्ष सम्म चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण ।

ब्याजदर निर्धारणः कृषि विकास बैकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा निम्न कुरा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

- हाल बैकमा सुहृलियत दरको ब्याज उपलब्ध छैन ।
- रु. ५००। सम्मको ऋण पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
- देशका कुना कुना सम्म पनि सेवा दिनु पर्ने हुन्छ ।
- राष्ट्र बैक र बैकिङ्गबाट ११ मा पुर्नकर्जा प्राप्त गर्छौ ।
- गाउँ-घरमा अहिले पनि मासिक ३% ब्याजदर कायम छ ।
- ब्याजदर लिने र दिने बीचको सन्झौता पनि हो ।

ऋण पाउनको लागि आवश्यक योग्यताः

- बालिग नेपाली नागरिक हुनु पर्ने छ ।
- कम्तीमा ५० धितो ऋणको हुनु पर्ने छ ।
- अन्य श्रोतबाट ऋण नलिएको वा साख सुचना राम्रो भएको हुनु पर्ने छ ।
- ब्याक लिष्टमा नपरेको व्यक्ति हुनु पर्ने छ ।

ऋण लिन आवश्यक कागजातहरूः

- जरागाथनी प्रमाणपुर्जा/चालु आ.व.को रसिद
- नागरिकताको प्रमाणपत्र
- धितो राखिने घर/जरागाको नक्सा
- घर प्रमाणित पत्र
- चौहाडि प्रमाण पत्र
- घरको नक्सा
- रिक्कम
- सामानहरूको कोटेशन
- फार्म दर्ता प्रमाणपत्र
- विद्युतको सिफरिस
- घरायसी मन्जुरिनामा
- फोटो ।

धितो सम्बन्ध व्यवस्था: सामान्यतया घर/जग्गा धितो लिइन्छ तर ऋणीको कारेबार हेरी बैकमा खरिद भएको सेसिन औजारलाई समेत धितो राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

क्र.सं.	धितोको किसिम	भाजिन राख्नु पर्ने	ऋण प्रदान गर्न सकिने
१)	जग्गा	२०	८०
२)	घर/गोदाम	३०	७०
३)	सेसिन/औजार	४०	६०

ऋण स्वीकृति प्रकृया:

- नाम दर्ता
- परियोजना परिक्षण
- धितो निरक्षण
- ऋण मागपत्र पेश
- ऋणको विश्लेषण
- माईन्युटिड
- धितो रोक्का
- तमसुक/आ.प.
- ऋण प्रदान ।

ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू:

- धितो आफै रोक्का गर्नु पर्ने,
- र. ५०,०००। भन्दा माथिका ऋणमा २५ किमेटमेन्ट चार्ज र १ सेवा शुल्क ऋणीले व्यहोर्नु पर्दछ तर अर्को पटक बुझाएको ३ महिना भित्र उतिनै रकम लिएमा शुल्कहरू नलाग्ने,

ग्रा.सु.को.वापत ५% रकम जम्मा गर्नु पर्ने:

- यो ऋणीको दायित्व हो ।
- आफ्नो खल्लीको पैसा हुनाले ऋण बुझाउने तर्फ प्रेरित हुन्छ ।
- बैकलाई लिएको घुस होइन ।
- बचत सरह ७% ब्याज दिइन्छ ।
- सावा ब्याज बुझाउँदा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
- बैकिङ्ग कारोबार गर्न सकिन्छ ।

बैकबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू

- १) ग्रीन कार्ड व्यवस्था:
- बिगत ३ वर्ष देखि वित्तीय अनुशासनमा रही कारेबार गरेको ।

- ग्रीन कार्ड ऋणीलाई ब्याजदरमा नै १ ब्याज छुट प्रदान गरिन्छ ।
- र. ५०,०००। सम्मको थप सुविधा दिइन्छ ।

२) मासिक ब्याज बुझाउँदा हुने फाइदा:

- बुझाएको ब्याजमा १५ छुट दिइन्छ ।
- सावा रकम बुझाउँदा बोझा हल्का महसुस हुन्छ ।
- थोरै थोरै गरेर सावा पनि घट्टै जान्छ ।
- थप कारोबारका लागि बैकले सुविधा दिन्छ ।

३) कुल उत्पादन ऋण

- वर्ष भरिमा आवश्यक पर्ने ऋण एक पटक स्वीकृत हुन्छ ।
- पटक पटक ऋण माग पत्र गरी रहनु पर्दैन ।
- लिएको ऋणमा मात्र ब्याज लाग्छ ।
- समय र पैसाको बचत हुन्छ ।

४) लाइन अफ क्रेडिट:

- संचालन पुजी बेचबिखनमा यो सुविधा दिइन्छ ।
- अन्तिम भुक्तानी सम्म जति पटक पनि ऋण लिने गर्न सकिन्छ
- पुरै रकम बुझाउन आवश्यक छैन ।
- ब्याज कम लाग्छ ।

५) हालको विशेष सुविधाहरू:

- र. १०,०००। सम्मको ससुर्ण ब्याज छुट छ ।
- र. ४०,०००। सम्मको ऋणमा सावा बराबर मात्र ब्याज बुझाउनु पर्ने ।

बैकमा हुनुनुपर्ने अवस्थाहरू:

- परियोजना नभएमा,
- अर्काको परियोजना देखाउन खोजेमा,
- अन्य उद्देश्य देखाई ऋण लिन खोजेमा,
- धितो मुल्याङ्कन भन्दा बढी ऋण खोजेमा,
- अर्को व्यक्तिको धितो राखी ऋण लिन खोजेमा,
- आवश्यक कागजात पुरा नगरेमा,
- आवश्यकता भन्दा बढी ऋण लिन खोजेमा,
- कर्मचारीलाई प्रलोभन देखाई ऋण लिन खोजेमा,
- डराई धम्काई ऋण लिन खोजेमा,
- हद म्याद नपुगेको धितो पेश गरेमा,
- सक्कल कागजात सत्याई पेश गरेमा ।

पृष्ठ. सहकारीताको माध्यमबाट अगावा कृषक लाभान्वित हुन सक्छन्

सामूहिक हितका लागि परस्परमा मिलेर गरिने प्रयास नै सहकारी प्रयास हो । त्यस प्रयासमा सबै आपसमा आवद्ध भएर जुन संगठन बनाउँदछन् त्यो नै सहकारी संस्था हो । संस्था गठन गर्न एकजुट हुने, संस्थाका क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने, आआफ्नो तर्फबाट सक्ने त्याग, सक्ने योगदान गर्ने तथा त्यसरी संस्थाका माध्यमबाट व्यवस्था गरिएका सेवाहरूको उपयोग गरेर सबै जना लाभान्वित हुने प्रक्रिया नै व्यावहारिक अर्थमा सहकारीता हो ।

यो प्रक्रियाको प्रारम्भ विभिन्न समस्याहरूबाट हुन्छ । सबै सदस्यहरू मिलेर समस्याहरू सुन्नुआउन अधि बढ्नु पर्ने आवश्यकताको बोध हुन्छ । सहकारीताको सफलताको लागि सदस्यहरूको अटोट, सक्रियता आवश्यक हुन्छ । समाजमा व्यापारी, साहु, ठेकेदार, उद्योगपति जस्ता विभिन्न रूपका मध्यस्थहरूको मुनाफाखोरी प्रवृत्तिबाट पिडित वर्ग तथा स्वावलम्बी भान्सा भएका व्यक्तिहरू सहकारी पद्धती अनुरूप संगठित हुन सक्छन् र आफ्नो आर्थिक, सामाजिक उन्नतिको लागि चाहिने सबै वस्तु तथा सेवाहरूको बन्दोबस्त आफै गर्न सक्छन् ।

सहकारी संस्थाहरूको गठन, संचालन र विकासका लागि छुट्टै किसिमको नीति, नियम, परिपाटी र कार्यशैली विकास भएका छन् । यिनै नीति, नियम, परिपाटी र कार्यशैलीहरूका आधारमा सहकारी सिद्धान्तहरू बनेका छन् । यी ७ वटा सहकारी सिद्धान्तहरू सर्वमान्य छन् । विश्वभरीका सहकारी संस्थाहरूले तिनको अनुसरण र पालना गर्छन् ।

- स्वच्छिक तथा खुला सदस्यता,
- सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
- सदस्यहरूको आर्थिक सहायता,
- स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
- शिक्षा, तालिम तथा सृजना,
- सहकारीहरू बीच सहकारीता,
- समुदाय प्रति चासो ।

सहकारी संस्थाहरूबाट कस्ता किसिमका फाइदाहरू भिन्न सक्छन् ?

सहकारी संस्था कुनै व्यक्ति विशेषको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्न गठन भएको हुँदैन । यसबाट संस्थाका सबै सदस्यहरूको भलो हुन्छ । सहकारी संस्थाले

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण सदस्यहरू र समाजलाई नै फाइदा पुर्याएको हुन्छ ।

- सामाजिक फाइदा: आफ्ना सदस्यहरूको हित गरी अन्ततः स्वच्छ र समुन्नत समाजको निर्माण गर्नु हो । यसमा इमान्दारीताको विकास, एकताको भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व अनुभव, नेतृत्वको विकास, सामुदायिक विकास ।
- आर्थिक फाइदा: सदस्यहरूलाई आर्थिक व्यवहारमा रहेका असमानता, शोषण तथा गरिबीबाट बचाउने कार्य सहकारी संस्थाले गर्दछ ।
- शैक्षिक फाइदा: सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ ।

यसरी अगसवा कृषकले पनि सहकारी संस्था मार्फत आफ्ना कार्यक्रम संचालन गरी आफु लाभान्वित हुने र समाजलाई पनि फाइदा दिन सक्छन् । अगावा कृषकसंगठित भएर सहकारी संस्था खोलेर आफ्नो एवं समुदायको फाइदा हुने क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्छन् । सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि विषयमा यस किसिमको सहकारी संस्था गठन गर्न सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई विषयगत संस्था पनि भनिन्छ । जस्तै दुध उत्पादक सहकारी संस्था छ भने त्यस संस्थाले सदस्यहरू संग दुध खरीद बिक्रीको अलावा दुध उत्पादन बढाउनको लागि सदस्यहरूको निमित्त बढी दुध दिने नयाँ जातका पशुपालनको व्यवस्था मिलाउने, स्वस्थ पशुपालनको लागि पशु आहारा (दाना, घाँस) तथा पशु स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउने, उत्पादित दुधको प्रशोधन गरी दुधबाट बन्ने वस्तु बनाउने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यमा आफ्नो कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्दछ ।

राम्रो पशुपालन भएको क्षेत्र एउटा यस्तो सहकारी संस्था खोलिएोस जसले आवश्यकता अनुसारको पशु सेवा र कृषि कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक सेवाहरू प्रदान गरिोस् ।

दुध उत्पादक सहकारी, यसको खाता राख्ने तरीका र दुध मुल्य निर्धारण सम्बन्धि जानकारी

समान उद्देश्य र समान आयश्रोत भएका व्यक्तिहरूद्वारा आपसी सहयोगको आधारमा आफ्नो आर्थिक एवं सामाजिक विकासको लागि प्रजातान्त्रिक तरिकाले गरिने कार्यलाई सहकारीता भनिन्छ ।

नेपालमा सहकारीताको शुरुवात २०१८ सालदेखि भएको हो । सहकारीताको माध्यमबाट जाँदा पुजी जुटाउन र कार्य संचालन गर्न सजिलो पर्दछ । हामी संग भएको उत्पादित सामग्री एकै ठाउँमा जम्मा गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा सजिलो पर्दछ ।

विशेषताहरू:

- सहकारी संस्था पुजी प्रधान भनै मानिस प्रधान हुन्छ । एक व्यक्ति एक भोटको आधारमा संचालक समिति गठन हुन्छ ।
- नाफा कमाउने भन्दा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले संचालित हुन्छ । त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले १५% मुनाफा मात्र शेयर सदस्यहरूलाई वितरण गरिन्छ ।
- सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यता साहै खुल्ला रहन्छ ।
- लगानीको आधारमा नभै समता र पारस्परिक सहयोगको आधारमा संचालित भएको हुन्छ ।
- सदस्यहरूको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ध्यान दिइन्छ ।
- सहकारी संस्थाहरू अनैतिक र अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा नभै नैतिक व्यवसाय संचालन गर्दछन् ।

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था: नेपालमा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरूको विकासमा दुग्ध विकास संस्थानको सम्पूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना २०२६ सालमा गरियो । जसले गाउँमा उत्पादन भएको दुग्ध संकलन गरी प्रशोधित गरी बजारमा पुर्‍याउने कार्य गर्न थाल्यो । दुग्ध संकलन थोरै र बजारको माग बढी हुन थाले पछि दुग्ध विकास संस्थाले दुग्ध संकलन वृद्धि गर्नको लागि २०३८ पौषमा सहकारीको स्थापना गरियो । २०३८ साल पौष २० गते मोरङ जिल्लामा प्रथम दुग्ध उत्पादक संस्थाको गठन भयो । यो सहकारीको सिद्धान्तमा संचालित संस्था भए तापनि यसको दर्ता सहकारी कार्यालयमा नभै दुग्ध विकास संस्थाबाट मान्यता दिइएको संस्था थियो । त्यसैले विभिन्न कानुनी अडचनहरू आइरहन्थे । ती कानुनी अडचनहरू हटाउन पछि ती संस्थाहरूलाई १३०० जति रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको गठन तथा संचालन विधि: संस्था गठन गर्दा सम्बन्धित स्थानका कृषकहरूलाई बोलाई सरसल्लाह गरिन्छ । सबै कृषकहरू सहकारी संस्था दर्ता गर्ने इच्छुक भएमा त्यसलाई गठन गर्न तिर जानको लागि प्रारम्भिक भेला बोलाई निम्न कुराहरूमा छलफल चलाइन्छ ।

- कसरी संचालन गर्ने/कति जना सदस्य आदि ?
- शेयर रकम कति राख्ने/नराख्ने ।

- वित्तियमको तयारी गर्ने ।
- संस्थाको नाम, ठेगाना र कार्यक्षेत्र तोक्ने
- प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्ने ।
- मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने ।
- तदर्थ समितिको गठन: संस्था दर्ता गराई ३ महिना भित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाई स्थायी संचालक समितिको गठन गर्ने ।
- कुनै पनि प्रारम्भिक संस्था दर्ता गर्न घटिमा २५ जना सदस्य हुनै पर्छ । वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू मिली जिल्ला सहकारी संघको निर्माण हुनेछ । १५ वटा जिल्ला सहकारी संघ मिली केन्द्रीय सहकारी निर्माण गरिन्छ ।

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लि. मा आवश्यक पर्ने खाताहरू:

- खर्च भएर नजाने खाता,
- खर्च भएर जाने खाता,
- कृषकहरूको व्यक्तिगत खाता,
- दैनिक खरिद एवं बिक्री खाता,
- बैंक नगदी किताब र
- आवश्यकता र संस्थाको कारोबार अनुसारका अन्य खाताहरू ।
- दुग्धको मुल्य निर्धारण प्रक्रिया: कुनै पनि सामग्रीहरू खरिद बिक्री गराउनु उत्पादक क्रेता एवं क्रेता र बिक्रेताको बीचमा एउटा मुल्यमा सम्झौता हुन्छ । क्रेताले जहाँ सस्तो दरमा सामान पाउँछ त्यही बाट खरिद गर्दछ भन्ने बिक्रेताले पनि जहाँ बढी मुल्य पाउँछ त्यही नै बिक्री वितरण गर्दछ ।

यसरी मुल्य निर्धारण क्रेता र बिक्रेताको बीचको सहमती एवं सम्झौता हो दुग्ध बिक्री एवं खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर अनुसार मुल्य निर्धारण गरिन्छ दुग्धको गुणस्तर त्यसमा रहेको Fat को प्रतिशत र SNF को प्रतिशतको आधारमा गरिन्छ ।

यसरी खरिद गर्दा बैसीको दुग्धमा ५% Fat र ८% SNF तथा गाईको दुग्धमा ३% Fat र ८% SNF हुनै पर्छ । त्यो भन्दा कम भएमा त्यसलाई न्युनतम गुणस्तरको दुग्ध मानिन्छ र खरिद गरिदैन । यसरी Fat र SNF Test बाट खरिद बिक्री गर्दा दुग्ध उत्पादक र दुग्ध खरिद गर्ने सहकारी संस्था दुवै लागू सजिलो पर्दछ । दुग्धमा पानी वा अन्य केहि मिसाइएमा Fat र SNF घट्दछ Fat र SNF घट्ने बित्तिकै मुल्य पनि घट्न जान्ने हुँदा बिक्री वितरण गरिने दुग्धमा कृषकहरूले पानी मिसाउने सम्भावना निकै कम रहन्छ ।

यसरी Fat को र SNF को प्रतिशत निकाल्न Fat Test र SNF Test गर्नु आवश्यक पर्दछः

- Fat % गाइको दुधमा ३ - ५%
- Fat % भैसीको दुधमा ५ - ७%
- SNF गाइको दुधमा ८ - १३.००
- SNF भैसीको दुधमा ८ - १६.५

हाल (वि.सं. २०५९ साल) दुधको विकास संस्थाको दरः

- Per Fat Rs. १.७६ x ५ = Rs. ८.८०
- Per SNF Rs. १.१७ x ८ = Rs. ९.३५
- Per Litter Rs. १८.१५

Cost of production को आधारमा मुख्य निर्धारण गरिन्छ । तर दुधमा Cost of production निकाल्न गाह्रो हुने हुँदा Fat र SNF को आधारमा दुधको मुख्य निर्धारण गरिन्छ ।

सहकारीहरूमा संलग्न भै आफ्नो र समूहको विकास गरौं ।

१३६. सहकारीका सिद्धान्तहरू र यसका उपदेयताहरू

सहकारीका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर जान्नु भन्दा अगाडि सहकारी भनेको के हो, यसले के गर्छु, यसको प्रक्रियाहरू, उद्देश्यहरू के-के हुन् भन्ने जान्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ ।

सहकारी भनेको सहकार्य हो र सहकार्य भनेको एक दोश्रो सँग आवद्ध रही कुनै उद्देश्यको परिपुर्ती गर्न सबै मिलीजुली गर्ने कार्य भनेकै सहकार्य अर्थात् सहकारी हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सबैको लागि एक र एकको लागि सबै भन्ने नाराका साथै सहकारीको भूमिका रहेको हुन्छ ।

पहिले सहकारी आन्दोलन जनस्तरमा नभइकन सरकारी निकायको नियन्त्रणमा संचालन भइरहेको थियो । २०१३ साल तिर सरकारी स्तरमा राप्तीढुन बसोबास सहकारी संस्था खोली बाढिपिडितहरूलाई स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले खोलिएको पाइन्छ भने २०४६ अगाडि सहकारी संस्थाको रूपमा साझा संस्था गठीत भई सरकारी नियन्त्रणमा संचालन हुँदै आइरहेको थियो र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको हुनाले यसले ऐच्छिक, खुलापन, प्रजातान्त्रिक हिसाबले संचालन हुन सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात २०४६ साल पछि सरकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी भई सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तदनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरू धमाधम खुल्दै गए र च्याउ उमेर झै अनिगिन्ती सहकारी संस्था खुल्दै गए । सहकारी ऐन २०४८ ले दिएको व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरू मुख्य र मान्यताको आधार रहने व्यवस्था भएको छ । मुख्य भनेको खगिभ अर्थात् विश्वास र मन्यता अर्थात् निर्दिष्ट आचरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । अग्रजातान्त्रिक ढंगले खुलेको संगठन सफल हुँदैनन् भन्नेमा सबै सहकारी कार्यकर्ताहरू विश्वस्त छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र मुख्य हो भने सहकारी संस्था एक व्यक्ति एक मत हुने प्रचलन मान्यता हो । त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना मुख्यहरूलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न मार्ग निर्देशन मानेको छ ।

सहकारी संस्था र अरु संस्थाहरूमा समता र विभेद

विशेषता	निजी क्षेत्र कम्पनी	गैर सरकारी संस्था	सरकारी संस्था
स्वभाव	व्यावसायिक	कदपाणकारी	व्यावसायिक
सेवा	अरुको पुजी	अरुको	अझै सदस्यको पारस्परिता
सांगठनिक जग	पुजी	लगाणीको सदुपयोग	सदस्यको उत्पादनमा प्रवर्द्धन वा उपभोक्ताको स्तर वृद्धि
सामाजिक नाता	समाज सेवा र खुलापन र आत्मविश्वास	एक सदस्य	मानविय भावना

सहकारीका सिद्धान्तहरू र यसका उपदेयताहरू

१) स्वेच्छिक तथा खुलापन सदस्य: कुनै जातिय भेदभाव र धनी, गरीबको भेदभाव नरहने र साना स्तर व्यवसायीक गर्ने कुचिकार देखि प्राध्यापक, उच्च तहका व्यक्ति हुने भएकोले एक दोश्रो संग चिनजान, समान व्यवहार हुने र स्वेच्छिक सदस्यता ग्रहण गर्ने र परित्याग गर्न सक्ने हुन्छ ।

२) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण: संस्थाको नीति नियम तर्जुमा, कार्य समितिको छनौट आदिमा सक्रियता पुर्वक भाग लिन सकिने, निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने र एक व्यक्ति एक मतको आधारमा सबै समान रूपले सहभागीता हुन सक्ने व्यवस्था हो ।

३) आर्थिक सहभागीता: संस्थाको सम्पत्तिमा साझा हक समान र लगानीको प्रतिफल बराबर पाउने तथा कारेबारको अनुपातमा पुजी अनुसार लाभांश पाउने हुन्छ ।

४) स्वायत्तता तथा आत्म निर्भर: सदस्यहरूबाटै नियन्त्रित आत्म सहयोगी एवं बाह्य श्रोतबाट पुजी लगाउनु पर्दा आफ्ना सदस्यहरू माझ रही सबैको दबावमा नपरी राय सल्लाह दिन सकिने स्वायत्तता संस्था हो ।

५) शिक्षा तथा तालिम: आफ्ना सदस्यहरूको हितको लागि शिक्षा र तालिमको व्यवस्था हुने, नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था हुने र सदस्यहरूलाई सहकारीता बारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने आदि ।

६) सहकारी संस्थाका बीच सहयोग: स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अर्न्तराष्ट्रिय संचारको माध्यमबाट आपसमा मिली प्रभावकारी ढंगले सदस्यहरूको सेवा गर्नुका साथै भिल्यो जुल्दो व्यवसायीक संस्था बीच आयात निर्यात, खरीद बिक्री एवं आवश्यक परेको अण्डमा पुजीको श्रोत जुटाउन ऋण उपलब्ध गराउने आदि ।

७) समुदाय प्रतिको सरोकार: सहकारी शिक्षा, सामुहिक सेवा, सामाजिक पुर्वाधारहरूको सृजना एवं संरक्षण जस्ता कार्यमा सहयोग गर्दछ ।

हिजोआज व्याउ उमेर झै अनिगिन्ती रुपमा खोलिएका संस्थाहरू खोलेको परिप्रेक्षमा कैयौं संस्थाहरू ठगी गर्ने नियतले अथवा खास खास व्यक्तिको स्वार्थीपन र लाभ लिने उदेश्य लिई खोलिएको पनि यदाकदा देखिन आएको छ भने कतिपय संस्थाहरू अज्ञानता, लापरवाही, एक आपसमा असहयोग र स्वार्थीपनाले असफल भएका पनि देखिन्छन् । सहकारी संस्थाहरू असफल हुनुमा मुख्य कारणहरू निम्न रहेका छन्:

- संचालक समिति हैकमवाद भएमा,
- कर्मचारीहरू भ्रष्ट र अनुशासन हिन भएमा,
- संस्थाका सदस्यहरूले नै चासो नलिएमा,
- व्यवस्थापन अनुभव हिन र निकम्मा भएमा र
- सदस्य/सदस्य बीच मेल मिलाप नभई कलह भएमा ।

संचालक समिति र लेखा समिति

संचालक समिति

विश्वमा सर्वप्रथम सहकारीको स्थापना १८४४ मा बेलायतमा भएको पाइन्छ भने त्यस पछि आएर पश्चिमी मुलुकमा सहकारी भावनाले ओतप्रोत र प्रेरित भएर विभिन्न देशहरूमा स्थापना भयो । सोहि अनुरूप नेपालमा पनि राप्ती हुन देखि सहकारी संस्थाको परिकल्पना वस्तुतः सेवा विन्दुको रुपमा भयो ।

नेपालमा सहकारी ऐन २०१० बने तापनि सहकारी संस्था खुलेका संस्थाहरू सहकारी कार्यालय र कहिले कपि विकास कार्यालयको निगरानीमा रहयो । त्यसबाट सहकारी संस्थाहरूले कुनै खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

नेपाल सरकारले सहकारीलाई निरन्तरता दिदै आए बमोजिम सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि सहकारी विभागको नीति निर्देशन बमोजिम त्यसपछि आएर सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियम बनाई सम्बन्धित जिल्ला सहकारी कार्यालयबाट स्वीकृति लिई सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुदै आए ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा १३ मा प्रत्येक शेयर सदस्यहरूको एक साधारण सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाका सदस्य बन्नको लागि निजहरूले सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट शेयर लिएकै हुनु पर्छ ।

सबै निर्णयहरू साधारण सभाबाट लिन असम्भव हुने हुँदा साधारण सभाका सदस्यहरूबाटै संचालक समितिको गठन गर्ने गरिएको छ । संचालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव तथा संचालक सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दछन् । उक्त संचालकहरू सर्वसम्मतिमले मनोनित गर्ने वा गोप्य निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार साधारण सभामा निहित छ ।

संचालक समिति संस्थाको कार्यकारी अङ्ग हो । तर यो आफैमा अधिकार सम्पन्न हुदैन । यसले साधारण सभाबाट प्रत्यायोजित व्यवस्था अन्तर्गत उत्तरदायित्व श्रृंखलामा बसेर काम काज गरेको हुन्छ । भन्ने हो भने संचालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार साधारण सभाको नै हो ।

साधारण सभाबाट अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष १ जना, सचिव १ जना र संचालक सदस्य ८ जना, कहि कहि संचालक सदस्य ४ जना हुनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम संचालक रहन्छन् ।

कुनै संचालकको पद मृत्यु भएमा, राजिनामा दिएमा वा अन्य कुनै प्रकारले रिक्त हुन गएमा साधारण सभाले निजको बाँकी अवधिको सो पद निर्वाचन द्वारा पुर्ति गर्दछन् । संस्थाको कार्यावधि संस्थाको विनियम बमोजिम कतै २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष र ५ वर्ष सम्म कायम गरेको पाइन्छ ।

संचालक पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्थाहरू:

- उमेर नपुगेको/ १८ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने ।
- मगज ठीक नभएको/अदालतबाट प्रमाणित ।
- आचरण ठीक नभएको/चोरी, डकैतीमा प्रमाणित भएको ।
- संस्थाको ठेक्कापट्टा वा करेबार कुनै प्रकारको नीचि स्वार्थ भएको ।
- संस्थालाई तिर्नु पर्ने बाँकी बक्यौता राख्ने ।
- संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ।
- अन्य सहकारी संस्थाको संचालकमा पदासिन रहेको ।
- संस्थाको बहालवाला कर्मचारी ।
- संस्थाको शेयर खरिद नगरेको ।
- संस्थाको कालो सुचिमा परेको ।
- टाट उल्टेको ।

संचालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था:

- पदबाट राजिनामा दिई स्वीकृती भएमा,
- साधारण सभाले मनासिव कारण देखाई बहुमतको आधारमा हराएमा,
- बिना सुचना बैठकमा ३ पटक सम्म अनुपस्थित रहेमा,
- जग्गीजग्गी संस्थाको हित तथा ब्यातीमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै व कार्यवाहि गरेको प्रमाणित भएमा ।

देहाय बमोजिम संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछः

- ऐन नियम र विनियममा लेखिएका कुराहरू र साधारण सभाद्वारा स समयमा गरिएका निर्णयहरूको अधिनमा रही संस्थाको सम्पूर्ण काम कारोबार प्रबन्ध, अधिराहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने गराउने ।
- Full Time अध्यक्ष नभएका संस्थाहरूमा संस्थाको दैनिक काम सुचारु रूप संचालन गर्न व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्ने ।
- संस्थाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सेवा, सल्लाह, सुझाव, बढुवा, निलम्बन, बरखास्त, राजिनामा स्वीकृती तथा सेवा सुविधा र सजाय सम्बन्धि कर्मचारी प्रशासन नियमावली, आर्थिक कारोबार संचालनको लागि आर्थिक प्रशासन नियमावली, कर्जा ऋण नियमावली बनाई लागु गर्ने गराउने ।
- विनियममा व्यवस्था भए अध्यक्ष लगायत संचालक सदस्य कुनैले राजिनाम दिएमा स्वीकृती गर्ने ।
- संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम तथा आम्दानी खर्च बजेटको विवरण तयार गरी स्वीकृतीको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने ।
- वार्षिक स्वीकृती भएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने ।
- संस्थाको कोषको सुरक्षा तथा आर्थिक कारोबार माथि नियन्त्रण तथा सो को व्यवस्था गर्ने ।
- विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम प्रक्रिया अपनाई साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने ।
- साधारण सभाबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
- संस्थाको चल अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्ने वा प्राप्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने ।
- संस्थाको कार्यहरू सुचारु रूपले संचालन गर्न आवश्यकतानुसार उपसमितहरू र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने ।

अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:

- संस्थाको विनियम बमोजिम मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक बैठक हुने संचालक समितिको बैठक अध्यक्षता ग्रहण गर्ने ।

- वार्षिक साधारण सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
 - साधारण सभाबाट पारित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने ।
 - धारण सभाबाट पारित निर्णय र संचालक समितिबाट पारित निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने ।
 - संस्थाको उद्देश्य प्रीत्यका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्ने सम्बन्धमा विनियमको अधिनमा रही अती जरुरी विषयहरूमा समितिको तर्फबाट तत्काल निर्णय गर्न सक्ने छ तर यसरी निर्णय दिएकोलाई तत्काल बस्ने बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ।
 - आर्थिक कारोबार संचालन गर्ने ।
 - संचालक समितिबाट आएको प्रस्ताव बराबर भएमा निर्णायक मत दिने
- उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्यहरू गर्नु पर्नेछ ।

सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार:

- अध्यक्षको अनुमती र आदेशानुसार संचालक समितिको बैठक बोलाउने
- अध्यक्षको अनुमति र आदेशानुसार साधारण सभा, विशेष साधारण सभाको वार्षिक बैठक वा आपतकालिन बैठक बोलाउने गरी आह्वान गर्ने ।
- संचालक समितिले पारित गरेको निर्णयहरू माइलस्ट बुकमा लेख्ने र जानकारी गराउने ।
- संस्थाको माइलस्ट बुक सुरक्षित राख्ने ।
- आर्थिक कारोबार संचालन गर्ने ।
- संस्थाको गतिविधिको जानकारी गरी राख्ने ।
- संस्थाको गतिविधिहरूबारे संचालक सदस्यहरूमा समय समयमा जानकारी द्दितुपर्ने ।
- बैठक हुने तिथी भित्तिको जानकारी संचालकहरूमा जानकारी गराउने ।

लेखा समिति

संस्थाको परिकल्पनानुसार संस्थामा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र आन्तरिक नियन्त्रण तथा सुधारका प्रक्रियाहरूलाई संस्थागत गर्ने लेखा समितिको व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार संस्थाको साधारण सभाले निर्वाचनद्वारा लेखा संयोजक लगायत ३ जना सदस्य रहेको एक लेखा समिति गठन गर्न सक्दछ । लेखा समितिले नियमित रूपमा संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउन तथा संचालक समितिलाई सुझाव दिन सक्छ ।

संचालक समिति जस्तो संस्था वा संघको कार्यकारी अङ्ग लेखा समिति होइन अर्को शब्दमा लेखा समितिको निर्णयहरू सोझै कार्यान्वयन हुँदैनन् । ती पहिलसम्म सुझावको रूपमा संचालक समिति समक्ष पेश गरिन्छन् । संचालक समितिले सुझाव मुनासिब मानी निर्णय गरेका खण्डमा मात्र लागु हुन्छन् । समितिले आर्थिक श्रोतबाट व्यावसाय चलाउनु पर्ने संस्था वा संघ लेखा समितिको सक्रियताबाट आर्थिक श्रोतको सदुपयोग भई संस्था वा संघको उद्देश्य अभिमुख हुन सक्दछ ।

लेखा समिति संचालक समितिको प्रतिस्पर्धी अङ्ग पनि होइन । आन्तरिक लेखा परिक्षण गरी लेखापालन तथा आर्थिक अनुशासनको स्थितिका साथै आर्थिक गतिविधि र उपलब्धिको नियमित अनुगमन गरी समय छँदै सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू औल्याई संचालक समितिलाई नै सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

लेखा समिति संचालक समितिको मातहत हुने अथवा संचालक समितिले ब्राहेमा मात्र लेखा समितिको प्रयत्न काम लारने पनि होइन । संचालक समिति झैं लेखा समिति पनि साधारण सभाबाट नै गठन गरिएको हुन्छ साधारण सभाले लेखा समितिको निर्वाचन वा मनोनयनबाट निर्वाचन गर्दछ ।

लेखा समितिको काम, कर्तव्य:

- आफ्नो काम कर्तव्यको लागि सोझै साधारण सभा प्रति उत्तरदायी ।
- समय समयमा संघ संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको लेखा परिक्षण गर्नु ।
- लेखा परिक्षण गर्दा देखिएका अनैतिक कैफियतहरू सुधार गर्न संचालक समितिमा लिखित रूपमा जानकारी दिने ।
- हिएका सुझाव तथा सुधार बारे संचालक समितिबाट सुधार भए नभएको जानकारी लिने ।
- संचालक समितिले तत् सम्बन्धि सम्पूर्ण बेहोरा आफ्नो सुझावहरूको बारम्बार सभामा गरेमा लेखा समितिले सम्पूर्ण व्यहोराको प्रतिवेदन राखी साधारण सभामा पेश गर्न सक्दछ ।
- वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमामा सहयोग गर्ने ।
- साधारण सभामा लेखा सम्बन्धि वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सो प्रतिवेदनमा पेशको बारे उल्लेख गर्ने
- लेखा सम्बन्धि अभिलेख आर्थिक अनुशासन हिनानिना पेशको बारे उल्लेख गर्ने
- संस्था, संघको वासलात तयारीमा सहयोग गरी तयार पार्ने ।

लेखा समितिमा उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था संचालक समिति कै जस्तै हुन्छ ।

सहकारी संस्थाहरूसँग सदस्यहरूको सम्बन्ध तथा साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

सहकारी भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठन हो, जो स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चाहन्छन् ।

माथिको परिभाषालाई हेर्दा सहकारीता मुलतः व्यावसायिक क्रियाकलापमा आधारित हुन्छ । व्यवसाय संचालन गरी मुनाफा आर्जनबाट आफ्नो कारोबार फराकिलो बनाई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नती गर्ने सहकारीको उद्देश्य हुन्छ । सहकारी व्यवसाय सदस्यको हित र उन्नतीको लागि गरिन्छ । सदस्यहरूलाई व्यवसायमा उनेर कारोबार वृद्धि गर्ने सहकारीको उद्देश्य अन्य व्यवसायको भन्दा केही फरक छ ।

खासगरी सहकारीता व्यवसाय गर्ने अनेकौं प्रणाली मध्येको एक व्यावसायिक प्रणाली हो । अन्य व्यवसाय जस्तै साझेदारी, निजी, संयुक्त पुजी कम्पनी आदि प्रणालीमा ज्ञान नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिलाई सहकारी मार्फत आर्थिक तथा उन्नती गर्ने मौका प्राप्त हुन्छ । ठुलो लगानी, सीप र क्षमतालाई सामुहिक रूपमा उपयोग गरेर सहकारी व्यवसाय चलाउन सकिन्छ । जस्तै गाउँमा थुप्रै सुन्तला फल्छ तर सुन्तलाका किसानहरूको व्यवसायिक संगठन नहुँदा सुन्तला उत्पादन गर्ने किसान एकैले दिएको रुपमा बजार खोज्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । त्यस्तै एक्ला एकैले तरकारी खेती, फलफुल खेती जस्ता व्यवसाय गर्ने अन्य किसानहरूको पनि यस्तै हालत हुन्छ । तसर्थ यस्ता व्यवसायिक सम्भावनालाई केही व्यक्ति मिलेर सहकारी प्रणाली मार्फत उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री प्रवर्द्धन जस्ता काम गर्न सकेमा निश्चय नै सहकारीमा सामेल हुने सदस्यको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्छ । त्यसैले सहकारीता ठुला ठुला कम्पनी प्रणालीमा ज्ञान नसक्ने र नचाहनेहरूको लागि सानो लगानीबाट समेत कारोबार बढाउन सकिने वर्तमान संसारमा देखिएको सजिलो र उपयुक्त व्यवसायिक प्रणाली हो । यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको हितका लागि काम गरेको देखिन्छ । त्यस्तो संस्थालाई राम्रो सँग संचालन गर्नको लागि सदस्यहरूमा म होइन हामीको भावना हुन पर्छ । यदि यस्तो भएन भने सहकारी संस्था असफल पनि हुन्छ । सहकारी संस्था असफल हुनुमा निम्न कारणहरू छन्:

- सदस्य नै संस्थाको काममा चासो नराखेमा,
- पदलेलुप, लालची, हैकमबादी संचालक भएमा,

- राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा,
- निष्क्रिय, गैर जिम्मेवार, भ्रष्ट कर्मचारी भएमा,
- परावलम्बी, अर्काको मुख ताक्ने र अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति भएका संचालक तथा सदस्य भएमा र
- परस्परमा अविश्वास, खिचातानी र हानयाम गरेमा ।

साधारण सभाका प्रकारहरू

१) प्रारम्भिक साधारण सभा:

- यो सभा संस्था दर्ता भएको ३ महिना भित्र १५ दिने सुचना दिई बोलाइनु पर्ने हुन्छ । यस्तो सभाको गणपुरक संख्या कम्तिमा ५०% हुनु पर्दछ ।
- माथि बमोजिम सभा बोलाइएको छैन भनी सदस्यले रजिष्ट्रार समक्ष दस्तावेज दिएमा रजिष्ट्रारले तोकेको व्यक्ति बोलाउन सक्ने ।
- सभाको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र निजको पनि अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूबाट छानिएको सदस्यले गर्नेछ ।
- प्रारम्भिक साधारण सभाले अधिल्लो दिन सम्म संचालन गरेको काम, कार्यवाही र हरहिसावको जानकारी लिई अनुमोदन गर्ने, संचालक समितिको निर्वाचन गर्ने, आगामी कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय गर्ने जस्ता कार्य गर्दछ ।

२) वार्षिक साधारण सभा:

- संस्थाको शेयर खरिद गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक साधारण सभा ।
- प्रारम्भिक साधारण सभा भएको एक वर्ष भित्र र त्यस पछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र साधारण सभा बोलाउने ।
- माथि अनुसार नबोलाइएको भनी कुनै सदस्यले रजिष्ट्रार समक्ष दर्खास्त दिएमा रजिष्ट्रारले तोकिएको व्यक्तिले साधारण सभा बोलाउन सक्ने छ ।
- वार्षिक साधारण सभा बोलाउँदा ३० दिनको म्याद दिई सुचनामा भिति, स्थान र समय खुलाउनु पर्ने ।
- गणपुरक संख्या सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २५ वा १३ जना जुन बढी हुन्छ सोही मानिने ।
- दोश्रो पटक बोलाउनु परेमा ७ दिनको म्याद दिई बोलाउने । जसमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको १५छ वा ११ जनामा जुन बढी हुन्छ सोही उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मान्ने ।
- सभाको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र निजको पनि अनुपस्थितिमा सभामा उपस्थित सदस्यबाट छानिएको व्यक्तिले गर्ने।
- प्रशतावहरू पारित गर्ने एक व्यक्ति एक मतको आधारमा यदि बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत मात्र दिन सक्ने ।

३) विशेष साधारण सभा (बस्ने अवस्थाहरू):

- संस्थाको हिसाब जाचको सिलसिलामा लेखा परीक्षकले पर्याप्त कारणहरू देखाई संचालक समिति समक्ष सुझाव पेश गरेमा,
- लेखा समिति तथा विशेष उद्देश्यले गठन गरिएका उपसमितिले यथेष्ट कारणहरू समेत खोली समितिलाई सुझाव पेश गरेमा,
- कुनै संचालकले उचित कारण खोली समितिमा विशेष साधारण सभा बोलाउने माग गरेको प्रस्ताव संचालक समितिद्वारा पारित भएमा र
- संस्थाको कुल सदस्यको १०% वा १० जनामा जुन बढी हुन्छ सो संस्थाले पर्याप्त कारणहरू देखाई संचालक समिति छेउ निवेदन दिएमा ।

साधारण सभाको काम, कर्तव्य तथा अधिकार:

- संचालकहरू निर्वाचित गर्ने, निष्काशन गर्ने,
- लेखा समितिका संयोजक लगायत सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने र सो समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी निर्देशन दिने,
- संचालक समितिले पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रम उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने र प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, स्थिति विवरण पत्र र आर्थिक विवरणहरूमा समीक्षा गर्ने र अनुमोदन गर्ने,
- विनियम बमोजिम बचत विवरण गर्ने,
- संस्थाले लिन दिन सक्ने अधिकतम ऋण वा धरौतीमा सीमा तोक्ने,
- ऐन तथा नियमको अधिनमा रही विनियमलाई संशोधन गर्ने,
- वार्षिक हिसाब जाच गराउन लेखा परिक्षक नियुक्त गरी स्वीकृतीको लागि रजिष्ट्रार छेउ पेश गर्ने, लेखा परिक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्ने ।
- साधारण सभाको अध्यक्षले पेश गर्ने अन्य कुनै प्रस्ताव उपर विचार गर्ने,
- आर्थिक प्रशासन नियम र कर्मचारी प्रशासन नियम आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने,
- रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारिले संस्थामा गरेको निरिक्षण र सोधपुछ प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने ।
- अध्यक्षले राजिनामा पेश गरेमा स्वीकृत गर्ने ।
- जिल्ला सहकारी संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने,
- जिल्ला सहकारी संघमा पठाइने प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने र
- संचालक समितिलाई मार्गदर्शन दिने ।

१३७. दोहोरो लेखा प्रणाली

जुन लेखा प्रणालीका अन्तर्गत प्रत्येक लेनदेनलाई दुई खाता प्रभावित हुन्छन् त्यसलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । यो एक वैज्ञानिक प्रणाली हो । The system of book-keeping according to which each transaction is recorded from the two aspects of debit and credit is called Double Entry System यसमा लेनदेन दुई पक्ष बीच हुन्छ । एक पक्षद्वारा केहि दिइन्छ जसलाई Debtor भनिन्छ । दोश्रो पक्ष केही प्राप्त गर्दछ जसलाई Debtor (ऋण) भनिन्छ ।

यस प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको यस अन्तर्गत प्रत्येक लेनदेनको लेख खातामा हुन्छ । प्रत्येक लेनदेनमा कुनै मुख्यको कुनै चिज आउने तथा कुनै मुख्यको कुनै चिज जाने तत्त्व वर्तमान सहन्छ । जस्तै: मानौं, रु. २१,००० को फर्निचर नगद क्रय गर्‍यो । यस लेनदेनमा फर्ममा फर्निचर आइरहेछ अतः फर्निचर खाता नामलाई Debtor गरिन्छ र साथै नगद रकम गइरहेछ छ, यस प्रकार Cash खातालाई Credit गरिन्छ ।

दोहोरो लेखा प्रणालीका फाइदाहरू:

- लेनदेनको शुद्धता माथि नियन्त्रण: दोहोरो लेखा प्रणालीमा प्रत्येक नाम रकम (Debit Amount) र रकम जमा (Credit Amount) हुन्छ । अतः Trial Balance को सहायताबाट एउटा निश्चित अवधिकालागि व्यवसायिक लेनदेनहरूको ज सजिलै सग गर्न सकिन्छ।
- पूर्ण लेखा राख्ने सुविधा: यसमा व्यक्तिगत खाता राख्नुको साथै गैर व्यक्ति खाता अर्थात आम्दानी तथा खर्चहरूको पनि खाता राखिन्छ ।
- वैज्ञानिक तत्व: यो प्रणाली वैज्ञानिक हुनाको कारण लेनदेनको लेखा राख्नु गल्ती हुने सम्भावना धेरै कम हुन जान्छ ।
- तुलना सुविधा: यस प्रणालीद्वारा चालु वर्षको आम्दानी, खर्च, क्रय तथा वि आदिको तुलना गत वर्षको तथ्याङ्कबाट गरेर व्यवसायको लाभमा वृद्धि सकिन्छ ।
- नाफा-नोक्सान खाता बनाउने सुविधा: यस लाभ-हानि खाताबाट फर्मको र अथवा हानिको पता सजिलै सग लगाउन सकिन्छ । साथै यस खातागान फर्मलाई कुन-कुन श्रोतहरूबाट आम्दानी तथा कुन-कुन Items माथि करि-न खर्च भएको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
- वासलात बनाउने सुविधा: एक निश्चित अवधिको अन्तमा वासलात बन फर्मको पुत्री तथा अन्य दायित्वको साथ साथै सम्पत्तिको जानकारी प्राप्त सकिन्छ ।

राष्ट्रिय मल नीति २०५८

प्रस्तावना: नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको उदार, खुला तथा बजारमुखी अर्थ नीति अनुसार २०५४ कार्तिक देखि रासायनिक मलको कारोबार (खरीद तथा बिक्री वितरण समेत) मा नीज क्षेत्रलाई संलग्न गराई सकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल अधिराज्य भित्र गुणस्तरीय मलको आपूर्ति (उत्पादन, पैठारी तथा बिक्री वितरण) व्यवस्था प्रत्याभूत गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन मल नीति तर्जुमा भएको छ ।

यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू:

- कृषि उत्पादनको लागि मल एउटा प्रमुख उत्पादन सामग्री भएकोले कृषि क्षेत्रको नीति भित्र यो एउटा उपक्षेत्र नीति हो ।
- कृषकहरूको मल प्रति बढ्दै गएको अभिवृद्धि तथा मागलाई ध्यानमा राखी मलको उपलब्धता सहज गर्न नीज क्षेत्रको समेत संलग्नता अपरिहार्य छ ।
- सरकारी, सहकारी तथा नीज क्षेत्र सबैलाई मलको कारोबारमा समान अवसर तथा सहूलियत उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
- वर्तमान विश्व व्यापारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रसार एवं बजार नीति अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धमा सरकार स्वयम् व्यापारमा संलग्न हुनु भन्दा सरकारको भूमिका नियमकर्ता तथा सहजकर्ताको हुनु पर्दछ ।
- मलको समुचित प्रयोगको लागि कृषि प्रसार तथा कृषि अनुसन्धानले सामूहिक जिम्मेवारी वहन गरी एक अर्काको परिपुरक हुनु पर्दछ ।
- माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुन नदिन रासायनिक मलको प्रयोग बाट वातावरणमा पर्ने सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न तथा यसको उचित एवं संतुलित प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न एकीकृत बाली पोषण व्यवस्था प्रणाली अपनाउनु पर्दछ ।
- मलको समुचित प्रयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था तथा उपयुक्त वातावरण सृजन गर्नु पर्दछ ।

मल नीतिको कार्यान्वयनबाट प्राश्नारिक, त्रिवाण्युक्त एवं रासायनिक मलको उपलब्धता सहज भई दिव्यकालीन कृषि योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार रासायनिक मलको उपयोगमा वृद्धि दर हासिल गर्नुको साथै माटोको उर्वरा शक्ति सुधार तथा वृद्धि गर्न समेत सघाउ पुग्ने छ । यस नीतिले रासायनिक मलको उपयोग वृद्धि गर्ने तर्फ मात्र लक्षित नभई बोट विरवाहरूलाई

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि सेवा केन्द्र, कृषि सेवा उपकेन्द्रमा गर्दै आफ्ना कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस् ।

लेखा परिक्षण गराउदा हुने फाइदा:

- संस्थाले अनियमित तरीकाले गरेको खर्चको जानकारी हुने,
- लेखा प्रणाली अनुसार खाता वही ठीक दुरस्त राखे नराखेको चेक हुने,
- लिनु दिनु पर्ने हर हिसाब राखरी राखे नराखेको चेक हुने,
- आसानी वा खर्चको हिसाब एकिन गर्न सकिने ।

- विस्तृत सूचना सुविधा: दोहोरो लेखा प्रणालीको सहायताबाट कुनै पनि खाताको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी सजिलै संग प्राप्त गर्न सकिन्छ।
- ऋणी/धनीको ज्ञान: यस प्रणालीको सहायताबाट ऋणीहरू (Debtors) तथा धनी (Creditors) को अनुमान सजिलै संग गर्न सकिन्छ ।
- दैनिक लेनदेनहरूका सूचनाको सुविधा: यसमा प्रत्येक दिन लेनदेनहरूको विस्तृत विवरण दिइएको हुन्छ । जसबाट दैनिक लेनदेन सम्बन्धि सूचना पाउनमा सुविधा हुन्छ ।

सहकारी ऐनले दिएको अधिकारले रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकबाट संघ संस्थालाई दिएको निर्देशनानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनिवार्य रूपले लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने हुनेछ ।

आवश्यक पर्ने विभिन्न पोषण तत्वहरूको सन्तुलित तथा कुसल उपयोग तथा एरिककृत वाली पोषण व्यवस्थापन प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने तर्फ जोड दिइएको छ । साथै यस नीतिले अधिराज्य भित्र मल बिक्रेताहरूले यस नीति अनुरूप रासायनिक मलको बेचबिखन गर्ने सक्ने प्रावधान रहेको छ । मल बिक्री वितरण गर्ने नियमानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सम्पर्क राख्न जरुरी छ ।

रासायनिक मल बिक्रेताहरूको दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि: मल बिक्रेताहरूले सर्वप्रथम त मल बेचबिखन गर्ने आफ्नो फर्म दर्ता गराउनु पर्दछ ।

दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने:

- नेपाल अधिराज्य भित्र रासायनिक मलको थोक वा खुदा बिक्री वितरण गर्ने चाहने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको एजेन्टले आफ्नो नाम दर्ता गराउन रजिष्ट्रेसन दस्तुर वापत रु. १००१ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको भौचर सहित निश्चित ढाँचामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ ।
- रासायनिक मल बिक्रेताको दर्ताको लागि निवेदन दिने व्यक्ति नेपाली नागरिक र साधारण लेखपढ गर्न जान्ने हुनु पर्दछ ।
- निवेदन प्राप्त भए पछि ७ दिन भित्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुसूचि २ अनुसार मल बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिने छ ।
- बिक्रेताहरूले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गरे पश्चात् रासायनिक मल खरिद सम्बन्धमा बिक्रेता स्वयमले पेठारी कर्ता संग समन्वय राखी व्यवस्थापन गर्ने पर्दछ । बिक्रेताहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराई दिने जिम्मेवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको हुनु हुँदैन ।
- बिक्रेताहरूले रासायनिक मलको मूल्य सूचिमा मलको विवरण (किस्म र श्रोत) सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस्नु पर्दछ ।
- जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएका सबै बिक्रेताहरूले आफ्नो आफ्नो मासिक कारोबारको स्थिति अनुसूचि ४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालय वा आफूलाई पायक पर्ने कृषि सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
- प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षको हुन्छ । दर्ता भएका बिक्रेताहरूले यस्तो प्रमाणपत्र सुरक्षित साथ सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस्नु पर्दछ ।

नविकरण सम्बन्धमा: बिक्रेताहरूले दर्ताको म्याद भुक्तानी हुनु भन्दा कम्तिमा ३५ दिन अगावै रु. ५०१ नविकरण दस्तुर वापत राजस्व खातामा दाखिला गरी सो को बैक भौचर सहित बिक्रेताले प्रमाणपत्रको नविकरण गराउन जिल्ला

कृषि विकास कार्यालयमा अनुसूचि ५ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ:

- नविकरणको लागि निवेदन परेमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ७ दिन भित्र बिक्रेताको प्रमाणपत्र नविकरण गरिदिनु पर्ने छ ।
- बि.कृ.वि.का.मा नियमित रुपमा मासिक कारोबार स्थिति प्रगति पेश गरेको ।
- अनधिकृत र न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको सम्बन्धमा कारवाहीमा नपरेको ।
- नविकरणको अवधि २ वर्षको हुने गर्दछ ।

दर्ता खारेजी:

- न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको पाइएमा निरीक्षकले बिक्रेताको दर्ता खारेजीको लागि बि.कृ.वि.का. समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दछ । दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अगाडि बिक्रेतालाई आफ्नो स्पष्टिकरण दिने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
- दर्ता खारेजी सम्बन्धमा जि.कृ.वि.का.को निर्णयमा चित नबुझे सम्बन्धित बिक्रेताले सम्बन्धित क्षेत्र, कृ. नि. समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।
- पुनरावेदन पछि क्षेत्र, कृ. नि.को निर्णय अन्तिम निर्णय हुने छ ।
- न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री गरेको वापत बिक्रेताको दर्ता खारेजी हुँदा एन बमोजिम अन्य सजाय तथा कारवाहीलाई असर पार्ने छैन ।

रासायनिक मल बिक्री वितरणको लागि दर्ता गर्न पेश गर्नु पर्ने निवेदन र विवरणको ढाँचा सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पाईन्छ ।

- विस्तृत सूचना सुविधा: दोहोरो लेखा प्रणालीको सहायताबाट कुनै पनि खाताको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी सजिलै सँग प्राप्त गर्न सकिन्छ।
 - ऋणी/धनीको ज्ञान: यस प्रणालीको सहायताबाट ऋणीहरू (Debtors) तथा धनी (Creditors) को अनुमान सजिलै सँग गर्न सकिन्छ।
 - दैनिक लेनदेनहरूका सूचनाको सुविधा: यसमा प्रत्येक दिन लेनदेनहरूको विस्तृत विवरण दिइएको हुन्छ। जसबाट दैनिक लेनदेन सम्बन्धि सूचना पाउनमा सुविधा हुन्छ।
- सहकारी ऐनले दिएको अधिकारले रजिष्टर्ड लेखा परिश्वकबाट संघ संस्थालाई दिएको निर्देशनानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनिवार्य रूपले लेखा परिश्वक गराउनु पर्ने हुनेछ।

लेखा परिश्वक गराउँदा हुने फाइदा:

- संस्थाले अनिवार्य तरिकाले गरेको खर्चको जानकारी हुने,
- लेखा प्रणाली अनुसार खाता वही ठीक दुरस्त राखे नराखेको चेक हुने,
- लिनु पर्ने हर हिसाब राम्ररी राखे नराखेको चेक हुने,
- आम्दानी वा खर्चको हिसाब एकिन गर्न सकिने।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि सेवा केन्द्र, कृषि सेवा उपकेन्द्रमा गर्दै आफ्ना कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस्।

१३. रासायनिक मल बिन्नेला सम्बन्धि ऐन नियम र निर्देशिका

राष्ट्रिय मल नीति २०५८

प्रस्तावना: नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको उदार, खुला तथा बजारमुखी अर्थ नीति अनुसार २०५४ कार्तिक देखि रासायनिक मलको कारोबार (खरीद तथा बिक्री वितरण समेत) मा नीज क्षेत्रलाई संलग्न गराई सकेको परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्य भित्र गुणस्तरीय मलको आपूर्ति (उत्पादन, पैठारी तथा बिक्री वितरण) व्यवस्था प्रत्याभूत गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन मल नीति तर्जुमा भएको छ।

यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू:

- कृषि उत्पादनको लागि मल एउटा प्रमुख उत्पादन सामग्री भएकोले कृषि क्षेत्रको नीति भित्र यो एउटा उपक्षेत्र नीति हो।
- कृषकहरूको मल प्रति बढ्दै गएको अभिलेखि तथा मागलाई ध्यानमा राखी मलको उपलब्धता सहज गर्न नीज क्षेत्रको समेत संलग्नता अपरिहार्य छ।
- सरकारी, सहकारी तथा नीज क्षेत्र सबैलाई मलको कारोबारमा समान अवसर तथा सहूलियत उपलब्ध हुनु पर्दछ।
- वर्तमान विश्व व्यापारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रसार एवं बजार नीति अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धमा सरकार स्वयम् व्यापारमा संलग्न हुनु भन्दा सरकारको भूमिका नियमकर्ता तथा सहजकर्ताको हुनु पर्दछ।
- मलको समुचित प्रयोगको लागि कृषि प्रसार तथा कृषि अनुसन्धानले सामूहिक जिम्मेवारी वहन गरी एक अर्काको परिपुरक हुनु पर्दछ।
- माटोको उर्वरा शक्ति हास हुन नदिन रासायनिक मलको प्रयोग बाट वातावरणमा पर्ने सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न तथा यसको उचित एवं संतुलित प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न एकिकृत बाली पोषण व्यवस्था प्रणाली अपनाउनु पर्दछ।
- मलको समुचित प्रयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था तथा उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ।

यस मल नीतिको कार्यान्वयनबाट प्राङ्गारिक, जिवाणुयुक्त एवं रासायनिक मलको उपलब्धता सहज भई दिविकालीन कृषि योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार रासायनिक मलको उपयोगमा वृद्धि दर हासिल गर्नुको साथै माटोको उर्वरा शक्ति सुधार तथा वृद्धि गर्न समेत सघाउ पुग्ने छ। यस नीतिले रासायनिक मलको उपयोग वृद्धि गर्ने तर्फ मात्र लक्षित नभई बोट विरवाहरूलाई

आवश्यक पर्ने विभिन्न पोषण तत्वहरूको सन्तुलित तथा कुशल उपयोग तथा एकिकृत बाली पोषण व्यवस्थापन प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने तर्फ जोड दिइएको छ । साथै यस नीतिले अधिराज्य भरि मल बिक्रेताहरूले यस नीति अनुरूप रासायनिक मलको बेचबिखन गर्ने सक्ने प्रावधान रहेको छ । मल बिक्री वितरण गर्ने नियमानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सम्पर्क राख्न जरुरी छ ।

रासायनिक मल बिक्रेताहरूको दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि: मल बिक्रेताहरूले सर्वप्रथम त मल बेचबिखन गर्ने आफ्नो फर्म दर्ता गराउनु पर्दछ ।

दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने:

- नेपाल अधिराज्य भित्र रासायनिक मलको थोक वा छुट्टा बिक्री वितरण गर्ने चाहने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको एजेन्टले आफ्नो नाम दर्ता गराउन रजिष्ट्रसन दस्तुर बापत रु. १००। नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको भौचर सहित निश्चित ढाँचामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ ।
- रासायनिक मल बिक्रेताको दर्ताको लागि निवेदन दिने व्यक्ति नेपाली नागरिक र साधारण लेखपढ गर्ने जान्ने हुनु पर्दछ ।
- निवेदन प्राप्त भए पछि ७ दिन भित्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुसूचि २ अनुसार मल बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिने छ ।
- बिक्रेताहरूले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गरे पश्चात् रासायनिक मल खरिद सम्बन्धमा बिक्रेता स्वयम्ले पैठारी कर्ता सँग समन्वय राखी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । बिक्रेताहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराई दिने जिम्मेवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको हुनु हुँदैन ।
- बिक्रेताहरूले रासायनिक मलको मूल्य सूचिमा मलको विवरण (किसिम र श्रोत) सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस्नु पर्दछ ।
- जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएका सबै बिक्रेताहरूले आफ्नो आफ्नो मासिक कारोबारको स्थिति अनुसूचि ४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालय वा आफूलाई पायक पर्ने कृषि सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
- प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षको हुन्छ । दर्ता भएका बिक्रेताहरूले यस्तो प्रमाणपत्र सुरक्षित साथ सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस्नु पर्दछ ।

नविकरण सम्बन्धमा: बिक्रेताहरूले दर्ताको म्याद भुक्तानी हुनु भन्दा कीभनमा ३५ दिन अगावै रु. ५०। नविकरण दस्तुर बापत राजस्व खातामा दाखिला गरी सो को बैक भौचर सहित बिक्रेताले प्रमाणपत्रको नविकरण गराउन जिल्ला

कृषि विकास कार्यालयमा अनुसूचि ५ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु हुन्छ:

- नविकरणको लागि निवेदन परेमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ७ भित्र बिक्रेताको प्रमाणपत्र नविकरण गरिदिनु पर्ने छ ।
- बि.कृ.वि.का.मा नियमित रूपमा मासिक कारोबार स्थिति प्रगति पेश गरेको अनधिकृत र न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको सम्बन्धमा कारवाहीमा नपरेको ।
- नविकरणको अवधि २ वर्षको हुने गर्दछ ।

दर्ता खारेजी:

- न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको पाइएमा निरी बिक्रेताको दर्ता खारेजीको लागि बि.कृ.वि.का. समक्ष प्रतिवेदन पेश पर्दछ । दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अगाडि बिक्रेतालाई ३ स्मिटिकरण दिने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
- दर्ता खारेजी सम्बन्धमा बि.कृ.वि.का.को निर्णयमा चित नबुझे सम्म बिक्रेताले सम्बन्धित क्षेत्र, कृ.नि. समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।
- पुनरावेदन पछि क्षेत्र, कृ.नि.को निर्णय अन्तिम निर्णय हुने छ ।
- न्यून स्तरको रासायनिक मल बिक्री गरेको बापत बिक्रेताको दर्ता हुँदैन एन बमोजिम अन्य सजाय तथा कारवाहीलाई असर पर्ने छैन ।

रासायनिक मल बिक्री वितरणको लागि दर्ता गर्न पेश गर्नु पर्ने निवेदन बिक्रेताको ढाँचा सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पाईन्छ ।

आयोजनाका हालसम्मका उपलब्धिहरु

काभ्रेका ६ गा.वि.स. र दुई नगरपालिका (बनेपा र पनौती) का सुन्तला उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूसँग मिली (क) सामाजिक परिचालनवाट सम्मानित विकासका कार्यक्रमहरु, (ख) कलसी प्रविधिवाट स्वस्थ र निरोगी विरुवाहरु उत्पादन गर्नका लागि बनेपामा एक आधुनिक सुन्तला जात नर्सरी स्थापना र माटु विरुवाहरुको संख्या बढाउने कार्य (२ वटा जाली घरहरु भित्र), (ग) हाल भैरहको बगैँचाहरुको विविध प्रदर्शनहरुवाट सुधार तथा नयाँ विरुवाहरु वितरण कार्य, (घ) छोटो अवधिमा लाभान्वित जनताको खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने आय-आजनका कामहरु (मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती, बेमौसमी तरकारी खेतीबारे तालिम र विड वितरण, बनेपा फार्ममा तरकारी प्रदर्शन ल्युटहरु स्थापना तथा व्यवस्थापन, खाद्य र पोषण वारे सचेतना कार्यक्रम र आर्थिक रुपले विपन्न परिवारहरुलाई बंगुर र बाखा वितरण) आदि छन् । हालसम्म जिल्लाका ६ विभिन्न गा.वि.स.मा र बनेपा फार्ममा गरी जम्मा ७ वटा नमूना बगैँचा स्थापना गरिएको छ ।

आयोजनाको दीर्घकालीन र आन्तरिक लक्ष्य

बनेपामा भौं देशका प्रत्येक विकास क्षेत्रमा (६ वटा) नर्सरी र देशका सुन्तला संभाव्य करीव ४० जिल्लाहरुमा, काभ्रेमा जस्तै नमूना बगैँचा स्थापना गरी कृषकस्तरसम्म आधुनिक सुन्तला विकास गरी कृषकहरुको आय वृद्धिमा सहयोग गरी समष्टिरुपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पु-याउने आयोजनाको दीर्घकालीन लक्ष हो ।

यो दीर्घकालीन लक्ष देशको हावापानीले दिएको प्रचुर सम्भाव्यता, दुई भीमकाय जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा अवस्थित हुनाले उपलब्ध प्रशस्त बजार सम्भाव्यता, देशले विश्व व्यापार संघको सदस्यता लिएको र कृषि उत्पादनमा विश्वभर नै प्रतिस्पर्द्धा गर्नुपर्ने अवस्था आदिले गर्दा सुन्तला विकास नयाँ नेपाल निर्माणमा एक ठूलो सहयोगी कार्यक्रम बन्न सक्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन गरी तर्जुमा गरिएको हो ।

वातावरणीय सन्तुलनमा जनचेतना जगाउँदै सामुदायिक
विकासमा जनताका संगठन र नेतृत्व विकासको
माध्यमबाट जनतासँगै काम गर्ने उद्देश्यले
२०४८ सालमा इकार्ड्स-नेपालको स्थापना
भै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं
तथा समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता
भएको हो । गरीब तथा मौकाबाट
वञ्चित समुदायहरूलाई उनीहरूको
समस्या पहिचानमा सम्मिलित
हुने र उनीहरू नै समाधानका
अगुवा हुने कुराले मात्र
साँचो अर्थमा उनीहरूको
मुक्ति हुन सक्छ
भन्ने कुरामा
हामी दृढ
विश्वास
राख्दछौं ।

हामी सम्बन्धी बढी जानकारीको लागि



इकार्ड्स-नेपाल

पो.ब.नं. ८११५, कोटेश्वर, काठमाडौं

फोन/फ्याक्स: ८६०२२३४/०१-६२०२६३१

e-mail: ecards@wlink.com.np

web: www.ecards.org.np